


ကလေး သူငယ်များ အတွက်

သုတရတနာ သိုက်

သန့်ရှင်း




ကိန်းသင်္ကေတပြ အပင်း



မြေလရာသီဥတု

10th	☀️	နေပူ
17th	☁️	တိမ်ထူ
23rd	☔	မိုးရွာ

ဇယား



လျှောတွက်တံ

လိုင်စင်ကတ်ပြား

22-56

မျိုးခွဲခြင်းနှင့်
စီစဉ်ခြင်း




အီလက်ထရွန်နစ်
ကွန်ပျူတာ



အိတ်ဆောင်
တွက်ခက်

101 = 5



နှစ်လီစနစ်



ပေသီးခုံ

1 2 3
9 0 4
8 7 6 5

သုညကိုတွေ့ရှိခြင်း

I II III
IV V

ရောမကိန်းသင်္ကေတ



မာယာမော်ကွန်းတိုင်

1 2 3 4 5

အာရပ်ကိန်းသင်္ကေတ

一 二 三 四 五

တရုတ်ကိန်းသင်္ကေတ



ရိုင်းပေစာ



ရိုဆက်တာကျောက်

ရိုဆက်တာကျောက်ပြား
ရိုဆက်တာကျောက်ပြားသည် နှိုင်းမြစ်၏မြစ်ဝတစ်ခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သော ကျောက်ပြားတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ရှေးအီဂျစ် ရုပ်ပြရေးသားနည်းကို အဓိပ္ပာယ်ပြန်နိုင်ရန် သော့ချက် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကျောက်ပြားတွင် ရှေးအီဂျစ် ကိန်းဂဏန်းများကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

မာယာမော်ကွန်းတိုင်
မာယာတို့သည် ရှေးနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ခန့်က မက္ကဆီကိုနှင့် ဗဟိုအမေရိကတို့တွင် အင်အားကြီးမားသောအင်ဒီးယန်း လူမျိုး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းလူမျိုးများသည် နေ့ရက် များ မှတ်တမ်းတင်ရာတွင် လူမျက်နှာပုံသဏ္ဌာန်နှင့် တူသော ကိန်းဂဏန်းများကို သုံးခဲ့သည်။

ရိုင်းပေစာ
အီဂျစ်တွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၅၀၀ ကျော်ခန့်က ရေးခဲ့သည့် ရိုင်း ပေစာသည် သင်္ချာတွင် ရှေးအကျဆုံး သော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဩဂုတ်နှင့် ထောင်မှန်စတုဂံတို့၏ ဧရိယာများနှင့် ပတ်သက်သော ပြဿနာများ ပါရှိသည်။

ကလေး သူငယ်များ အတွက်

သုတရတနာ သိုက်

သန့်ပြာ

ကိုဒန်းရှား၏
ကလေးသူငယ်များအတွက်
ရောင်စုံစွယ်စုံကျမ်း မူရင်းကိုမှီး၍
အက်ဖ်အီးပီ အင်တာနေရှင်နယ် ပီတီအီးလီမိတက်က
တည်းဖြတ်သည့် မူကို
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့်
တိုင်း-လိုက်ဖ် စာအုပ်တိုက်တို့က
မြန်မာပြန်ဆိုထုတ်ဝေသည်။

ပထမပုံနှိပ်ခြင်း အုပ်စု ၅၀၀၀၀

၁၉၈၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ

အမွှာစာ

ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ ကလေးသူငယ်များ ဗဟုသုတ တိုးတက်ပွားများစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကလေးသူငယ်များအတွက် သုတရတနာသိုက် ဟူသောအမည်ဖြင့် ဤကျမ်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။

အဆိုပါကျမ်း၏မူရင်းမှာ Kodansha ကုမ္ပဏီမှ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ရောင်စုံစွယ်စုံကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစွယ်စုံကျမ်းကိုမှီး၍ Far East Publication International Pte Limited မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသော The Children's Treasury of Knowledge ကျမ်းကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့် Time-Life စာအုပ်ကုမ္ပဏီတို့ပူးတွဲ၍ မြန်မာပြန် ကျမ်း တစ်စောင်အဖြစ် ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤသို့စီစဉ်ထုတ်ဝေရာ၌ နိုင်ငံတော်၏ပညာရေးကို ကမ္ဘာ့ပညာရေးအဆင့်မီစေရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်အားလျော်စွာ မြန်မာကလေးသူငယ်များသည် ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းစာများအပြင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကိုလည်း အလွယ်တကူ ရယူဆည်းပူးနိုင်ကြပါစေဟူသော အာသိသထားရှိပါသည်။

ဤ သုတရတနာသိုက် တွင်-

- ၁။ ယူနီဗာဆယ်နှင့် ရာသီဥတု
- ၂။ အပင်များ
- ၃။ ကမ္ဘာဦးသက်ရှိများ
- ၄။ ရေအောက်သက်ရှိများ
- ၅။ အင်းဆက်ပိုးများ
- ၆။ တိရစ္ဆာန်များ
- ၇။ သင်္ချာ
- ၈။ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် စွမ်းအင်
- ၉။ ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
- ၁၀။ ဝါသနာပါရာ အပန်းဖြေစရာ

ဟူ၍ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအသိပညာ အတတ်ပညာ စသည့် သုတရတနာများ ပါဝင်ကြပါသည်။ ထိုသုတရတနာများ သို့မိုးရာဖြစ်သောကြောင့် ကျမ်း၏အမည်ကို သုတရတနာသိုက် ဟူ၍ မှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ မွန်မြတ်သောစေတနာဖြင့် ပြန်ဆိုကြသော ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် စေ့စပ်သေချာစွာ ပြန်ဆိုစိစစ်ကြပါသည်။ သို့သော် ဘာသာတစ်ခုမှ အခြားဘာသာတစ်ခုသို့ တိတိကျကျ ပြန်ဆိုရန်မှာ မလွယ်ကူလှသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဘာသာနှင့် တစ်ဘာသာမှာ အနက်အဓိပ္ပာယ် အကျယ်အကျဉ်း အနက်အတိမ် စသည့် ခြားနားမှုများရှိမြဲဖြစ်ရာ မူရင်းအဓိပ္ပာယ် တိကျစေရန် အချို့အချို့သော မူရင်းဘာသာစကားလုံးများကို မြန်မာဘာသာသို့ မပြန်ဆိုပဲ

အသံမျှသာ ဖလှယ်ထားပါသည်။ ဤသို့ အသံဖလှယ်ထားခြင်းကြောင့် မူရင်းဘာသာစကားနှင့် ရင်းနှီးမှု အကျိုးကိုလည်း ကလေးသူငယ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပညာရှင်များ ယခုသုံးထားသော စကားလုံးများနှင့် အဓိပ္ပာယ်များထက် ပိုမို ကောင်းမွန်သင့်မြတ်သည့် စကားလုံးများ အဓိပ္ပာယ်များကို ဤကျမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုသူများက အကြံပေးစေလိုပါသည်။ ထိုသို့ အကြံပေးချက်များကို လေးလေးစားစား လေ့လာပြီး ဆီလျော်သည့်အချက်အလက်နှင့် စကားလုံးများကို အစားထိုးပြောင်းလဲရန် အသင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဤကျမ်းတွင် ပါဝင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကို လိုသလိုရွေးနုတ်၍ ဆည်းပူးနိုင်ကြပါသည်။ ကလေးသူငယ်များအတွက် ခိုင်ခံ့သောလည်း ဤကျမ်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် ကလေးလူကြီးမရွေး ဗဟုသုတပွားများ၍ အသိဉာဏ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာကြမည်။ ထို့ထက် တစ်ဆင့်တက်၍ သိလိုစိတ် စူးစမ်းရှာဖွေလိုစိတ်နှင့် သုတပွားလိုစိတ်များ ဆက်ကာဆက်ကာ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါက ဤကျမ်းထုတ်ဝေခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်သည်ဟု မှတ်ယူရပေမည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မာတိကာ

စာမျက်နှာ

အစုများ

၇

အစုများတည်ဆောက်ခြင်း၊ အစုများတခုနှင့်တခု ဆက်သွယ်ပုံ

ကိန်းများ

၁၁

ကိန်းသင်္ကေတများ၏သမိုင်း၊ ယခုခေတ်ကိန်းသင်္ကေတများ၊ ကိန်းများကိုအသုံးပြုပုံ၊ ကိန်းကြီးများ ရေးနည်း၊ အပေါင်း၊ အနုတ်၊ အပေါင်းနှင့်အနုတ်၊ အပေါင်းစည်းပျဉ်းများ၊ အမြောက်၊ အလီ၊ ဆတိုးကိန်းများနှင့် ဘုံဆတိုးကိန်းများ၊ အစား၊ အမြောက်နှင့်အစား၊ မြောက်နည်းများ၊ ဆခွဲ ကိန်းနှင့် ဘုံဆခွဲကိန်းများ၊ အပိုင်းကိန်းများ၊ ဒသမကိန်းများ၊ မညီချက်များနှင့် ညီမျှခြင်းများ၊ တွက်ချက်မှုကိရိယာများ၊ အပေါင်းကိန်းများနှင့် အနုတ်ကိန်းများ

ပုံသဏ္ဌာန်များ

၄၇

စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပုံသဏ္ဌာန်များ၊ ရိုးရိုးပုံသဏ္ဌာန်များ၊ မျဉ်းပြောင်းများနှင့် ထောင်များ၊ မျဉ်းပြိုင်နှင့် မျဉ်းမတ်၊ တြိဂံများ၊ စတုရံများ၊ စက်ဝိုင်းများ၊ မျဉ်းကွေးအမျိုးမျိုး၊ ထုပုံများ၊ အမှတ်များ၏ နေရာများ၊ သင်္ချာပုံစံများ၊ သဏ္ဌာန်တူခြင်းနှင့် ထပ်တူညီခြင်း၊ ချဲ့ထားသောပုံများ၊ ချဲ့ထားသောပုံများ၊ ခေါက်ချိုးညီခြင်းများ

အတိုင်းအတာပမာဏများ

၇၃

အလျား၊ ဧရိယာ၊ ထုထည်၊ အလေးချိန်၊ အချိန်၊ ရွေ့လျားမှုနှင့်ပြန်နှုန်း၊ တိုက်ရိုက်အချိုးတူခြင်း၊ ပြောင်းပြန်အချိုးတူခြင်း၊ အချိုးနှင့်ရာခိုင်နှုန်း၊ ဖြစ်တန်စွမ်း

စာရင်းအင်းသင်္ချာ

၉၅

ဇယားများ၊ ဂရပ်များ၊ မျိုးခွဲခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်း

ထင်ရှားသော သင်္ချာပညာရှင်များ

၁၀၃

ယူနစ်ဇယားများ

၁၁၀








ဝေါဟာရစာရင်း

၁၁၁

အစုဖျား

အရာဝတ္ထုများ စုစည်းထားခြင်းကို ‘အစု’ ဟု ခေါ်သည်။ ဖရဲသီးနှံလုံးသည် အစုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နာနတ်သီး သုံးလုံးသည်လည်း အစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပျစ်သီး အညိုတစ်ခိုင်နှင့် အစိမ်းတစ်ခိုင်သည် အစုတစ်ခုဖြစ်သလို ဖရဲသီးတစ်လုံးသည်လည်း အစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှောက်ချိုသီးနှင့် လိမ္မော်သီးများကိုလည်း အစုအဖြစ် စုစည်းထားနိုင်သည်။ အစုသဘောတရားသည် သင်္ချာ၏ အခြေခံဖြစ်သည်။ အစုတစ်ခုထဲရှိ အရာဝတ္ထုများအကြောင်းနှင့် အစုချင်းဆက်သွယ်ပုံအကြောင်းတို့ကို လေ့လာမည်။


အစုအမျိုးမျိုး



အခုများတည်ဆောက်ခြင်း

အရာဝတ္ထုများ စုစည်းထားခြင်းကို 'အစု' ဟု ခေါ်သည်။ အစုတစ်ခု၏ အပိုင်းတစ်ခုကို ထိုအစု၏ 'အစုပိုင်း' ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် မူရင်းအစု၌ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ရှိ သစ်ကုလားအုတ်များ အစုသည် ထိုဥယျာဉ်အတွင်းရှိ တိရစ္ဆာန်များ အစု၏ အစုပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုဥယျာဉ်ရှိ တိရစ္ဆာန်အားလုံးဖြင့် အစုတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်သည်။



တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်မှ တိရစ္ဆာန်များအစု



တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တစ်ခုထဲရှိ တိရစ္ဆာန်များဖြင့် အစုတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ထိုအစုသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ 'တိရစ္ဆာန်များအစု'၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အစုတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းကို ထိုအစု၏ 'အစုပိုင်း' ဟု ခေါ်သည်။ ဆင်များအစု၊ မိကျောင်း

များအစု၊ ခြင်္သေ့များ အစုနှင့် ငှက်များအစုသည် တိရစ္ဆာန်များ အစု၏ အစုပိုင်းများ ဖြစ်သည်။ အသားစားတိရစ္ဆာန်များ အစုသည် တိရစ္ဆာန်များအစု၏ အစုပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအစုထဲ၌ ခြင်္သေ့များ အစုသည် အစုပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ထိုအတူ ပျံနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များ အစုသည် တိရစ္ဆာန်များ အစု၏ အစုပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုအစုပိုင်းထဲ၌ အများစုမှာ ငှက်များ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တိရစ္ဆာန်များအစုကို ပျံနိုင်သော အစုပိုင်းနှင့် မပျံနိုင်သော အစုပိုင်းဟူ၍ ခွဲနိုင်သည်။



ခြံခတ်ထားသော မြင်းများအစုနှင့် နွားများအစု

တိကျစွာဖော်ပြထားသော အရာဝတ္ထုများပါဝင်သည့် အစုအဝေးကို 'အစု' ဟု ခေါ်သည်။

အစုတစ်ခုစီပါဝင်သော အရာဝတ္ထုတစ်ခုစီကို 'အစုဝင်' ဟုခေါ်ဆိုသည်။ အစုတစ်ခု၏ အစုဝင်တစ်ခုစီသည် နောက်အစုတစ်ခုထဲ၌ ပြန်လည်ပါရှိနေလျှင် ပထမအစုသည် ဒုတိယအစုထဲ၌ ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုအချက်ကို ဖော်ပြလိုလျှင် သင်္ကေတ $\subset$ ကို သုံးသည်။ ထို့ကြောင့် မျောက်များအစု $\subset$ တိရစ္ဆာန်များ အစု၊ ခြင်္သေ့များအစု $\subset$ အသားစား တိရစ္ဆာန်များ အစု၊ မကိန်းများအစု $(1, 3, 5, 7, 9, \dots) \subset$ သဘာဝကိန်းများအစု $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$ ဖြစ်သည်။ စုံကိန်းများအစု $(2, 4, 6, 8, \dots)$ နှင့် မကိန်းများအစုနှစ်ခုပေါင်းခြင်းသည် သဘာဝကိန်းများအစုဖြစ်သဖြင့် စုံကိန်းများ အစုကို မကိန်းများအစု၏ 'ပြည့်ပက်အစု' ဟု ခေါ်သည်။

အစုများစာချုပ်စာချုပ် ဆက်သွယ်ပုံ

အစုနှစ်ခုပါသော အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုပေါင်း၍ရသည့် အစုကို အစုနှစ်ခု၏ ‘နှောခြင်း’ ဟု ခေါ်မည်။ အစုနှစ်ခုစလုံးတွင်ပါသော အရာဝတ္ထုများသာပါသည့် အစုကို အစုနှစ်ခု၏ ‘ဖြတ်ခြင်း’ ဟု ခေါ်မည်။ အစုဝင်တစ်ခုမျှ မပါသော အစုကို ‘ဗလာအစု’ ဟု ခေါ်သည်။ ၎င်းသည် တူသော အစုဝင်မပါရှိသည့် အစုနှစ်ခု၏ ဖြတ်ခြင်းဖြစ်၏။

ဖြတ်ခြင်းများ




ပုံ၌ ‘ဂျန်’ နှင့် ‘အင်’ မောင်နှမနှစ်ယောက် ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများကို ပြထားသည်။ အခမ်းရောင်ပိုင်းရှိ ပစ္စည်းများမှာ ‘ဂျန်’ နှင့် ‘အင်’ တို့နှစ်ဦးသုံးသော ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ‘ဂျန်’ ပိုင် ပစ္စည်းများအစုနှင့် ‘အင်’ ပိုင်ပစ္စည်းများအစုတို့၏ ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

တူသောအစိတ်အပိုင်းမရှိသည့်အစုများ



ယောက်ျားကလေးများ နုပန်းလုံးနေကြပြီး မိန်းကလေးများ ကြိုးခန့်နေကြသည်။ ဤတွင် မိန်းကလေးများအစုနှင့် ယောက်ျားကလေးများအစုတို့ တူသောအစိတ် အပိုင်းမရှိ။ ထိုအစုနှစ်ခု ဖြတ်ခြင်း၌ အစုဝင်တစ်ခုမျှမရှိ။ အစုဝင်တစ်ခုမျှမပါသော အစုကို ဗလာအစုဟု ခေါ်သည်။




ပုံ (၁) တွင် ခရမ်းရောင်အပိုင်းသည် အစုနှစ်ခု၏ ‘နှောခြင်း’ ကိုပြသည်။ ပုံ (၂) တွင် အနီရောင်အပိုင်းသည် အစုနှစ်ခု၏ ‘ဖြတ်ခြင်း’ ကို ပြသည်။ ဖော်ပြခဲ့သောပုံတွင် ယောက်ျားကလေးများအစုနှင့် မိန်းကလေးများအစုတို့၏ဖြတ်ခြင်းမှာ ဗလာအစုပင် ဖြစ်သည်။

နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသောအစုများ၏ ဖြတ်ခြင်းသည်အစုအားလုံးတွင် ပါဝင်သော အစုဝင်များသာပါသည့် အစုပင်ဖြစ်သည်။ ဥပမာ အသားစားတိရစ္ဆာန်များအစုနှင့် နို့တိုက်သတ္တဝါများအစုတို့၏ဖြတ်ခြင်းတွင် ခြင်္သေ့များ အစုပါသည်။ အစုများ၏ နှောခြင်းသည် အစုဝင်များ အားလုံးပါသည့် အစုဖြစ်သည်။ ဥပမာ ပျံနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များ အစုနှင့် မပျံနိုင်သော တိရစ္ဆာန်များအစုတို့၏ နှောခြင်းသည် တိရစ္ဆာန်များအားလုံးပါဝင်သော အစုဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုအစုနှစ်ခု၏ ဖြတ်ခြင်းတွင် မည်သည့်တိရစ္ဆာန်မျှ မပါဝင်ချေ။ မည်သည့်အရာဝတ္ထုမျှ မပါဝင်သောအစုကို ဗလာအစုဟု ခေါ်သည်။

ကိန်းများ

ကိန်းသင်္ကေတ (ဂဏန်းခြေများ) အပိုင်းကိန်းများနှင့် ဒသမကိန်းများကို တဆင့်ပြီးတဆင့် တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ ကိန်းကြီးများပါသော တွက်ချက်မှုများကို မြန်မြန်နှင့် မှန်မှန်တွက်နိုင်ရန် စက်များကို အသုံးပြုကြသည်။ ကိန်းသင်္ကေတများ၏ သမိုင်းကြောင်းနှင့် ကိန်းများ၏ အပေါင်း၊ အနှုတ်၊ အမြောက်၊ အစားတို့ကို လေ့လာကြပါစို့။



ကမ္ဘာ့ကျောင်းသား အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ကိန်းသင်္ကေတများ၏သမိုင်း

ရှေးခေတ်လူများသည် ‘တွဲဖက်ခြင်း’ သို့မဟုတ် ‘တစ်-တစ်ဆက်သွယ်ချက်’ ကို အရာဝတ္ထုများ ရေတွက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လက်ချောင်းများနှင့် အခြားမြင်နေကျအရာများကို ကိန်းများအတွက် သင်္ကေတများအဖြစ် သုံးခဲ့ကြသည်။ ကိန်းများကို မှတ်သားရန် ကြိုးထုံး အစီအစဉ်များကို သုံးခဲ့ကြသည်။ သူ့ကို အိန္ဒိယပြည်တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။ တိုင်းပြည်အလိုက် ပြောင်းလဲ၍ ကိန်းသင်္ကေတအမျိုးမျိုးကို သုံးခဲ့ကြသည်။

တစ်-တစ်ဆက်သွယ်ချက်
သိုးများနှင့် သစ်ပင်ပေါ်မှ အမှတ်အသားများ




ကိန်းများကိုရေတွက်ရာ၌ မြင်နေကျအရာများကိုသုံးခဲ့သည်။ ‘တစ်’ကို ခြင်္သေ့ခေါင်း၊ အချို့က ကိန်းများကိုဖော်ပြရန် ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို သုံးသည်။ ‘တစ်’ လက်သန်း ‘နှစ်’ လက်သုကြွယ် ‘နှစ်’ကို လင်းယုန်တောင်ပံ၊ ‘သုံး’ကို ပဲရွက် စသည်တို့ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ အချို့က ကိန်းများကိုဖော်ပြရန် ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကို သုံးသည်။ ‘တစ်’ လက်သန်း ‘နှစ်’ လက်သုကြွယ် စသည်ဖြင့်ဖော်ပြသည်။ ‘ရှစ်’မှာ တတောင်ဆစ်ဖြစ်သည်။ နယူးဂီနီတွင် ဤနည်းမျိုးကို ယခုတိုင်သုံးသည်။

မြင်တွေ့နေကျ အရာဝတ္ထုများကို ကိန်းသင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုပုံ



ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ကိန်းသင်္ကေတအဖြစ် အသုံးပြုပုံ



သုညကို တွေ့ရှိရင်း

သုညသဘောကို အိန္ဒိယပြည်တွင် စတင်
တီထွင်ခဲ့သည်။ သုညသဘောသည် ဥရောပ
တိုက်သို့ ရောက်သွားပြီး ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့
သိနေသော ပုံသဏ္ဌာန် ဖြစ်လာသည်။



ကိန်းစနစ်အမျိုးမျိုး (၁ မှ ၁၀ အထိ)

I II III IV V VI VII VIII IX X

ရောမကိန်းသင်္ကေတများ



ဗေဗိလိန်ယန်ကိန်းသင်္ကေတမူ၁း

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十

တရုတ်ကိုးသင်္ကေတမ္ပာဒ်



ရှေးခေတ်ဂျပန်ကိန်းသင်္ကေတများ (သစ်ချောင်းတိုများကိုအသုံးပြုသည်။)



| ||| |||| | / / / / / / /

ရှေးခေတ်ဂရိကိုနီးသင်္ကေတများ

ရှေးခေတ်အီဂျစ်ကိန်းသင်္ကေတများ

ကိန်းများကိုမှတ်ရန်ကြိုးထုံးများကို

အသုံးပြုပုံ



သမိုင်းဦး လူအချို့သည် ကိန်းပျားမှတ်ရန် ကြိုးထုံးပျားကို သုံးခဲ့ကြသည်။ ထိုစနစ်မျိုးကို တောင်အမေရိကတိုက်ရှိ အင်ကာအင်ဒီးယန်း လူမျိုးများ သုံးခဲ့သည်။ ကိန်းတစ်ခုစီအတွက် ကြိုးထုံးအစီအစဉ် တစ်မျိုးစီရှိသည်။ ကျက်မှတ် ထားရသည်။ ကြိုးပျား၏ အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို ‘ကွန်ပူ’ ဟု ခေါ်သည်။ အဖြစ် အပျက်များ မှတ်သားရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။

မတူသော အရာဝတ္ထုများကို လူများ စတင်
တွဲဖက်သည့်အချိန်မှ ကိန်းများ၏ သမိုင်းစခဲ့သည်
(တစ်-တစ်ဆက်သွယ်ချက်)။ ပစ္စည်းချင်း ပလုယ့်
ရာတွင် ကိန်းများကို မှတ်သားရန် လိုလာသည်။
လက်ချောင်းများသည် ကိန်းများရေးမှတ်ရာတွင်
မလုံလောက်ပေ။ ကိန်းများရေးမှတ်ရန် ကနဦး
အသုံးပြုသော နည်းတစ်နည်းမှာ 'အထုံးစနစ်'
ဖြစ်သည်။ အထုံးများကို ကနဦးကိန်းသင်္ကေတ
များဟု ယူဆနိုင်သည်။

တပြည်နှင့်တပြည်သုံးသောကိန်းသင်္ကေတများ မတူကြပါ။ ၁, ၂, ၃, ၄, ... ကိန်းသင်္ကေတများသည် အာရပ်တိုင်းပြည်များတွင် ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ မြန်မာ ကိန်းသင်္ကေတများသည် ၁, ၂, ၃, ၄, ... ဖြစ်သည်။ ကိန်းစနစ်အမျိုးမျိုး ရှိနေစေကာမူ ရေတွက်ရာ၌ အရေးအကြီးဆုံး သဘောတရားသည် တစ်-တစ် ဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်သည်။ သုည၏ မူလအဓိပ္ပာယ် နှင့် ပတ်သက်၍ အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပညာရှင်အချို့က သုညသည် နေကို ကိုယ်စား ပြုသည်ဟု ပြောကာ အချို့ကမူ သုညသည် နတ် မိစ္ဆာအတွက် သင်္ကေတ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သုညကို တီထွင်လိုက်ခြင်းသည် ကိန်းများ ဖွံ့ဖြိုးလာရာ တွင် အရေးကြီးသော မှတ်တိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပေသည်။ သုညကို အိန္ဒိယပြည် တွင် တီထွင်ခဲ့သည်။

ကိန်းသင်္ကေတများ

ကိန်းသင်္ကေတ (ဂဏန်းခြေများ) တို့ကို အိန္ဒိယပြည်၌စတင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် အာရပ်
တိုင်းပြည်များမှတစ်ဆင့် ဥရောပသို့ ပျံ့နှံ့သွားသဖြင့် အာရဗီကိန်းသင်္ကေတများဟု ခေါ်သည်။ ဒေါင်
လိုက်ရေးသော တရုတ် ကိန်းသင်္ကေတများကို တရုတ်ပြည်နှင့် ဂျပန်ပြည်တို့တွင် တခါတရံသုံးသည်။
နာရီခွင်ခွက်ပေါ်တွင် ရေးရန်၊ အရာဝတ္ထုများကို နံပါတ်စဉ်ထိုးရန်၊ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်တွင်
ရက်စွဲရေးရန် ရောမကိန်းသင်္ကေတများကို တခါတရံသုံးသည်။ ၁, ၂, ၃, ၄, ... ကိန်းတို့၏ အစုကို
၂, ၄, ၆, ၈, ... စုံကိန်းတို့၏ အစုနှင့် ၁, ၃, ၅, ၇, ... မကိန်းတို့၏အစု ဟူ၍ ခွဲနိုင်သည်။

မနှင်စို့ သဘာဝကိန်းများ




မြန်မာကိန်းသင်္ကေတ	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
အာရပ်ကိန်းသင်္ကေတ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
တရုတ်ကိန်းသင်္ကေတ	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十
ရောမကိန်းသင်္ကေတ	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X



ကိန်းများကို အသုံးပြု

ရေတွက်ရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် မျဉ်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ တည်နေရာကို
ဖော်ပြရန်နှင့် အရာဝတ္ထုများ၏ အစီအစဉ် (အဆင့်) ကို ဖော်ပြရန်
ကိန်းများကို အသုံးပြုသည်။ အလျား၊ အလေးချိန်၊ ထုထည်၊ အချိန်
နာရီနှင့် ကြာသောအချိန်ကို မှတ်သားရန်လည်း ကိန်းများကို အသုံး
ပြုသည်။ ၁, ၂, ၃, ၄... ကိန်းစဉ်တွင် အဆုံးမရှိပါ။

ကိန်းမျဉ်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ



ပန်းကန်ပြားထဲရှိ ပန်းသီးအရေအတွက်ကို ကိန်းမျဉ်းပေါ်ရှိ ၀, ၁, ၂, ၃, ... အမှတ်များဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

ရေတွက်ရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ကိန်းများကို အသုံးပြုခြင်း



$$3 > 1$$



$$3 = 3$$



$$3 < 4$$

ရေတွက်ရန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် ကိန်းများကို
အသုံးပြုသည်။ လက်ဝဲဘက် ပန်းခင်းတွင်
ပန်းပွင့် ၁၂ ပွင့် ရှိသည်။ လက်ယာဘက်
ပန်းခင်းတွင် ပန်းပွင့် ၇ ပွင့် ရှိသည်။ ကိန်း
များ၏ ပမာဏကို နှိုင်းယှဉ်ရန် သင်္ကေတ
များကို အသုံးပြုသည်။

> သင်္ကေတသည် 'ထက်ကြီးသည်' ဟု
ဆိုလိုသည်။

= သင်္ကေတသည် 'တူညီသည်' ဟု ဆိုလို
သည်။

< သင်္ကေတသည် 'အောက်ငယ်သည်'
ဟု ဆိုလိုသည်။

ဥပမာ $၃ > ၁$, $၃ = ၃$, $၃ < ၄$

တတန်းတည်းကျ အရာဝတ္ထုများ၏
အဆင့်ကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြခြင်း



ကိန်းများသည် တတန်းတည်းကျသော အရာဝတ္ထုများ၏ အဆင့်ကိုလည်း
ဖော်ပြနိုင်သည်။ လိမ္မော်ရောင် ရထားတိုသည် လက်ဝဲဘက်မှ တတိယ
မြောက်နှင့် လက်ယာဘက်မှ ဒုတိယမြောက်တို့ ဖြစ်သည်။

ထုထည်ကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။



အလျား သို့မဟုတ် အကွာအဝေးကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

ယခုခေတ်တွင် ကိန်းများကို နေရာတိုင်း၌ သုံးနေကြသည်။ အချို့လူတို့သည် ကိန်းများ က မည်သည့်အရာများအား ကိုယ်စားပြုသည်ကို မသိကြပေ။ ကိန်းကို ကိန်းအနေဖြင့် သာမကြည့်ပဲ ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုပုံကိုပါ လူတို့နားလည်ရန် ကြိုးစားသင့်သည်။



အလေးချိန်ကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။

အချိန်ကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။



ကိန်းများသည် အစဉ်လိုက် ရှိနေကြသည်။



ကြိုးခုန်ခြင်း



နာရီ


မက်ထရိုနိမ်း




ကိန်းစဉ် ၁, ၂, ၃, ... သည် အဆုံးမရှိ။ ၀, ၁, ၂, ၃, ... ကိန်းများ၏ အစုကို ပျဉ်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ အစုနှင့် တွဲရာတွင် အမှတ်တစ်ခုကို ရွေးလိုက်ပြီး '၀' ကိန်းနှင့် တွဲပေးကာ ထိုအမှတ်ကို မူလမှတ် ဟု သတ်မှတ်သည်။ ထို့နောက် လက်ဝဲမှ လက်ယာသို့ ရွှေ့သည်။ မူလမှတ်မှ အကွာအဝေး တစ်ခုရှိ အမှတ်ကို ပထမ အမှတ် (၁) လက်ယာဘက်ရှိ အကွာအဝေးတူ အမှတ်ကို ဒုတိယအမှတ် (၂) ဟု မှတ်သည်။ ဤနည်းအတိုင်း ဆက်လုပ်သည်။ မီးရထား တစ်စီးတွင် ပထမတွဲကို ကိန်း ၁ ဒုတိယတွဲကို ကိန်း ၂ ဖြင့် တွဲနိုင်သည်။ မီးရထား တွင် တွဲအရေအတွက် အကန့်အသတ် ရှိသည်။ သို့သော် ကိန်းများကို ပျဉ်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ အစုနှင့် တွဲသောအခါ ထိုအမှတ်များတွင် အဆုံး မှတ်မရှိ ဖြစ်နိုင်သည်။ နာရီလက်တံသည် ကိန်း တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ပတ်၍ သွားသကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ကိန်းများ၏ အစုကို ပျဉ်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ အစုနှင့်တွဲလျှင် ကိန်း များသည် တွဲသောအမှတ်များ၏ တည်နေရာကို ပြသည်။ အလျား၊ အလေးချိန်၊ ထုထည်၊ အချိန် စသည်တို့ကိုလည်း ကိန်းများဖြင့် ပြနိုင်သည်။ စန္ဒရားတီးလျှင် အချိန်ကိုမှတ်သားရန်မက်ထရိုနိမ်း ကို အသုံးပြု သည်။ မီးပြတိုက်သည် ချိန် ကိုက် ထားသော အချိန်များတွင် မီးပြသည်။ နာရီ၊ မိနစ် နှင့် စက္ကန့်လက်တံများသည် အချိန်ကို ပြသည်။ ကြိုးခုန်ရာတွင် တစ်၊ နှစ်၊ သုံး စသည်ဖြင့်ရေတွက် ကြသည်။



ကိန်းများကို ရေးမှတ်ရန် ဆယ်လီစနစ်ကိုသုံးသည်။ ကိန်းကြီးများ ရေးရာတွင် 'ဝ' ကိန်းသည် အရေးကြီးသည်။ ၁, ၂, ၃, ၄... ကိန်းများ သည် အဆုံးမရှိ ဆက်သွားသည်။ ဆယ်လီစနစ်အပြင် နှင်လီစနစ်၊ ငါးလီစနစ်၊ ဆယ့်နှင်လီစနစ်၊ ခြောက်ဆယ်လီစနစ်နှင့် အခြားစနစ် များလည်းရှိသည်။



၁၀၀ ဆယ်ခုသည် တစ်ထောင်ဖြစ်သည်။ ၁၀၀၀ ဟု ရေးသည်။



တစ်ဆယ်ကို ၁၀ ဟု
ရေးသည်။ ၁၀ ဆယ်
ခုသည် တစ်ရာ ၁၀၀
ဖြစ်သည်။

သုညနှင့် ကိန်းကြီးများ




ငါးအရေအတွက် ‘ဝ’ သည် ငါးတစ်ကောင်
ပျံ မရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ငါး ၁၀ ကောင်
သည် ငါးတစ်ဆယ်ကောင် ဟု ဆိုလိုပြီး၊
ငါး ၁၀၀ ကောင်သည် ငါးတစ်ရာကောင်ကို
ဆိုလိုသည်။ ‘ဝ’ ကို အသုံးပြုကာ ကိန်းကြီး
များကို အလွယ်တကူ ရေးနိုင်သည်။

ဆင့်စေ့များကို သင် မည်သို့ ရေတွက်မည်နည်း။ ဆင့်စေ့ ဆယ်ခုလျှင် တစ်စုထား၍ ရေတွက်လျှင် လွယ်ကူသည်။ ဆင့်စေ့ ဆယ်ခုပါသော အစုသုံးခု ရှိလျှင် ဆင့် ၃၀ (သုံးဆယ်) ရှိသည်။ အကယ်၍ ဆင့်စေ့ ဆယ်စေ့ ပါသော အစုပေါင်း ဆယ်ခုရှိလျှင်

အရေအတွက်သည် တစ်ရာဖြစ်ပြီး ၁၀၀ ဟု ရေးသည်။ ကိန်း ၄၅ တွင် လေးဆယ်နှင့် ငါးခု ပါဝင်သည်။ လေးဆယ်ငါးခုဟု ဖတ်သည်။ ကိန်း ၂၄၅ တွင် တစ်ရာနှစ်ခု တစ်ဆယ်လေးခုနှင့် တစ် ငါးခု ပါဝင်သည်။ နှစ်ရာလေးဆယ်ငါးဟု ဖတ်သည်။

တစ်ရာ ဆယ်ခုကို ၁၀၀ ဟု ရေးသည်။ ၎င်းကိန်းကို တစ်ထောင်ဟု ဖတ်သည်။ တစ်ဆယ်ကို အခြေခံသော အထက်ပါ ရေးနည်းကို 'ဆယ်လီစနစ်' ဟု ခေါ်သည်။ ၂၄၅ တွင် ၂ သည် ရာနေရာ ၄ သည် ဆယ်နေရာနှင့် ၅ သည် ခုနေရာ၌ ရှိကြသည်။




ဓာတ်ငွေ့မီတာတွင် ဆယ်လီစနစ်ကို သုံးသည်။



ရေငွေမှတ်စက်တွင် ဆယ်လီစနစ်ကို သုံးသည်။

နှစ်ရာ လေးဆယ် ငါးကို ရေးနည်း



ကိန်းတစ်ခုတွင် လက်ယာဘက် အစွန်ဆုံးသည် ခု သို့မဟုတ် ယူနစ် အရေအတွက်။ လက်ဝဲဘက်သို့ ရွေ့လျှင် ကပ်နေသော ဂဏန်းသည် ဆယ်၊ နောက်ဂဏန်းသည် ရာ အရေအတွက်တို့ ဖြစ်သည်။ နှစ်ရာလေးဆယ်ငါးသည် တစ်ရာနှစ်ခု၊ တစ်ဆယ်လေးခုနှင့် တစ် ငါးခု ဖြစ်သည်။ ထိုကိန်းကို ၂၄၅ ဟု ရေးသည်။



ကိန်းများသည် အဆုံးမရှိ ဆက်လက် ကြီးသွားသည်။

အသုံးများသော အာရဗီကိန်းသင်္ကေတများသည် ကိန်းကြီးများရေးရာတွင် အဆင်ပြေသော ဆယ်လီစနစ်ကို အခြေခံသည်။ ကိန်းသင်္ကေတတစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် ထိုသင်္ကေတ၏ တည်နေရာပေါ်၌ မှီသည်။ ၎င်းတန်ဖိုးသည် လက်ဝဲဘက်သို့ တစ်နေရာ ရွေ့တိုင်း ဆယ်ဆ တိုးသွားသည်။ ရောမကိန်း သင်္ကေတတွင် နေရာလိုက် တန်ဖိုးအသုံးပြုခြင်းမျိုး မရှိ။ ကိန်း ၃၃၇ ကို CCCXXXVII ဟု ရေးသည်။ ထိုသို့ ရေးခြင်းထက် ၃၃၇ ဟု ရေးခြင်းက ပိုမိုလွယ်ကူကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ ကိန်းကြီးများကို ရေးရာ၌ အသုံးပြုနိုင်သော စနစ်များတွင် ဆယ်လီစနစ်အပြင် အခြားစနစ်များလည်း ရှိသေးသည်။

ဥပမာ နှစ်လီစနစ်ကို ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြု၍ ငါးလီစနစ်ကို ပေသီးခုံတွင် အသုံးပြုသည်။ ဆယ်နှစ်လီစနစ်ကို ပစ္စည်းများအား ဒါဇင်လိုက် ရေတွက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ပေကို လက်မ ဖွဲ့ရာတွင်လည်းကောင်း သုံးသည်။ (၆၀ ကို အခြေခံသော) ခြောက်ဆယ်လီစနစ်ကို အချိန်နှင့်ထောင့်များ ဖော်ပြရာတွင်သုံးသည်။ (တစ်မိနစ်တွင် ၆၀ စက္ကန့်) ရောမကိန်း သင်္ကေတများ ဂရိကိန်း သင်္ကေတများနှင့် မာယာကိန်း သင်္ကေတများသည် ငါးလီစနစ်ကို အခြေခံကြသည်။ အီဂျစ်ကိန်းသင်္ကေတ ဗေဘီလုံ ကိန်းသင်္ကေတများသည် ဆယ်လီစနစ်ကို အခြေခံကြသည်။


စမ်းကြည့်ကြစို့

- (၁) စာမျက်နှာ ၁၁ သို့ လှန်ပြီး ပုံအောက်ခြေတွင် ဘောင်းဘီဖြုတ်၍ ချိတ်ကလာသော အမျိုးသား ဦးရေကို ရေတွက်ပါ။
- (၂) ဆယ်လီစနစ်ကို သုံးသော ရေတွက်နည်းများအတွက် ဥပမာများကို ရှာကြည့်ပါ။
- (၃) အောက်ပါကိန်းများကို ဖတ်ပါ။
၄၆၃ ၈၉၃ ၄၆၅၂

နှစ်လီစနစ်

နှစ်လီစနစ်သည် တစ်ဆယ်အစား နှစ်ကို အခြေခံသည်။ 'ဝ' နှင့် '၁' ကိုသာ အသုံးပြု၍ မည်သည့် ကိန်းကိုမဆို ရေးနိုင်သည်။ ၂ နေရာတွင် ၁၀ (တစ်-သုည) ကို ရေး၍ ၃ နေရာတွင် ၁၁ (တစ်-တစ်) ကို ရေးသည်။ ၁၁ တွင် ၂ ၏ နေရာ၌ တစ် ရှိပြီး ၁ ၏နေရာတွင် တစ်ရှိသည်။ ပေါင်းလျှင် ၃ ရသည်။ ၄ ကို ၁၀၀ (တစ်-သုည-သုည) ၅ ကို ၁၀၁ (တစ်-သုည-တစ်) ၆ ကို ၁၀၀၀ နှင့် ၁၆ ကို ၁၀၀၀၀ ဟု ရေးသည်။ အောက်တွင် ဆယ် လီ စနစ်ကို အမည်းရောင်၊ နှစ်လီစနစ်ကို အနီရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။ ကိန်းနှင့်လိုက်သော ပေးသီးနေရာ ကို ပုံတွင်ပြထားသည်။

အပေါ်တန်းရှိကိန်းများသည် နေရာလိုက်တန်းဖိုးများကို ဖော်ပြသည်။



ပေးသီးများ၏ တည်နေရာများသည် တစ်၏နေရာ၊ နှစ်၏နေရာ၊ လေး၏ နေရာ စသည်တို့ကို 'ဝ' သို့မဟုတ် '၁' တို့ဖြင့်ပြသည်။ အပေါ်ဘက်တွင် ရှိသော ပေးသီးသည် ထိုနေရာ၌ ၁ ရှိကြောင်းပြ၍ အောက်တွင်ရှိ ပေးသီးသည် 'ဝ' ရှိကြောင်းပြသည်။

1 1	5 $5 = 4 + 0 + 1$ 101	13 $13 = 8 + 4 + 0 + 1$ 1101
2 $2 = 2 + 0$ 10	6 $6 = 4 + 2 + 0$ 110	20 $20 = 16 + 0 + 4 + 0 + 0$ 10100
3 $3 = 2 + 1$ 11	7 $7 = 4 + 2 + 1$ 111	29 $29 = 16 + 8 + 4 + 0 + 1$ 11101
4 $4 = 4 + 0 + 0$ 100	8 $8 = 8 + 0 + 0 + 0$ 1000	31 $31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1$ 11111



ငါးလီစနစ်တွင် လက်ချောင်းများသုံးကာ ရေတွက်ကြသည်။ (အပေါ်ပုံ) ပေးသီးဖြင့် တွက်ရာတွင် ငါးလီစနစ်ကို သုံးသည်။ (အောက်ပုံ)




1	1	9	1001	17	10001	25	11001
2	10	10	1010	18	10010	26	11010
3	11	11	1011	19	10011	27	11011
4	100	12	1100	20	10100	28	11100
5	101	13	1101	21	10101	29	11101
6	110	14	1110	22	10110	30	11110
7	111	15	1111	23	10111	31	11111
8	1000	16	10000	24	11000	32	100000

နှစ်လီစနစ်ဖြင့်ရေးထားသော ၁ မှ ၃၂ အထိ ကိန်းများ။ (အပေါ်ပုံ) ဆယ်နှစ်လီစနစ်အရ ခဲတံကို ၁၂ ချောင်းပါသေတ္တာတွင်ထည့်သည်။ (အောက်ပုံ)






နာရီသည် ခြောက်ဆယ်လီစနစ်ကို သုံးသည်။ တစ်နာရီ ၆၀ မိနစ်၊ တစ်မိနစ် ၆၀ စက္ကန့်နှင့် ညီသည်။



ထောင့်တိုင်း ကိရိယာသည် ခြောက်ဆယ်လီစနစ်၏ ဥပမာ ဖြစ်သည်။ တစ်ဒီဂရီသည် ၆၀ မိနစ်၊ တစ်မိနစ်သည် ၆၀ စက္ကန့်နှင့် ညီသည်။



ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ တည်နေရာများကို သတ်မှတ်ရာတွင် ဒီဂရီနှင့် မိနစ်အခြေခံသော ခြောက်ဆယ်လီစနစ်ကို အသုံးပြုသည်။

ကိန်းစနစ်များ

ဆယ်လီစနစ်သည် အများသုံးရေတွက်စနစ်ဖြစ်သည်။ အခြားစနစ်များလည်း ရှိသေးသည်။ နှစ်ကိုအခြေခံသော နှစ်လီစနစ်ကို ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြုသည်။ ငါးကို အခြေခံသော ငါးလီစနစ်ကို ပေသီးခုံတွင် သုံးသည်။ ဆယ်နှစ်ကို အခြေခံသော ဆယ်နှစ်လီ

စနစ်ကို ဒါဇင်လိုက် ရေတွက်ရာတွင် သုံးသည်။ ခြောက်ဆယ်ကို အခြေခံသော ခြောက်ဆယ်လီစနစ်ကို ထောင့်နှင့်အချိန်တိုက်ဖော်ပြရာ၌ အသုံးပြုသည်။ အမှန် အသုံးပြုထားသော ကိန်းများသည် ဆယ်လီစနစ်အရ ရေးထားသော ကိန်းများသာ ဖြစ်သည်။

ကိန်းရေးနည်းတွင် သမိုင်းကြောင်း ရှိသည်။ ကနဦးတွင် ကိန်းများရေတွက်ရန်ဂဏန်းငါးလုံး (လက်လေး ချောင်းနှင့် လက်မ တစ်ချောင်း) ကို သုံးခဲ့ကြ၏။ ထို့နောက် ဂဏန်းဆယ်လုံးကို အသုံးပြုခဲ့ကြ၏။ နောက်ပိုင်းတွင် ဆယ်လီစနစ်သည် တိုးတက်လာသည်။



ရွှင်မြူးစရာ ကိန်းသင်္ချာ

ရှေးအခါက ဂျပန်ပြည်တွင် တန်ခိုးကြီးသော စစ်သူကြီး တို့ယိုတိုမိ ဟိဒေးယောဂျိ အုပ်ချုပ်စဉ် ပညာထက်မြက်သည့် ဆိုရိုရိုရှင် ဇေ မွန်ခေါ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိခဲ့သည်။ တနေ့တွင် ဟိဒေးယောဂျိ သည် ဆိုရိုရို အား ချီးမြှင့်လိုသဖြင့် အလိုရှိရာ တောင်းခိုင်းသည်။ ဆိုရိုရိုက ကျွန်တော့်အား ယနေ့အတွက် ဆန်တစ်စေ့၊ နက်ဖြန် ဆန်နှစ်စေ့၊ နောက်တနေ့ ဆန်လေးစေ့၊ ထို့နောက် တနေ့ ဆန်ရှစ်စေ့၊ ရက်သုံးဆယ် အထိ နှစ်ဆစီတိုးပေးပါ' ဟု တောင်းသည်။ ဟိဒေးယောဂျိက မဖြစ်လောက်ဟု ယူဆကာ ပေးမည်ဟု ဆိုသည်။ ရက်သုံးဆယ်မြောက် နေ့တွင် ဆိုရိုရိုက စပါးကျီတစ်လုံး ဆွဲနိုင်မည့် ထည့်စရာ အဝတ်စကြီးတစ်ခုဖြင့် စောင်နေသည်ကို ဟိဒေးယောဂျိက ကြည့်ကာ အံ့အားသင့် နေသည်။ ဆိုရိုရိုက 'အရှင်၏ ဆုလာဘ်ဖြစ်သည့် ဆန်များကို သယ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်' ဟု ပြောသည်။

$၁ + ၂ + ၄ + ၈ + ၁၆ + ၃၂ + ၆၄ \dots$ ကို ရက်သုံးဆယ်အတွက် ပေါင်းသော် ဆန်စေ့ပေါင်း ၁၀၇၃၇၄၁၈၂၃ ရမည် ဖြစ်သဖြင့် ထိုဆန်များထည့်ရန် ကျီတစ်ခုလိုမည်ဟု ရှင်းပြလေသည်။

အပေါင်း

တူသောအစိတ်အပိုင်း မရှိသည့် အစုနှစ်ခု၏ နှောခြင်းကို ထိုအစုနှစ်ခု၏ ‘ပေါင်းလဒ်’ ဟု ခေါ်သည်။ ပန်းသီးသုံးလုံး၏ အစုနှင့် ပန်းသီး နှစ်လုံး၏ အစုတို့၏ ပေါင်းလဒ်တွင် ပန်းသီး ငါးလုံး ပါဝင်သည်။ ပေါင်းလဒ်၏ အစုဝင် အရေအတွက်သည် မူလအစုနှစ်ခု၏ အရေ အတွက်ပေါင်းနှင့် ညီသည်။ ကိန်းနှစ်ခု၏ ပေါင်းလဒ်ရှာခြင်းကို ထိုကိန်းနှစ်ခု ‘ပေါင်းခြင်း’ ဟု ခေါ်သည်။ ပေါင်းရာတွင် တခါတရံ ခုနစ်ရာမှ ဆယ်နေရာသို့ စသည်ဖြင့် ပွဲကိန်းရှိတတ်သည်။

ပေါင်းလဒ်နှင့် ပေါင်းခြင်း



ဘောလုံးကစားနေသော ယောက်ျားကလေး လေးယောက် အစုနှင့် အရုပ်ဖြင့် ကစားနေသော မိန်းကလေး သုံးယောက် အစုတို့တွင် တူသော အစိတ်အပိုင်း မရှိ။ အစုနှောခြင်းသည် ပေါင်းလဒ် ဖြစ်သည်။ ပေါင်းလဒ်တွင် ကလေးခုနစ်ယောက် ရှိသည်။

$$4 + 3$$



သစ်ပင်ပေါ်တွင် ငှက်လေးကောင် ရှိသည်။ နှောက်ထပ် သုံးကောင် လာနားသည်။ လေးကို သုံးပေါင်းလျှင် ခုနစ်ဖြစ်သည်။

$$4 + 3$$

လေးနှင့်သုံး၏ ပေါင်းလဒ်သည် ခုနစ်ဖြစ်သည်။

တူသောအစိတ်အပိုင်း မရှိသည့် အစုနှစ်ခု နှောခြင်းကို ထိုအစုများ၏ ပေါင်းလဒ် ဟု ခေါ်သည်။ ယောက်ျားကလေး လေးယောက် အစုနှင့် မိန်းကလေး သုံးယောက် အစုတို့၏ ပေါင်းလဒ်တွင် ကလေး ခုနစ်ယောက် ပါဝင်သည်။ ငှက်သုံးကောင်ကို ငှက်လေးကောင် အစုတွင် ပေါင်းသော် ငှက် ခုနစ်ကောင် အစု ရသည်။ ၄ ကို ၃ နှင့် ပေါင်းခြင်းကို ၄ + ၃ ဟု ရေးသည်။ (လေးအပေါင်း သုံးဟုဖတ်ပါ။) လေးနှင့်သုံး၏ ပေါင်းလဒ်သည် ခုနစ်ဖြစ်သည် ကို ၄ + ၃ = ၇ ဟု ရေးသည်။ (လေးအပေါင်းသုံးညီမျှခြင်းခုနစ်ဟု ဖတ်ပါ။)


ကိန်းများ၏ ပေါင်းခြင်းကိုလေ့ကျင့်ရန် ကတ်ပြား ကစားနည်းကို အသုံးပြု နိုင်သည်။ ဥပမာ ကတ်ပြားရွှေဘက်တွင် ၄ + ၃ ရေး၍ ကျောဘက်တွင် ပေါင်းလဒ် ၇ ကို ရေးပါ။ နောက်ကျော၌ ၆ ရှိသော ကတ်ပြားများ၏ ရွှေဘက်တွင် ၅ + ၁, ၄ + ၂ သို့မဟုတ် ၃ + ၃ ရှိမည်။ ကတ်ပြားများ၏ ရွှေဘက်ကို လှန်၍ ချထားရမည်။ ဒီဇင်က ကိန်းများကို အော်ရမည်။ ၅ ဟု အော်လျှင် ၁ + ၄, ၃ + ၂ သို့မဟုတ် ၄ + ၁ တို့ကို ကောက်ယူရမည်။ ကတ်ပြား အများဆုံးရသည့် အနိုင်ရသည်။

ကတ်ပြားကစားနည်း



ဤကစားနည်းကို သုံးယောက်မှ ငါးယောက်အထိ ကစားနိုင်သည်။ ခိုင်က ကတ်ပြားများ ပေါ်ရှိ ပေါင်းလဒ် တန်ဖိုးတစ်ခုကို အော်လျှင် ကစားသူများက ထိုပေါင်းလဒ်ရမည့် ကတ်ပြားများကို ရွေးရသည်။ အများဆုံးရွေးနိုင်သူ အနိုင်ရသည်။

ကလေးနှစ်ယောက် + ခွေးကလေးသုံးကောင်




ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်နှင့် ခွေးတစ်ကောင်ပါသောအစုနှင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် နှင့် ခွေးနှစ်ကောင်ပါအစုတို့၏ နှော့ခြင်းသည် ကလေးနှစ်ယောက်နှင့် ခွေးသုံးကောင်ပါသော အစုဖြစ်သည်။ အပေါင်းလက္ခဏာ (+) ကို ကိန်းနှစ်ခုကြားတွင်သာ ရေးရသည်။

အပေါင်းပုစ္ဆာများတွက်ခြင်း


ပိုကိန်းမပါသောအပေါင်း

၂၃ နှင့် ၃၄ ကို ပေါင်းရန်။ 'ခ' နေရာရှိ ၃ နှင့် ၄ ကို ပေါင်းပါ။ ရသည့် ၇ ကို ခုနေရာ၌ ရေးပါ။ ထို့နောက် 'ဆယ်' နေရာရှိ ၂ နှင့် ၃ ပေါင်းပြီး ရသည့် ၅ ကို ရေးပါ။ ပေါင်းလဒ်သည် ၅၇ ဖြစ်သည်။



ပိုကိန်းပါသောအပေါင်း

၅၇ နှင့် ၆၅ ကို ပေါင်းရန်။ 'ခ' နေရာရှိ ၇ နှင့် ၅ ကို ပေါင်းပြီး ရသည့် ၁၂ မှ ၂ ကို ခုနေရာတွင် ရေးပါ။ ဆယ်နေရာသို့ ၁ ပိုပြီး ၅ နှင့် ၆ တို့နှင့် ထည့်ပေါင်းပါ။ ၁၂ ရသည်။ ၁ ကို ရာ နေရာသို့ ပို့ရမည်။ ပေါင်းလဒ်သည် ၁၂၂ ဖြစ်သည်။



ခမ်းကြည့်ကြစို့


$$\begin{array}{r} 243 \\ + 625 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 104 \\ + 298 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 478 \\ + 588 \\ \hline \end{array}$$

လူ ၉၈ ယောက်ကို လိမ္မော်သီး တစ်လုံးကျ ပေးရာ လိမ္မော်သီး ၂၇ လုံးကျန်သည်။ မူလက လိမ္မော်သီး မည်မျှရှိသနည်း။

$$57 + 65 = 122$$

ခြားနားခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်း

အစုတစ်ခုသည် အခြားအစုတစ်ခုထဲတွင် ပါဝင်လျှင် ဒုတိယအစုထဲရှိ ပထမအစု၏ ပြည့်ဖက် အစုကို ထိုအစုနှစ်ခု၏ 'ခြားနားခြင်း'ဟု ခေါ်သည်။ ပန်းသီး ၃ လုံးနှင့် ၂ လုံးတို့၏ ခြားနားခြင်းသည် ၁ လုံးဖြစ်သည်။ အနုတ်သည် အပေါင်း၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ ၄ နှင့် ၃ ကို ပေါင်းလျှင် ၇ ရသည်။ ၇ မှ ၃ ကို နုတ်လျှင် ၄ ရသည်။ ပန်းသီး ၃ လုံး အစုနှင့် ၇ လုံး အစုတို့၏ ခြားနားခြင်းကို ၇ မှ ၃ ကို နုတ်ခြင်းဖြင့် ရသည်။ အနုတ်တွင် တခါတရံ တန်ဖိုး မြင့်နေရာမှ ကိန်းကို ချေးရသည်။ ကိန်းတစ်ခုကို အခြားတစ်ခုမှ နုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုကိန်းတို့၏ ခြားနားခြင်းကို ရသည်။ ငယ်သောကိန်းထဲမှ ကြီးသောကိန်းကို မနုတ်နိုင်။



ခြားနားခြင်း

ကန်ထဲရှိ ဖား ခြောက်ကောင်အနက် နှစ်ကောင်သည် ကြာရွက်ပေါ်၌ ရှိသည်။ ဒုတိယအစုဖြစ်သော ကြာရွက်ပေါ်ရှိ ဖား အစုနှင့် ကန်ထဲရှိ ဖားအစုတို့ ခြားနားခြင်းသည် ကျွန်းပေါ်ရှိ ဖားအစု ဖြစ်သည်။

$$6 - 2$$



နုတ်ခြင်း

ခြံထဲတွင် နွားခြောက်ကောင် ရှိသည်။ နှစ်ကောင်ကို လယ်သမားက ထုတ်ယူသွားသည်။ ၆ မှ ၂ ကို နုတ်ခြင်းဖြင့် ခြံထဲတွင် ကျန်ခဲ့သော နွားအရေအတွက်ကို ရသည်။

$$6 - 2$$

ဖား ၂ ကောင်အစုနှင့် ဖား ၆ ကောင်အစု သို့မဟုတ် နွား ၂ ကောင်အစုနှင့် နွား ၆ ကောင် အစုတို့၏ ခြားနားခြင်းကို ၆ မှ ၂ ကို နုတ်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ အဖြေသည် ၄ ဖြစ်သည်။

ကိန်းကစားနည်း





'ဝ'မှ ၁၀ အထိ ကိန်းများရေးထားသော ကတ်ပြားနှစ်ပုံ အနက် တစ်ပုံကို စားပွဲပေါ်တွင် ဖြန့်ကြဲထားပါ။ ဒိုင်က အခြားတစ်ပုံကို မှောက်လျက်ထားပြီး ကိန်းတစ်ခု (ဥပမာ ၇) ကို ပြသည်။ ကစားသူများသည် ထိုပြသောကိန်းနှင့် ၁၀ တို့၏ ခြားနားခြင်းကို ဖြစ်စေသော ကတ်ပြားကို ရှာဖွေ ကောက်ပြရသည်။ (၃ ပါသော ကတ်ပြားကို ကောက်ပြရန် ဖြစ်သည်။) ဒိုင်သည် ကတ်ပြားများကို တလှည့်စီဆက်ပြသွား၍ ကစားသူများက ခြားနားခြင်းကို ပြသော ကတ်ပြားကို ရှာဖွေ ကောက်ယူကြသည်။ ကတ်ပြား အများဆုံး ရသူသည် အနိုင်ရသည်။

အနုတ်ပုစ္ဆာများတွက်ခြင်း

ချေးငှားမှုပါသောအနုတ်

$$35 - 13$$

$$245 - 123$$





$$35 - 13 = 22$$

$$245 - 123 = 122$$

ချေးငှားမှုပါသောအနုတ်

$$32 - 18$$

$$343 - 154$$



$$32 - 18 = 14$$

$$343 - 154 = 189$$

စမ်းကြည့်ကြစို့

$$\begin{array}{r} 98 \\ - 45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 184 \\ - 67 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 836 \\ - 568 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 980 \\ - 881 \\ \hline \end{array}$$

(၂) စက်ရုံတစ်ရုံတွင် အလုပ်သမား ၄၃၈ ယောက် ရှိသည်။ ၇၅ ယောက်သည် အမျိုးသမီးများ ဖြစ်လျှင် အမျိုးသား မည်မျှ ရှိသနည်း။

(၃) ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေါ်လ်လုံး ၇၀ ထပ်ရသည့်အခါ ဂေါ်လ်လုံး ၃၄၅ ဖြစ်လာသည်။ အစက နည်း ခွဲ ဂေါ်လ်လုံး မည်မျှရှိသနည်း။

ကိန်းတစ်ခုကို အခြား ကိန်းတစ်ခုမှ နုတ်ရာတွင် ဖြစ်ပေါ်တတ်သည့် အချက်များကို အထက်ပါ အနုတ်ပုစ္ဆာ လေးပုဒ်က ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြသည်။ အနုတ်တမျိုးစီကို လေ့လာ၍ အဖြေမည်သို့ရသည်ကို နားလည်အောင်ကြည့်ပါ။ တည်ကိန်းကို အနီရောင်၊ နုတ်ကိန်းကို အပြာရောင်နှင့် အဖြေခြားနားခြင်းကို အဝါရောင်တို့ဖြင့် ပြထားသည်။




ကိန်းတစ်ခုကို အခြားကိန်းတစ်ခုမှ နုတ်လျှင် ခြားနားခြင်းသည် ဒုတိယကိန်း (တည်ကိန်း) အောက် ငယ်သည်။ ဥပမာ $၇၀ - ၃၀ = ၄၀$ သည် ၇၀ အောက် ငယ်သည်။ ခြားနားခြင်း ၄၀ သည် တည်ကိန်း ၇၀ က အနုတ်ကိန်း ၃၀ ထက် မည်မျှကြီးသည်ကိုပြသည်။ လက်ဝဲဘက်ပုံတွင် ပန်းသီး ၃ လုံးနှင့် ကလေး ၅ ယောက် ရှိသည်။ ကလေး တဦးစီ သည် ပန်းသီးတလုံးစီကို လိုချင်ကြသည်။ ကလေး နှစ်ယောက်သည် ပန်းသီးတလုံးမျှမရနိုင်။ အနုတ်ကိန်းများကို အသုံးပြု၍ ၃ မှ ၅ ကို မည်သို့နုတ်သည်ကို မကြာမီတွေ့ရမည်။

အပေါင်းနှင့်အနုတ်


အနုတ်သည် အပေါင်း၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ $၆-၁+၂-၃$ ကို တွက်ရန် ပထမကိန်းနှစ်လုံးကို ဦးစွာရှင်းပြီး လက်ဝဲမှလက်ယာသို့ ရှေ့တွက်သွားရမည်။ သို့ရာတွင် ကွင်းထဲ၌ ကိန်းများရှိလျှင် ၎င်းတို့ကို အရင်ရှင်းရမည်။

အပေါင်း



၅ နှင့် ၃ ပေါင်းရန်။ မျဉ်းပေါ်ရှိ ကိန်း ၅ မှ စ၍ ရှေ့သို့ ၃ မှတ်ချုပ်ပါ။ ကိန်း ၈ သို့ ရောက်မည်။ ၎င်းသည် ၅ နှင့် ၃ တို့၏ ပေါင်းလဒ် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် $၅+၃=၈$ ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအတိုင်း $၃+၃$ နှင့် $၅+၈$ တို့ကို ကြိုးစားတွက်ကြည့်ပါ။

အနုတ်




၈ မှ ၃ ကို နုတ်ရန်။ မျဉ်းပေါ်ရှိ ကိန်း ၈ မှ စ၍ နောက်သို့ ၃ မှတ် ပြန်ဆုတ်ပါ။ ကိန်း ၅ သို့ ရောက်မည်။ ထို့ကြောင့် $၈-၃=၅$ ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအတိုင်း $၅-၂$ နှင့် $၁၀-၆$ တို့ကို ကြိုးစားတွက်ကြည့်ပါ။

$$A + B = C$$

$$C - B = A \quad C - A = B$$


ကိန်း A နှင့် ကိန်း B (ဥပမာ ၅ နှင့် ၃) တို့ကို ပေါင်းရာ၊ ပေါင်းလဒ် C (ဤနေရာတွင် ၈) ကို ရသည်ဆိုပါ။ ထို့ကြောင့် $A+B=C$ ။ တဖန် ပေါင်းလဒ် C မှ B ကို နုတ်သော် A ရသည်။ ထို့ကြောင့် $C-B=A$ နှင့် $C-A=B$ ရသည်။ အနုတ်သည် အပေါင်း၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။

ကွင်းများပါသော တွက်ချက်မှု



$၇-(၃+၂)$ ကို တွက်ရန်။ ကွင်းထဲရှိ $၃+၂$ ကို ဦးစွာ ရှင်းရမည်။ ထိုအခါ $၃+၂=၅$ ရသည်။ ၅ ကို $၃+၂$ ၏ နေရာတွင်ထည့်၍ ဆက်တွက်သော် $၇-၅=၂$ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် $၇-(၃+၂)=၂$ ရသည်။ $၁၂-(၆+၃)$ နှင့် $၁၅-(၂+၃+၅)$ တို့ကို ကြိုးစားတွက်ကြည့်ပါ။

အပေါင်းနှင့်အနုတ် တွဲသုံးခြင်း




$$13 - 6 + 2 - 5 = 4$$

$၁၃-၆+၂-၅$ ကိုတွက်ရန်။ ပထမကိန်းနှစ်လုံးကို ဦးစွာရှင်းရမည်။ ထိုအခါ $၁၃-၆=၇$ ရသည်။ ၇ ကို $၁၃-၆$ ၏နေရာတွင်ထည့်လျှင် $၇+၂-၅$ ၊ တဖန် ၇ နှင့် ၂ ကိုတွက်သော် $၇+၂=၉$ ရသည်။ ၉ ကို $၇+၂$ ၏ နေရာ၌ ထည့်သော် $၉-၅$ ရသည်။ ၉ မှ ၅ နုတ်သော် $၉-၅=၄$ ရသည်။ ထို့ကြောင့် $၁၃-၆+၂-၅=၄$ ဖြစ်သည်။

အပေါင်း စည်းမျဉ်းများ

ပေါင်းရာတွင် ကိန်းနှစ်လုံး၏ အစီအစဉ် ပြောင်းသော်လည်း ပေါင်းလဒ်သည် မပြောင်းပေ။ ဤစည်းမျဉ်းကို ‘အပေါင်းဖလှယ် နည်းဥပဒေ’ ဟု ခေါ်သည်။ ကိန်း A, B, C တို့အတွက် $(A + B) + C = A + (B + C)$ ဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းကို ‘အပေါင်းဖက်စပ်နည်းဥပဒေ’ ဟု ခေါ်သည်။

အပေါင်းဖလှယ်နည်းဥပဒေ




လိမ္မော်သီး ၄ လုံး အစုနှင့် ငှက်ပျောသီး ၃ လုံးအစုတို့၏ နှောခြင်းသည် ငှက်ပျောသီး ၃ လုံးအစုနှင့် လိမ္မော်သီး ၄ လုံးအစုတို့၏ နှောခြင်းနှင့် တူသည်။ နှောခြင်း နှစ်ခုစလုံးတွင် သစ်သီး ၇ လုံးစီပါဝင်သည်။

$$A + B = B + A$$


ကိန်းနှစ်လုံးကို အစီအစဉ်ပြောင်း၍ပေါင်းသော်လည်း ပေါင်းလဒ်သည် မပြောင်းလဲပေ။ A နှင့် B တို့သည် ကိန်းများဖြစ်လျှင် $A + B = B + A$ ဤစည်းမျဉ်းကို အပေါင်းဖလှယ်နည်းဥပဒေဟု ခေါ်သည်။

အပေါင်းဖက်စပ်နည်းဥပဒေ



‘ဂျီး’သည် ပန်းသီး ၄ လုံးနှင့် လိမ္မော်သီး ၃ လုံးကို ဦးစွာဝယ်ပြီးနောက် ကျွဲကောသီး ၅ လုံးကို ထပ်ဝယ်သည်။ ‘ဂျီး’ဝယ်ခဲ့သော သစ်သီးစုစုပေါင်းမှာ ၁၂ လုံးဖြစ်သည်။

$$(4 + 3) + 5 = 12$$



‘ဂျိန်း’သည် ပန်းသီး ၄ လုံးဝယ်ခဲ့သည်။ ယခင်က ‘ဂျိန်း’သည် လိမ္မော်သီး ၃ လုံးနှင့် ကျွဲကောသီး ၅ လုံးထူးထူးခြားခြား ဝယ်ခဲ့သော သစ်သီးပေါင်းမှာ ၁၂ လုံးဖြစ်သည်။

$$4 + (3 + 5) = 12$$

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

A, B နှင့် C ကိန်းသုံးလုံးအတွက် $(A + B) + C = A + (B + C)$ ဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းကို အပေါင်းဖက်စပ်နည်းဥပဒေဟု ခေါ်သည်။


ကိန်းတစ်ခုကို အကြိမ်ကြိမ် ပေါင်းလိုလျှင် အမြောက်ကို အသုံးပြုရမည်။ ဥပမာ ၅ သုံးကြိမ်ကိုရရန် ၅ ကို ၃ နှင့် မြောက်ရမည်။ ကိန်းနှစ်လုံးမြောက်ရာတွင် ပိုကိန်းရခဲ့လျှင် ပိုကိန်းကို အဆင့်မြင့်နေရာသို့ ပို့ရပြီး အဆင့်မြင့်နေရာအတွက် မြောက်လဒ်တွင် ထည့်ပေါင်းရသည်။ ဤနည်းဖြင့် မြောက်လဒ်ကို ရရှိသည်။ အလီကိုကျက်ထားလျှင် အမြောက်ကို မှန်မှန်နှင့် မြန်မြန်တွက်နိုင်သည်။ (စာမျက်နှာ ၃၀ ကြည့်ပါ။)




၁၀ နှစ်ကြိမ်သည် $၁၀ + ၁၀ = ၂၀$ ဖြစ်သည်။




၁၀၀ သုံးကြိမ်သည် $၁၀၀ + ၁၀၀ + ၁၀၀ = ၃၀၀$ ဖြစ်သည်။




၂



$၂ + ၂ = ၄$





$၂ + ၂ + ၂ = ၆$



$၂ + ၂ + ၂ + ၂ = ၈$

ကလပ် ၄ ခုရှိပြီး တခုစီပေါ်တွင် ကိတ်မုန့် ၂ တုံးစီ ရှိသည်။ ကလပ် ၄ ခုပေါ်ရှိ ကိတ်မုန့် အရေအတွက်သည် ၂ လေးကြိမ် သို့မဟုတ် ၄×၂ ဖြစ်သည်။ ၄×၂ သည် $၂ + ၂ + ၂ + ၂ = ၈$ နှင့် ညီမျှသည်။

$$4 \times 2 = 8$$



၁၀ သုံးကြိမ်သည် $၁၀ + ၁၀ + ၁၀$ နှင့် ညီမျှပြီး ၃×၁၀ ဟုရေးသည်။ ထို့ကြောင့် $၃ \times ၁၀ = ၃၀$ ။ ထို့ပြင် $၁၀ \times ၃ = ၃၀$ ဖြစ်ကြောင်းကို သိသည်။ ၂၀×၁၀ ကိုတွက်ရန် ၁၀ ကို အကြိမ် ၂၀ ပေါင်းနေလျှင် ရှည်လျားနေမည်။ စာမျက်နှာ ၃၅ ရှိ အမြောက် ဥပဒေများကို အသုံးပြုလျှင် လွယ်သည်။

$၂၀ \times ၁၀ = (၂ \times ၁၀) ၁၀ = ၂ (၁၀ \times ၁၀) = ၂ \times ၁၀၀ = ၁၀၀ + ၁၀၀ = ၂၀၀$ စာမျက်နှာ ၂၉ တွင် ဖော်ပြထားသော အမြောက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများတွင် တည်ကိန်းကို အနီရောင်၊ မြောက်ကိန်းကို အပြာရောင်၊ အဖြေကို အဝါရောင်ဖြင့် ပြထားသည်။ ထိုဥပဒေများကို တဆင့်ပြီးတဆင့် လေ့လာပါ။


အမြောက်

ပိုက်နစ်မပါသောမြောက်ခြင်း

$$4 \times 12$$


$$4 \times (10+2)$$

$$4 \times 10 + 4 \times 2$$



$$4 \times 10 + 4 \times 2$$

$$40 + 8$$




ပိုက်နစ်ပါသောမြောက်ခြင်း

$$3 \times 24$$


$$3 \times (20+4)$$

$$3 \times 20 + 3 \times 4$$



$$3 \times 20 + 3 \times 4$$

$$60 + 12$$





ဂဏန်းနှစ်လုံးပါသော ကိန်းအချင်းချင်း မြောက်ခြင်း


$$26 \times 37$$

$$26 \times (30+7)$$

$$26 \times 30 + 26 \times 7$$



$$780 + 182$$



၂၆ x ၃၇ သည် ၂၆ x (၃၀ + ၇) နှင့် ညီသည်။ ဤအချက်သည် ဖြန့်ဝေနည်း ဥပဒေသကို သုံးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေသကို နောက်ပိုင်းတွင် ရှင်းပြမည်။

ကိန်းများကို မှန်မှန်နှင့်မြန်မြန် မြောက်နိုင်အောင် အလီကို အလွတ်ကျက်ထားရန် လိုသည်။ အလီကို စာမျက်နှာ (၃၀) တွင် ဖော်ပြထားသည်။

စမ်းကြည့်ကြစို့

$$\begin{array}{r} 1. \quad 13 \times 3 \\ 38 \times 4 \\ 28 \times 12 \\ \hline 18 \times 5 \\ 248 \times 8 \\ 84 \times 67 \end{array}$$

- (၂) ကားပိုင်ရှင် တစ်ဦးသည် မီးလုံး ၂၉ လုံး ဝယ်ခဲ့ရာ တစ်လုံးလျှင် ၁၆ ခေါ်လာ ပေးရသော် အားလုံးအတွက် ငွေမည်မျှ ပေးရသနည်း။
- (၃) ခဲတံ တစ်ချောင်းလျှင် ၂၅ ဆင့် တန်သည်။ ကျောင်းသား ၃၇ ယောက်ကို တစ်ယောက်လျှင် ၃ ချောင်းကျ ဝေပေးသော် ငွေမည်မျှ ကုန်မည်နည်း။

ကိန်း A ကို B အကြိမ်ပေါင်းလျှင် $B \times A$ ကို ရသည်။ $A + A + A \dots B$ အကြိမ် $= B \times A$ ဖြစ်သည်။ အလီသည် တွက်ချက်မှုအတွက် အခြေခံကျသည်။ ထို့ကြောင့် အလီယေးကို ကောင်းစွာ ကျက်မှတ် ထားရမည်။ အမြောက်ကို တတ်ကျွမ်းလျှင် အစားသင်ရန်လည်း လွယ်ကူသည်။

အမြောက်သည် သင်္ချာတွင် အခြေခံဖြစ်သောကြောင့် အလီကို သင်ယူရန် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ အလီတွင် ‘ဝ’ ဇယား၊ ‘၁’ ဇယား၊ ‘၂’ ဇယား၊ ‘၃’ ဇယား စသည်ဖြင့် ‘၉’ ဇယားအထိရှိသည်။ အလီကို အလွတ်ကျက်ရာတွင် ကတ်ပြား ကစားနည်းသည် အထောက်အကူ ပေးနိုင်သည်။

0 × 0	0 × 1	0 × 2	0 × 3	0 × 4	0 × 5	0 × 6	0 × 7	0 × 8	0 × 9
0 × 1	1 × 1	1 × 2	1 × 3	1 × 4	1 × 5	1 × 6	1 × 7	1 × 8	1 × 9
0 × 2	2 × 1	2 × 2	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8	2 × 9
0 × 3	3 × 1	3 × 2	3 × 3	3 × 4	3 × 5	3 × 6	3 × 7	3 × 8	3 × 9
0 × 4	4 × 1	4 × 2	4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6	4 × 7	4 × 8	4 × 9
0 × 5	5 × 1	5 × 2	5 × 3	5 × 4	5 × 5	5 × 6	5 × 7	5 × 8	5 × 9
0 × 6	6 × 1	6 × 2	6 × 3	6 × 4	6 × 5	6 × 6	6 × 7	6 × 8	6 × 9
0 × 7	7 × 1	7 × 2	7 × 3	7 × 4	7 × 5	7 × 6	7 × 7	7 × 8	7 × 9
0 × 8	8 × 1	8 × 2	8 × 3	8 × 4	8 × 5	8 × 6	8 × 7	8 × 8	8 × 9
0 × 9	9 × 1	9 × 2	9 × 3	9 × 4	9 × 5	9 × 6	9 × 7	9 × 8	9 × 9

အလီကို အလွတ်ကျက်ထားခြင်းဖြင့် အမြောက်အစား လွယ်ကူသည်။ ကိန်းတစ်လုံးကို ထိုကိန်းနှင့်ပင် ပြန်မြောက်လျှင် မြောက်လဒ်သည် 0×0 , ၁×၁ , ၂×၂ , ... စသည်ဖြင့် ထိုကိန်း၏ နှစ်ထပ်ကိန်းရသည်။ အလီသင် ကတ်ပြားကစားခြင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကတ်ပြားအချို့ပေါ်တွင် ၂×၃ , ၄×၆ , ၈×၈ စသည်ဖြင့် ရေးပါ။ အခြား ကတ်ပြားများပေါ်တွင် မြောက်လဒ်

များဖြစ်သော ၆, ၂၄, ၆၄ စသည်တို့ကို ရေးပါ။ ဒိုင်က မြောက်လဒ်ကို ခေါ်ပြောသောအခါ ကျန်ကစားသူများက ထိုမြောက်လဒ်ကို ဖြစ်စေသော ကတ်ပြားများကို ရှာရသည်။ ဥပမာ—တစ်ယောက်က ၆၃ ဟု ခေါ်ပြောလိုက်လျှင် ကျန်ကစားသူများက ၉×၇ သို့မဟုတ် ၇×၉ ဟု ရေးထားသော ကတ်ပြားများကို ရှာရသည်။


	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81



ဆတိုးကိန်းများနှင့် ဘုံဆတိုးကိန်းများ


မည်သည့်ကိန်းကိုမဆို အခြားကိန်း (၁, ၂, ၃, ...) ဖြင့် မြှောက်လျှင် မူလကိန်း၏ 'ဆတိုးကိန်း'များကို ရသည်။ ကိန်းတစ်ခုသည် မတူသောကိန်းနှစ်ခု၏ ဆတိုးကိန်းဖြစ်လျှင် ထိုကိန်းကို 'ဘုံဆတိုးကိန်း' ဟု ခေါ်သည်။ ကိန်းနှစ်ခု၏ ဘုံဆတိုးကိန်းများအနက် အငယ်ဆုံးကိန်းကို 'ဘုံဆတိုးကိန်းအငယ်ဆုံး' ဟု ခေါ်သည်။

၂ ၏ ဆတိုးကိန်းများ



အနီရောင်၊ အပြာရောင်ရှိသော အလံများကို တခုခြားစီထားသည်။ ကိန်းစဉ် ၁, ၂, ၃, ၄, ... တို့ကို ၂ ဖြင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် ၂ ၏ ဆတိုးကိန်းများသည် ၂, ၄, ၆, ၈, ... တို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။


၃ ၏ ဆတိုးကိန်းများ



အလံများကို အနီ၊ အပြာ၊ အဖြူ အစဉ်အတိုင်း စီထားသည်။ ကိန်းစဉ် ၁, ၂, ၃, ၄, ... ကို ၃ ဖြင့် မြှောက်သော် ၃ ၏ ဆတိုးကိန်းများသည် ၃, ၆, ၉, ၁၂, ... စသည်တို့ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

၂ နှင့် ၃ ၏ ဘုံဆတိုးကိန်းများ

အနီရောင် အလံများပေါ်ရှိ ကိန်းများသည် ၂ ၏ ဆတိုးကိန်းများ၊ အပြာရောင်အလံများပေါ်ရှိ ကိန်းများသည် ၃ ၏ ဆတိုးကိန်းများ၊ အဝါရောင်အလံများပေါ်ရှိ ကိန်းများသည် ၂ နှင့် ၃ တို့၏ ဆတိုးကိန်းများဖြစ်သည်။ ၂ နှင့် ၃ တို့၏ ဘုံဆတိုးကိန်းများတွင် ၆ သည် အငယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ၆ ကို ၂ နှင့် ၃ တို့၏ ဘုံဆတိုးကိန်း အငယ်ဆုံးဟု ခေါ်သည်။



ကိန်းတစ်ခုကို ၂, ၃, ... စသည်တို့ဖြင့် မြှောက်ခြင်းဖြင့် ထိုကိန်း၏ ဆတိုးကိန်းများကိုရသည်။ နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသောကိန်းများ၏ ဆတိုးဖြစ်နေသော ကိန်းတစ်ခုကို ထိုကိန်းများ၏ ဘုံဆတိုးကိန်းဟုခေါ်သည်။ ကိန်းနှစ်ခု၏ ဘုံဆတိုးကိန်းများ၏အနက် အငယ်ဆုံးကိန်းကို 'ဘုံဆတိုးကိန်းအငယ်ဆုံး' ဟု ခေါ်သည်။

၄ နှင့် ၆ ၏ ဘုံဆတိုးကိန်း အငယ်ဆုံးသည် အဘယ်မျှနည်း။ ကိန်းနှစ်ခုအနက် ကြီးသော ကိန်းကို ၁, ၂, ၃, ၄, ... ဖြင့် မြှောက်သော် ၆, ၁၂, ၁၈, ... ရသည်။ ထိုကိန်းများတွင် ၄ နှင့် အပြတ်စားနိုင်သော အငယ်ဆုံးကိန်းသည် ၁၂ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၄ နှင့် ၆ ၏ ဘုံဆတိုးကိန်း အငယ်ဆုံးသည် ၁၂ ဖြစ်သည်။

ကိန်းတစ်ခုတွင် အခြားကိန်းတစ်ခု အကြိမ်မည်မျှပါဝင်သည်ကိုရှာရန် အစားကို အသုံးပြုရမည်။ ၇ တွင် ၃ နှစ်ကြိမ် ပါဝင်ပြီး ၁ ကျန်သည်။ စားလဒ် ၂ အကြောင်း ၁ ဖြစ်သည်။ စားလဒ်နှင့် စားကိန်းကိုမြှောက်ပြီး အကြောင်းနှင့်ပေါင်းလျှင် တည်ကိန်းကိုပြန်ရသည်။ $၂ \times ၃ + ၁ = ၇$ ။ စားရာတွင် 'ဝ' ကြွင်းလျှင်ပြတ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ၆ ကို ၃ ဖြင့် အပြတ်စားနိုင်သည်။ ၇ ကိုမူ ၃ ဖြင့် အပြတ်မစားနိုင်။


ပန်းပွင့်များကိုဝေခြင်း



ပန်းပွင့် ၁၂ ပွင့်ကို ကလေး ၃ယောက် အညီ အမျှခွဲဝေပေးပါက ကလေးတစ်ယောက်လျှင် ၄ ပွင့်စီရမည်။ ၁၂ တွင် ၄ သုံးကြိမ်ပါဝင် သည်။ အစားသင်္ကေတ $\div$ ကို သုံး၍ အောက်ပါအတိုင်း ရေးနိုင်သည်။

$$12 \div 3 = 4$$


ကတ်ပြားများကိုဝေခြင်း



ကတ်ပြား ၁၅ ချပ်ကို ကလေး ၅ ယောက်အား တစ်ယောက် ၃ ကြိမ်စီ ဝေပေးလျှင် အားလုံး ကုန်သွားသည်။ ၎င်းသည် ၅ နှင့် ၃ မြှောက်လျှင် ၁၅ ရကြောင်း ဖော်ပြသည်။ $၃ \times ၅ = ၁၅$ ဖြစ် သည်။ ၁၅ တွင် ၅ သုံးကြိမ်ပါ သည်။ $၁၅ \div ၃ = ၅$ ဖြစ်သည်။

ကလေးတစ်ယောက်ကို ကတ်ပြားတစ်ခုစီဝေပါ။ နောက်ထပ် ကတ်ပြားတစ်ခုစီ ဝေပါ။ နောက်ထပ် ကတ်ပြားတစ်ခုစီ ဝေပါ။

အစားနှင့်အမြှောက်



ရထားစက်ခေါင်း တစ်လုံးသည် တွဲ ၁၂ တွဲကို ဆွဲသွားသည်။ ရထားတွဲ ၃ တွဲလျှင် တပိုင်း ကျစ်ဖြင့် ရထားကို လေးပိုင်း အညီအမျှ ပိုင်းသည်။ $၁၂ \div ၄ = ၃$ ဖြစ်သည်။ ၃ ကို ၄ နှင့်မြှောက်လျှင် ၁၂ ပြန်ရသည်။

$$2 \times 3 < 12 \quad 3 \times 3 < 12$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$5 \times 3 > 12 \quad 6 \times 3 > 12$$


အကြွင်းမပါသောစားခြင်း

$$42 \div 3$$

$$42 \rightarrow 10 \ 10 \ 10 \ 10$$

တစ်ဆယ်ငါးကြိမ်ကို ခုဖြင့် စားပါ။ ဆယ်နေရာတွင် ၁ လီဝင်ပြီး ခုနေရာသို့ ပို့ရန် ၁၀ ပို့မည်။

10



၁၀ကို ကျန် ၂ နှင့်ပေါင်းလျှင် 'ခု' နေရာတွင် ၁၂ ဖြစ်လာသည်။ ရလဒ် ၁၂ ကို ၃ ဖြင့် ထပ်စားလျှင် ၄ ရသည်။


1 1 1 1

$$42 \div 3 = 14$$

$$\begin{array}{r} 14 \\ 3 \overline{) 42} \\ \underline{3} \\ 12 \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$


$$132 \div 4$$

$$132 \rightarrow 100$$



၁၀၀ ကို ဆယ်နေရာသို့ ပို့လျှင်တစ်ဆယ် ၁၃ ကြိမ်ရမည်။ ၄ ဖြင့် စားသော် ဆယ်နေရာတွင် ၃ လီဝင်ပြီး ခုနေရာသို့ ပို့ရန် ၁၀ ပို့မည်။

10 10 10



၁၀ ကို ၂ နှင့်ပေါင်း၍ 'ခု' နေရာတွင် ၁၂ ဖြစ်လာသည်။ ၄ ဖြင့် စားလျှင် ၃ ရသည်။

1 1 1

$$132 \div 4 = 33$$

$$\begin{array}{r} 33 \\ 4 \overline{) 132} \\ \underline{12} \\ 12 \\ \underline{12} \\ 0 \end{array}$$

အကြွင်းမပါသောစားခြင်း



ချောကလက် ၁၄ ခုကို ကလေး ၄ ယောက်အား မည်သို့ ဝေခွဲနိုင်သနည်း။ တစ်ယောက်ကို ၃ ခုစီ ပေးလျှင် ၂ ခု ကျန်သည်။ ၁၄ ကို ၄ ဖြင့်စား၍ မပြတ်။ စားလဒ် ၃ အကြွင်း ၂ ရသည်။

$$4 \times 2 < 14 \quad 4 \times 4 > 14$$

$$4 \times 3 < 14 \quad 4 \times 5 > 14$$

$$14 \div 4 = 3 \text{ R } 2$$

ကိန်း C တွင် ကိန်း B သည် A အကြိမ်ပါဝင်လျှင် $C \div B = A$ ဟု ရေးနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် $A \times B = C$ ဟု ရေး နိုင် သည်။ အစား သည် အမြောက်၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။

စမ်းကြည့်ကြစို့

$$1. \quad 4 \overline{) 48} \quad 9 \overline{) 387} \quad 12 \overline{) 144}$$


$$26 \overline{) 494} \quad 4 \overline{) 87} \quad 31 \overline{) 463}$$

2. လူ ၃ ယောက်အတွက် ချောကလက် ၇ ဗူးဝေရမည်။ တစ်ဗူး၌ ၆ တုံးပါသည်။ တစ်ယောက်လျှင် ဘယ်နှစ်ဗူးနှင့် ဘယ်နှစ်တုံးစီ ရမည်နည်း။


အမြောက်နှင့်အစား

အစားသည် အမြောက်၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။ အကြွင်းသည် စား ကိန်းအောက်ငယ်သည်။ တွက်ချက်မှုတွင် အပေါင်း၊ အနှုတ်၊ အမြောက်၊ အစားပါနေလျှင် ရှေးဦးစွာ အမြောက်နှင့်အစားကို တွက်ရမည်။ ကွင်း များပါလျှင်မူ ထိုကွင်းများကို ပထမဦးဆုံး ရှင်းရမည်။


အစားသည်အမြောက်၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။



$$6 \times 3$$




$$18$$



$$18 \div 3$$

$$18 \div 6$$


အမြောက်နှင့်အစားနှစ်မျိုးစလုံးပါသောအတွက်များ




‘အင်’မှာ လိမ္မော်သီး
 $၄ \times ၃ = ၁၂$ လုံးရှိသည်။



‘အင်’၏ တောင်းတလုံးစီတွင်
လိမ္မော်သီး ၃ လုံး ဆိုသည်။




‘အင်’အတွက်တောင်း
 $၁၂ \div ၃ = ၄$ လုံးလိုသည်။



‘ဂျန်’မှာလိမ္မော်သီး
 $၃ \times ၅ = ၁၅$ လုံးရှိသည်။



သူ၏ တောင်းတလုံးစီတွင်
လိမ္မော်သီး ၅ လုံးဆိုသည်။



‘ဂျန်’ အတွက်တောင်း
 $၁၅ \div ၅ = ၃$ လုံးလိုသည်။

သူတို့နှစ်ဦး၏ တောင်းများကို ပေါင်းသော်
 $(၄ \times ၃) \div ၃ + (၃ \times ၅) \div ၅ = ၄ + ၃ = ၇$ လုံး ရသည်။

အစားသည် အမြောက်၏ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သည်။

$$၂ \times ၃ = ၆ \text{ ဖြစ်လျှင်}$$

$$၆ \div ၃ = ၂ \text{ နှင့်}$$

$$၆ \div ၂ = ၃$$

ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် A နှင့် B တို့သည် ‘ဝ’ မဟုတ်သော ကိန်းများဖြစ်ပြီး

$$A \times B = C \text{ ဖြစ်လျှင်}$$

$$C \div A = B \text{ နှင့်}$$

$$C \div B = A \text{ ဖြစ်သည်။}$$

အကြွင်းသည် စားကိန်းအောက် ငယ်သည်။

ဥပမာ ၇ ကို ၂ ဖြင့် စားလျှင် စားလဒ် ၃ ရ၍ အကြွင်း ၁ ရသည်။

$၂ \times ၃ + ၁ = ၇$ ဟု ချိန်ကိုက်နိုင်သည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် A နှင့် B တို့သည် သုည မဟုတ်သော ကိန်းများဖြစ်ပါစေ။ A ကို B ဖြင့် စားရာ စားလဒ် C နှင့် အကြွင်း D ရသည်ဟု ဆိုပါစို့။

ထိုအခါ $D < B$ နှင့်

$B \times C + D = A$ ဖြစ်သည်။ ကွင်းမပါသော

$၂ \times ၄ - ၆ \div ၃$ ကိန်းတန်းကို တွက်သောအခါ အမြောက်နှင့်အစားကို ဦးစွာတွက်ရမည်။

ဤဥပမာတွင် $၂ \times ၄ = ၈$ နှင့်

$၆ \div ၃ = ၂$ ကို ဦးစွာတွက်ရမည်။

ထို့နောက် နှုတ်လဒ် $၈ - ၂ = ၆$ ကို ရှာရမည်။

သို့သော် တွက်ချက်မှုတွင် ကွင်းများပါလျှင် ထို ကွင်းများကို ဦးစွာရှင်းရမည်။

မြောက်နည်းများ

ကိန်းနှစ်ခုမြောက်ရာတွင် ဖလှယ်၍မြောက်လျှင် ထိုကိန်းနှစ်ခု၏ မြောက်လဒ်မှာ မပြောင်းလဲချေ။ ဤနည်းကို အမြောက် ဖလှယ်နည်း ဥပဒေသ ဟု ခေါ်သည်။
 $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ ဖြစ်ခြင်းကို အမြောက်ဖက်စပ်နည်း ဥပဒေသ ဟု ခေါ်သည်။
 $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ဖြစ်ခြင်းကို ဖြန့်ဝေနည်း ဥပဒေသဟု ခေါ်သည်။

ဖလှယ်နည်းဥပဒေသ

တစ်ချပ်လျှင် သုံးလုံးစီ ထည့်ထားသော ပန်းကန်ငါးချပ်ရှိ စထရော်ဗယ်ရီသီး အရေအတွက်နှင့် တစ်ချပ်လျှင် ငါးလုံးစီ ထည့်ထားသော ပန်းကန်သုံးချပ်ရှိ စထရော်ဗယ်ရီသီး အရေအတွက်သည် တူညီသည်။



$$5 \times 3 = 3 \times 5$$

ယေဘုယျအားဖြင့်

$$A \times B = B \times A$$

လက်ယာဘက်ရှိ ယုန်ကလေးများကို ဖလှယ်နည်းဥပဒေသ $A \times B = B \times A$ ကို ရှင်းပြရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

ပုံတွင် တစ်တန်းလျှင် ယုန် ၃ ကောင်စီပါ ၄ တန်းရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့် တစ်တိုင်လျှင် ယုန် ၄ ကောင်စီ ရှိသော အတိုင် ၃ တိုင် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် $4 \times 3 = 3 \times 4$ ဖြစ်သည်။

အလီဇယားကို ကြည့်၍လည်း $A \times B = B \times A$ ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။

ဖက်စပ်နည်းဥပဒေသမှာ


$(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ ဖြစ်သည်။

ယုန် နားရွက်များကို ရေတွက်ခြင်းဖြင့် ဖက်စပ်နည်းဥပဒေသ မှန်ကြောင်း မြင်နိုင်သည်။

ဖြန့်ဝေနည်းဥပဒေသမှာ

$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ဖြစ်သည်။

ဖက်စပ်နည်းဥပဒေသ



ယုန် နားရွက်များကို မည်သို့ ရေတွက်မည်နည်း။ ရေတွက်နည်း နှစ်မျိုး ရှိသည်။ ပထမနည်းမှာ ယုန်တစ်ကောင် နားရွက် ၂ ခု၊ တစ်တန်း သုံးကောင်အတွက် $2 \times 3 = 6$ ရသည်။

ထို့နောက် ၄ တန်းအတွက် ၆ ကို ၄ နှင့်မြောက်ရမည်။ $4 \times (2 \times 3) = 4 \times 6 = 24$ ဖြစ်သည်။

ဒုတိယနည်းမှာ

ယုန်တစ်ကောင် နားရွက် ၂ ခု၊ ယုန် $4 \times 2 = 8$ ကောင် အတွက် ရှာမည်။ ထိုအခါ ယုန်နားရွက် $(4 \times 2) \times 3 = 8 \times 3 = 24$ ဖြစ်သည်။

ဤ နှစ်နည်းကို နှိုင်းယှဉ်လျှင် တွေ့ရသည်မှာ $4 \times (2 \times 3) = (4 \times 2) \times 3$ ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မည်သည့်ကိန်း A, B, C တို့အတွက်မဆို $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ ဖြစ်သည်။

ဖြန့်ဝေနည်းဥပဒေသ



ပုံတွင် ပန်းပွင့်မည်မျှ ရှိသနည်း။

ပထမနည်း

$4 \times 2 = 8$ ပွင့်သည် အနီဖြစ်ပြီး

$4 \times 3 = 12$ ပွင့်သည် အဝါဖြစ်သည်။

စုစုပေါင်း $4 \times 2 + 4 \times 3 = 20$ ပွင့် ရှိသည်။

ဒုတိယနည်း

တတန်းစီတွင် $2 + 3 = 5$ ပွင့်ရှိ၍ အတန်းပေါင်း

၄ တန်းတွင် $4 \times (2 + 3) = 20$ ရှိသည်။

အထက်ပါ တွက်ချက်မှု နှစ်မျိုးကို နှိုင်းယှဉ်လျှင် $4 \times (2 + 3) = 4 \times 2 + 4 \times 3$ ကို ရသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့် မည်သည့် ကိန်း A, B, C တို့အတွက်မဆို


$A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ ဖြစ်သည်။

အပေါင်းနည်းဥပဒေသများကဲ့သို့ အမြောက်နည်းဥပဒေသများသည်လည်း အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၀, ၁, ၂, ၃, ၄, ... ကိန်းများအပြင် အခြားကိန်းများစွာ ရှိသေးသည်။ ၎င်းတို့သည်လည်း အထက်ပါ ဥပဒေသများကို ပြေလည်ကြောင်း ပြ၍ရသည်။ အဆင့်မြင့် သင်္ချာအထိပင် ဤဥပဒေသများကို ကိန်းများ၏ အခြေခံ ဆက်သွယ်ချက်များအဖြစ် အသုံးပြုသည်။

ဆခွဲကိန်းနှင့် ဘုံဆခွဲကိန်းများ

ကိန်း ၁, ၂, ၃, ... တို့ကို 'သဘာဝကိန်း' များ သို့မဟုတ် 'အပေါင်းကိန်းပြည့်' များဟု
ခေါ်သည်။ ကိန်း A ကို ကိန်း B ဖြင့် အပြတ်စားနိုင်လျှင် B သည် A ၏ 'ဆခွဲကိန်း'
တစ်ခု ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကိန်း D သည် ကိန်း A နှင့် B တို့၏ ဆခွဲကိန်းတစ်ခု
ဖြစ်လျှင် D ကို A နှင့် B တို့၏ 'ဘုံဆခွဲကိန်း' တစ်ခုဟု ခေါ်သည်။ A နှင့် B တို့၏
ဘုံဆခွဲကိန်းများအစုတွင် အကြီးဆုံးသောကိန်းကို 'ဘုံဆခွဲကိန်းအကြီးဆုံး' ဟု ခေါ်သည်။

သဘာဝကိန်းများ



၁၂ ၏ ဆခွဲကိန်းများနှင့် ၁၈ ၏ ဆခွဲကိန်းများ

$$12 = 1 \times 12$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$12 = 3 \times 4$$


မြောက်လမ်း ၁၂ ဖြစ်စေမည့် ကိန်းစုံတွဲ
သုံးတွဲရှိသည်။ အနီရောင် အကွက်တွင်ရှိ
သော ကိန်းများနှင့် အပြာရောင်အကွက်
တွင်ရှိသော ကိန်းများ သည် ၁၂ ၏
ဆခွဲကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။

$$18 = 1 \times 18$$

$$18 = 2 \times 9$$

$$18 = 3 \times 6$$

မြောက်လမ်း ၁၈ ဖြစ်စေမည့် ကိန်းစုံတွဲ
သုံးတွဲ ရှိသည်။ အနီရောင်နှင့် အပြာ
ရောင် အကွက်ရှိ ကိန်းများသည် ၁၈ ၏
ဆခွဲကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။



၁၂ နှင့် ၁၈ ၏ ဘုံဆခွဲကိန်းများ



၁၂ ၏ ဆခွဲကိန်းများအစုကို အပေါ်စက်
ဝိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၁၈ ၏ ဆခွဲ
ကိန်းများ အစုကို အောက်စက်ဝိုင်းတွင်
ဖော်ပြထားသည်။ ၁၂ နှင့် ၁၈ ၏ ဘုံ
ဆခွဲကိန်းများ အစုသည် ၁၂ ၏ ဆခွဲ
ကိန်းနှင့် ၁၈ ၏ ဆခွဲကိန်းများအစုတို့၏
ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုံဆခွဲကိန်းများ
အစုတွင် ၆ သည် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ကိန်းနှစ်လုံး၏ ဘုံဆခွဲကိန်းများ အစုရှိ
အကြီးဆုံးကိန်းကို ဘုံဆခွဲကိန်း အကြီး
ဆုံးဟု ခေါ်သည်။

၁ သည် သဘာဝကိန်းများ ၁, ၂, ၃, ... တို့၏ ဆခွဲကိန်း
တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁ မဟုတ်သော သဘာဝကိန်းတိုင်းတွင်
ဆခွဲကိန်း အနည်းဆုံး နှစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ၁ နှင့်
ထိုကိန်းပင်ဖြစ်သည်။ ၁ မဟုတ်သော သဘာဝကိန်းများ
အနက် ဆခွဲကိန်း နှစ်ခုသာရှိသည့်ကိန်းကို 'သုဒ္ဓကိန်း' ဟု
ခေါ်သည်။ ဥပမာ ၂, ၃, ၅, ၇, ၁၁, ... တို့သည် သုဒ္ဓကိန်း
များ ဖြစ်ကြသည်။ ကိန်းနှစ်လုံး၏ ဘုံဆခွဲကိန်း အကြီး
ဆုံးသည် ၁ ဖြစ်လျှင် ထိုကိန်းနှစ်လုံးကို 'အပြန် အလှန်
သုဒ္ဓကိန်း' များ ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
ဥပမာ ၂ နှင့် ၃ တို့သည် အပြန်အလှန် သုဒ္ဓကိန်းများ
ဖြစ်ကြသည်။ A, B နှင့် C တို့သည် သဘာဝကိန်းများ
ဖြစ်သောအခါ $A \times C$ နှင့် $B \times C$ တို့၏ ဘုံဆခွဲကိန်း
အကြီးဆုံးသည် A နှင့် B တို့၏ ဘုံဆခွဲကိန်း အကြီး
ဆုံးနှင့် C တို့၏ မြောက်လမ်း ဖြစ်သည်။

ဥပမာ။ $12 = 2 \times 6$ နှင့်
 $18 = 3 \times 6$ ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် 2×6 နှင့် 3×6 တို့၏ ဘုံဆခွဲကိန်း အကြီး
ဆုံးသည် ၂ နှင့် ၃ တို့၏ ဘုံဆခွဲကိန်း ၁ နှင့် ၆ ကိန်း ၆ တို့၏
မြောက်လမ်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၂ နှင့် ၁၈ တို့၏
ဘုံဆခွဲကိန်း အကြီးဆုံးသည် ၆ ဖြစ်သည်။




အပိုင်းကိန်းများ

ကိန်းပြည့်များကို အတွဲလိုက် သုံး၍ ခွဲ, ၃, ၆, ... စသည့် အပိုင်းကိန်းတို့ကို ရေးနိုင်သည်။ အပိုင်းကိန်း $\frac{A}{B}$ တွင် A သည် ပိုင်းဝေ B သည် ပိုင်းခြေ ဖြစ်သည်။ ပိုင်းဝေသည် ပိုင်းခြေအောက် ငယ်လျှင် ထိုအပိုင်းကိန်းကို 'အပိုင်းကိန်းစစ်' ဟု ခေါ်သည်။ ပိုင်းဝေသည် ပိုင်းခြေထက် ကြီးလျှင် ထိုအပိုင်းကိန်းသည် 'အပိုင်းကိန်းတု' ဖြစ်သည်။ ၁, ၂, ၃, ၄, ... စသည့် ကိန်းများကို 'ကိန်းရော' များဟု ခေါ်သည်။




ကိတ်မုန့်တစ်လုံးကို နှစ်ပိုင်းအညီပိုင်းလျှင် တစ်ပိုင်းစီသည် တစ်လုံး၏ $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။

$$\frac{2}{6}$$






အပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဆောက်ပုံ



ပိုင်းဝေ

$$\frac{3}{5}$$


ပိုင်းခြေ




မည်သည့် ကိန်းကိုမဆို ရွယ်တူအပိုင်းကိန်းများပိုင်းနိုင်သည်။ ဥပမာ ၁ ကို နှစ်ပိုင်းအညီ ပိုင်းလျှင် တစ်ပိုင်းစီသည် $\frac{1}{2}$ ဖြစ်ပြီး သုံးပိုင်းအညီ ပိုင်းလျှင် $\frac{1}{3}$ ဖြစ်သည်။

၆ ကို ငါးပိုင်းသုံးပိုင်းဟုဖတ်၍ ခွဲ ဖြစ်ပြီး သုံးပိုင်းအညီ ပိုင်းလျှင် $\frac{2}{3}$ ဖြစ်သည်။ ၆ ကို ၃ သည် ပိုင်းဝေ၊ ၂ သည် ပိုင်းခြေဖြစ်သည်။ အပိုင်းကိန်းတစ်ခုတွင် ပိုင်းဝေသည် ပိုင်းခြေအောက်ငယ်လျှင် အပိုင်းကိန်းစစ်၊ ကြီးလျှင် အပိုင်းကိန်းတု ဖြစ်သည်။ ဥပမာ $\frac{3}{2}$ သည် အပိုင်းကိန်းစစ်၊ $\frac{1}{2}$ သည် အပိုင်းကိန်းတု ဖြစ်သည်။ အပိုင်းကိန်းစစ် တစ်ခုသည် ၁ အောက်ငယ်သည်။ နှစ်ကို ခွဲ ဖြစ်ပြီး $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။ (ပုံကိုကြည့်ပါ)။ ၁, ၂, ၃ စသည်တို့တွင် ကိန်းပြည့်များနှင့် အပိုင်းကိန်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့ကို ကိန်းရောများဟု ခေါ်သည်။

မျဉ်းပေါ်ရှိ အပိုင်းကိန်းများ



ကိန်းရေများနှင့် အပိုင်းကိန်းတူများ



(၁) ပထမကိန်းရေနှစ်ခုကိုအပိုင်းကိန်းတူသို့ ကျန်အပိုင်းကိန်းတူနှစ်ခုကို ကိန်းရေသို့ ပြောင်းပါ။

$$3\frac{3}{4} \quad 2\frac{5}{7} \quad \frac{16}{3} \quad \frac{13}{5}$$



(၂) အောက်ပါတို့ကို အရှင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကျဉ်းပါ။

$$\frac{4}{16} \quad \frac{9}{15} \quad \frac{18}{24} \quad \frac{18}{36}$$


(၃) အောက်ပါတို့ကို ဆုံပိုင်းခြေသို့ ပြောင်းပါ။

$$\left(\frac{1}{3} \quad \frac{1}{4}\right) \quad \left(\frac{3}{4} \quad \frac{1}{6}\right)$$


အပိုင်းကိန်းတစ်ခုကို တန်ဖိုးတူအပိုင်းကိန်းများသို့ပြောင်းခြင်း




အပိုင်းကိန်းတစ်ခုကို ရှင်းအောင်ရေးခြင်း




အပိုင်းကိန်းတစ်ခု၏ ပိုင်းဝေနှင့် ပိုင်းခြေ နှစ်ခုစလုံးကို ဆုံပိုင်းကိန်း တစ်ခုဖြင့် စားသောအခါ အရှင်းဆုံးအပိုင်းကိန်းကို ရသည်။ သို့သော် တန်ဖိုး မပြောင်းလဲချေ။



အပိုင်းကိန်းများကို ပေါင်းခြင်း




အပိုင်းကိန်းများကို နှုတ်ခြင်း




အပိုင်းကိန်းမြောက်ခြင်း

$$2 \times \frac{2}{5}$$




$$\frac{1}{2} \times \frac{2}{3}$$

ကိန်းတစ်ခုကို ၁/၂ ဖြင့် မြောက်လျှင်
ထိုကိန်း၏ ထက်ဝက်ကို ရသည်။




အပိုင်းကိန်းစားခြင်း

$$\frac{3}{4} \div 2$$



$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$$

ကိန်းတစ်ခုကို ၁/၂ ဖြင့် စားလျှင်
ထိုကိန်း၏ နှစ်ဆကို ရသည်။



$$\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

ကိန်းတစ်ခုကို အပိုင်းကိန်းတစ်ခုဖြင့် စားလိုသော်
ထိုအပိုင်းကိန်းကို ပြောင်းပြန်လှန်၍ မြောက်ရသည်။



ရွှင်မြူးစရာ ကိန်းသင်္ချာ

ရှေးအခါက အဘိုးအိုတစ်ယောက်တွင် ‘တွမ်’၊ ‘ဂျင်’၊ ‘ဂျက်’ခေါ်သောသားသုံးယောက်ရှိသည်။တနေ့တွင် အဘိုးအိုသည် နာမကျန်းဖြစ်၍ သားသုံးယောက်ကို ခေါ်ပြီး ‘ငါ့သားတို့အတွက် သိုး ၁၇ကောင် ထားခဲ့တယ်။သိုးအားလုံးရဲ့ ၁/၂ ကို ‘တွမ်’၊ ၁/၃ ကို ‘ဂျင်’၊ ၁/၆ ကို ‘ဂျက်’ယူပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သိုးကိုမျှ မသတ်ရ’ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဘိုးအိုသည် ကွယ်လွန်သွားသည်။

သားသုံးယောက်သည်သိုး၁၇ကောင်ကိုမည်ကဲ့သို့ ခွဲဝေယူရမည်ကို တွေးတောမရ ဖြစ်ကြသည်။ပညာရှင် တစ်ယောက်သည် သူတို့၏ ပြဿနာကို ကြား၍ ‘မင်းတို့မှာ သိုး၁၇ကောင်ဖြစ်အောင်သိုးတစ်ကောင် ငါငှားနိုင်တယ်၊ ဒီလိုဆို မင်းတို့ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်’ ဟု ပြောသည်။ သိုး ၁၇ ကောင်၏ ၁/၂ သည် ၉ ကောင်၊ ၁/၃ သည် ၆ ကောင်နှင့် ၁/၆ သည် သိုး ၂ ကောင်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သားသုံးယောက်သည်သိုး၁၇ကောင်ကိုဝေနိုင်၍ပညာရှင်ကို သူ၏သိုးပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ပညာရှင်၏ အကြံပေးချက်သည် အဘယ်ကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်ကို သင်အဖြေရှာနိုင်ပါသလား။

ဒသမကိန်းများ


၀.၃ ကို သုည ဒသမသုံးဟု ဖတ်သည်။ အစက် (.) ကို ဒသမအစက်ဟု ခေါ်သည်။ ၀.၃ သည် $\frac{3}{10}$ နှင့် ညီသည်။ မည်သည့်ဒသမကိန်းကိုမဆို အပိုင်းကိန်းအဖြစ် ရေးနိုင်သည်။ ၄.၃ ကို လေးဒသမသုံးဟု ဖတ်သည်။ ၄ အပေါင်း ၀.၃ နှင့် ညီသည်။ ၎င်းကို 'ဒသမကိန်းနှော' ဟု ခေါ်သည်။ (ဒသမကိန်းများကို အပေါင်း၊ အနှုတ် ပြုလုပ်ရန် ဒသမအစက်ကို ထက်အောက် တည့်တည့်စီပြီး ကျန်ကိန်းများကို သူ့နေရာအလိုက် ရေးရမည်။ ဒသမကိန်းနှောကို နီးရာ ကိန်းပြည့်သို့ အနီးဆုံးယူခြင်းဖြင့် ကိန်းပြည့်ရသည်။)

ရောင်စုံစက္ကူတို့ကို တူညီသော အပိုင်းများ ဖြတ်ယူခြင်းဖြင့် အပိုင်း ကိန်းများနှင့် ဒသမကိန်းများ၏ အရွယ်အစားကို နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။




၀.၀၁ သည် $\frac{1}{100}$, ၀.၀၀၁ သည် $\frac{1}{1000}$ ဖြစ်သည်။
 ကိန်းတစ်ခုတွင် ပါရှိသည့် ဂဏန်း တစ်လုံး၏ တန်ဖိုးသည် ထိုဂဏန်း၏ နေရာပေါ်တွင် တည်သည်။ ၀.၀၂ တွင် ၂ သည် $\frac{2}{100}$ ကို ဖော်ပြသည်။ ဒသမအစက်၏ နောက် ကပ်လျက် နေရာသည် ဆယ်စိတ်ပိုင်းနေရာ၊ နောက် တစ်နေရာသည် ရာစိတ်ပိုင်းနေရာ စသည်ဖြင့် ခေါ်သည်။
 ၂.၃ သည် ဒသမကိန်းနှော ဖြစ်သည်။ ၂.၃ သည် ၂ နှင့် ၀.၃ ပေါင်းခြင်းနှင့် တူညီသည်။ ဒသမကိန်း များသည် 'ဝ' ထက်ကြီး၍ ၁ အောက် ငယ်သည်။ ဥပမာ။ $0 < ၀.၁ < ၁$ ထိုနည်းတူ $၂ < ၂.၃ < ၃$ ဖြစ်သည်။
 ဒသမကိန်းများကို ပေါင်းခြင်း၊ နှုတ်ခြင်း၊ မြှောက်ခြင်း၊ စားခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
 ဒသမကိန်း ၀.၂ သည် $\frac{2}{10}$ နှင့် ညီ၍ $\frac{2}{10}$ နှင့် လည်း ညီသည်။ ၀.၂ သည် ၀.၁ နှစ်ကြိမ် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် $၂ \times ၀.၁ = \frac{2}{10} = \frac{2}{10}$ ဖြစ်သည်။
 အပိုင်းကိန်းတစ်ခု၏ ပိုင်းဝေကိုပိုင်းစေခြင်းနှင့်စားခြင်းဖြင့် အပိုင်းကိန်းကို ဒသမကိန်းပုံစံသို့ ပြောင်းရေးနိုင်သည်။

ဒသမကိန်းကို အနီးကပ်မြင်ရပုံ



ပေတံ တစ်ခု၏ အပိုင်းတစ်ပိုင်း ကို ပုံကြီးချဲ့ကြည့် ခြင်းဖြင့် မှတ်သားထားသော ဒသမကိန်း များကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နိုင်သည်။

ဒသမကိန်းများနှင့် အပိုင်းကိန်းများ




ဒသမကိန်းများနှင့် အပိုင်းကိန်းများ



ဒသမကိန်းများကို ပေါင်းခြင်း

$$0.2 + 0.5$$

ကိန်းများကိုကြည့်ပါ။



ရောင်စုံအကွက်များကိုကြည့်ပါ။




$$0.2 + 0.5 = 0.7$$


ဒသမကိန်းများကို နှုတ်ခြင်း

$$1.2 - 0.8$$

ကိန်းများကိုကြည့်ပါ။



ရောင်စုံအကွက်များကိုကြည့်ပါ။



$$1.2 - 0.8 = 0.4$$



ကိန်းဂဏန်းများနှင့် ၎င်းတို့၏နေရာများ

$\begin{array}{r} 170 \\ + 230 \\ \hline 400 \end{array}$	$\begin{array}{r} 17 \\ + 23 \\ \hline 40 \end{array}$	$\begin{array}{r} 1.7 \\ + 2.3 \\ \hline 4.0 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.17 \\ + 0.23 \\ \hline 0.40 \end{array}$	$\begin{array}{r} 500 \\ - 60 \\ \hline 440 \end{array}$	$\begin{array}{r} 50 \\ - 6 \\ \hline 44 \end{array}$	$\begin{array}{r} 5 \\ - 0.6 \\ \hline 4.4 \end{array}$	$\begin{array}{r} 0.5 \\ - 0.06 \\ \hline 0.44 \end{array}$
---	--	---	--	--	---	---	---

ဒသမကိန်းများကို အပေါင်း၊ အနှုတ်ပြုလုပ်သောအခါ ဒသမအစကိန်းများကို အထက်အောက်တည့်တည့်ရေးရသည်။

ဒသမကိန်းများ မြှောက်ခြင်း

$$3 \times 1.2$$



$$3 \times 1.2 = 3.6$$

$$3.1 \times 1.2$$

ဒသမကိန်း နှင့် ဒသမကိန်းနှောများ သည် ကိန်းပြည့် များကဲ့သို့ ဖလှယ်၊ ဖက်စပ်၊ ပြန်ဝေရန် ဥပဒေတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြန်ဝေရန် ဥပဒေကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးနိုင်သည်။

$$3.1 \times 1.2$$

$$= (3 + 0.1) \times 1.2$$

$$= 3 \times 1.2 + 0.1 \times 1.2$$




$$3 \times 1.2 = 3.6$$



$$0.1 \times 1.2 = 0.12$$

$$\begin{array}{r} 3.6 \\ + 0.12 \\ \hline 3.72 \end{array}$$




$$3.1 \times 1.2 = 3.72$$

ဒသမကိန်းများကို စားခြင်း

အရှည်စားခြင်း

$$4.4 \div 2$$



$$4.4 \div 2 = 2.2$$


$$2.2$$

$$\begin{array}{r} 2.2 \\ 2 \overline{) 4.4} \\ \underline{4} \\ 4 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

$$4.4 \div 1.1$$



၄၄ ပိုင်း အညီ ပိုင်းပါ။



$$4.4 \div 1.1$$

$$= 44 \div 11$$

$$1.1$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1.1 \overline{) 4.4} \\ \underline{4.4} \\ 0 \end{array}$$

$$1.1 \overline{) 4.4}$$

$$4.4 \div 1.1 = 4$$

ဒသမကိန်းများကို အနီးဆုံးယူခြင်း


ဆယ်စိတ်ပါ လိမ္မော်သီးကိုသုံး၍ ဒသမကိန်းနှောမှ ကိန်းပြည့်ထုတ်ယူနည်း သုံးနည်း။

ဒသမပိုင်းကို ပယ်ခြင်း



ဤနည်းတွင် ကိန်းပြည့်ကို ယူပြီး ဒသမပိုင်းကို ပယ်သည်။ ၁.၄ တွင် .၄ ကိုပယ်လျှင် ၁ ရသည်။

ကိန်းပြည့်သို့ မြှင့်ခြင်း




ဤနည်းတွင် မည်သည့် ဒသမပိုင်းကိုမဆို ၁ ဟု စဉ်း စားသည်။ ဒသမကိန်း ၀.၄ ကို ၁ ဟု ရေတွက်ခြင်းဖြင့် ၁.၄ ကို ၂ သို့တန်ဖိုးမြှင့်နိုင်သည်။

နီးရာကိန်းပြည့်သို့ အနီးဆုံးယူခြင်း




ဤနည်းတွင် ၀.၅ အောက်ငယ်သောဒသမကိန်းကို 'ဝ' ဟု ထားသည်။ ၀.၅ နှင့် အထက်ကို ၁ ဟု ထားသည်။ ၁.၃ တွင် .၃ ကို 'ဝ' ဟု စဉ်းစားသောအခါ ၁ ရသည်။ ၁.၇ တွင် .၇ ကို ၁ ဟု စဉ်းစားသောအခါ ၂ ရသည်။




ကိန်းများ၏ အရွယ်အစား

ထက် ကြီးသော သို့မဟုတ် ညီမျှသော




၃ နှင့်ညီမျှသော သို့မဟုတ် ၃ ထက်ကြီးသော သဘာဝကိန်းများအစုတွင် ၃, ၄, ၅, ၆, ... တို့ ပါဝင်သည်။

အောက်ငယ်သော သို့မဟုတ် ညီမျှသော



၃ နှင့်ညီမျှသော သို့မဟုတ် ၃ အောက်ငယ်သော သဘာဝကိန်းများအစုတွင် ၃, ၂, ၁ တို့ ပါဝင်သည်။

အောက်ငယ်သော



၃ အောက်ငယ်သော သဘာဝကိန်းများသည် ၂ နှင့် ၁ ဖြစ်သည်။

မညီချက်များနှင့် ညီမျှခြင်းများ


ညီမျှခြင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် မညီချက်တစ်ခုသည် အရေအတွက် အတိုင်းအတာ နှစ်ခု၏ ဆက်သွယ်ချက်ကို ဖော်ပြသည်။ တနည်းအားဖြင့် လက်ဝဲဘက် နှင့် လက်ယာဘက် ဆက်သွယ်ချက်ကို ညှိနှိုင်းသည်။ သင်္ကေတ $\geq$ နှင့် $\leq$ တို့သည် ကြီးသည် သို့မဟုတ် တူညီသည်နှင့်ငယ်သည် သို့မဟုတ် တူညီသည်ကို ဖော်ပြသည်။

ညီမျှခြင်း၊ မညီချက် အသီးသီးတို့၏ ဝဲယာဘက်တွင် တန်ဖိုးတူ ပေါင်းထည့်လျှင်သော်လည်းကောင်း၊ နုတ်လျှင်သော်လည်းကောင်း ပြောင်းလဲမှုမရှိချေ။ ဥပမာ ညီမျှခြင်း $၃x - ၂ = ၄$ တွင် ဝဲယာဘက်၌ ၂ ပေါင်းထည့်လျှင် $၃x = ၆$ ရသည်။ ထိုနည်းတူ မညီချက် $x + ၂ > ၃$ တွင် နှစ်ဘက်စလုံးမှ ၂ ကို နုတ်သော် $x > ၁$ ရသည်။

မူလဆက်သွယ်ချက်ကို မပြောင်းလဲစေပဲ ညီမျှခြင်း သို့မဟုတ် မညီချက်တစ်ခု၏ နှစ်ဘက်စလုံးကို တန်ဖိုးတူ ကိန်းဖြင့် မြှောက်နိုင် စားနိုင်သည်။ (ဤနေရာတွင် '၀' နှင့် မစားမိရန် သတိပြုရမည်။) ဥပမာ $၃x > ၆$ မညီချက်တွင် နှစ်ဘက်စလုံးကို ၃ ဖြင့်စားသော် $x > ၂$ ရသည်။ ထိုနည်းတူ $၃x = ၆$ ညီမျှခြင်းတွင် နှစ်ဘက်စလုံးကို ၃ ဖြင့်စားသော် $x = ၂$ ရသည်။

အရေအတွက် အတိုင်းအတာတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ငယ်သည် သို့မဟုတ် ကြီးသည်ကိုပြရန် သင်္ကေတ ($<$) (အောက်ငယ်သည်) နှင့် ($>$) (ထက်ကြီးသည်) တို့ကို သုံးသည်။ ၎င်းတို့ကို မညီချက်များဟု ခေါ်သည်။ ငယ်သည် သို့မဟုတ် တူညီသည် ($\leq$) ကြီးသည် သို့မဟုတ် တူညီသည် ($\geq$) ဟူသော သင်္ကေတတို့ကိုလည်း အသုံးပြုသည်။ ညီမျှခြင်းသည် အရေအတွက် အတိုင်းအတာနှစ်ခု တူညီသည်ကို သင်္ကေတ ($=$) သုံးပြီး ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ညီမျှခြင်းတစ်ခုတွင် မသိကိန်းတစ်ခု ပါနိုင်သည်။

မညီချက်များ



၃ ခေါ်လာ (၃၀၀ ဆင့်) ဖြင့် ဆင့် ၄၀ တန် စာအုပ် ၄ အုပ်၊ ၁၀ ဆင့်တန် ခဲတံ ၈ ချောင်း၊ ၁၅ ဆင့်တန်ခဲတံ ၂ ချောင်းကို ဝယ်နိုင်မည်လား။
 $(၄ \times ၄၀) + (၈ \times ၁၀) + (၂ \times ၁၅) = ၂၇၀$
 နှင့် $၂၇၀ < ၃၀၀$ ဖြစ်၍ ထိုပစ္စည်းများကို ဝယ်နိုင်ပါသည်။

ငွေ ၃ ခေါ်လာရှိလျှင် ဆင့် ၄၀ တန် မှတ်စုစာအုပ် မည်မျှ ဝယ်နိုင်မည်နည်း။ x သည် မှတ်စုစာအုပ် အရေအတွက်ဖြစ်ပါစေ။ ဆင့်ဖွဲ့၍ တွက်လျှင် မညီချက်မှာ $၄၀x < ၃၀၀$ ဖြစ်၏။ နှစ်ဘက်စလုံးကို ၄၀ ဖြင့်စားသော် $x < ၇.၅$ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်မှတ်စုစာအုပ် အရေအတွက် x သည် ၇ အုပ် ဖြစ်မည်။

ညီမျှချက်များ



ကြောင် ၃ ကောင်နှင့် ကြက်ကလေးများ၏ ခြေထောက် အရေအတွက်သည် ၂၀ ဖြစ်သည်။ ကြက်ကလေးအကောင် မည်မျှရှိသနည်း။ ကြက်ကလေး x ကောင် ဖြစ်ပါစေ။ ကြက်ကလေး တစ်ကောင်လျှင် ခြေနှစ်ချောင်းရှိသဖြင့် ခြေချောင်းအရေအတွက်သည်

$၂x$ ဖြစ်သည်။ ကြောင် ၃ ကောင်၏ ခြေထောက် အရေအတွက်မှာ $၃ \times ၄ = ၁၂$ ချောင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် $၂x + ၁၂ = ၂၀$ နှစ်ဘက်စလုံးမှ ၁၂ ကို နုတ်သော် $၂x = ၈$ နှစ်ဘက်စလုံးကို ၂ ဖြင့် စားသော် $x = ၄$ ရသဖြင့် ကြက်ကလေး ၄ ကောင် ဖြစ်သည်။

စမ်းကြည့်ကြစို့

- (၁) 'ဂျင်' သည် မှတ်စုစာအုပ် နှစ်အုပ်အတွက် ငွေတစ်ဒေါ်လာ ပေးလိုက်ရာ ဆိုင်ရှင်က အကြွပြန်အမ်းသည်။ မှတ်စုစာအုပ် တစ်အုပ်၏ တန်ဖိုး အကြောင်း သင် ဘာပြောနိုင်သနည်း။ သင်၏ အဖြေကို မညီချက်တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြပါ။
- (၂) 'ဂျိန်း' သည် မိခင်ထံမှ ၃ ဒေါ်လာ ရထားသည်။ သူမသည် တစ်နေ့လျှင် ဆင့် ၄၀ သုံးခုခု နောက်ဆုံး သူမတွင် ဆင့် ၂၀ သာ ကျန်ခဲ့သည်။ သူမသည် ရက် မည်မျှကြာအောင် သုံးခဲ့သနည်း။

တွက်ချက်မှုကိရိယာများ


ပေးသုံးခုံဖြင့်တွက်ချက်ရာတွင် ပေးသုံးများကို အထက်အောက်ရွှေ့ရသည်။ လျှော့တွက်တံသည် အထူးပြုလုပ်ထားသော ပေတံနှစ်ခုကို အချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂဏန်းတွက်စက်ကိုအသုံးပြုရာတွင် စက်ခလုတ်များကို ကိုင်တွယ်တတ်ဖို့လိုသည်။ ကွန်ပျူတာစက်သည် ခေတ်အမီဆုံး ဂဏန်းတွက်စက် ဖြစ်သည်။

ရှေးခေတ် တွက်ချက်မှုကိရိယာတို့အနက် ပေးသုံးခုံသည် အရှင်ဆုံးနှင့် အသုံးဝင်ဆုံး ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အာရှတွင် ယနေ့တိုင် သုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဥရောပ ပေးသုံးခုံနှင့် အရှေ့တိုင်း ပေးသုံးခုံတို့သည် ပုံသဏ္ဌာန်မတူကြပေ။ ဂျပန်ပေးသုံးခုံသည် တရုတ်ပေးသုံးခုံကို ပြုပြင်အသုံးပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျပန်ပေးသုံးခုံတွင် တန်းတစ်ခုဖြင့် နှစ်ပိုင်းခွဲထားပြီး အထက်ပိုင်းတွင် တန်ဖိုး ၅ စီရှိသော ပေးသုံးလုံးများ (တစ်တိုင်လျှင် တစ်လုံးစီ) ရှိသည်။ အောက်ပိုင်းတွင် တန်ဖိုး ၁ စီရှိသော ပေးသုံးလုံးများ (တစ်တိုင်လျှင် လေးလုံးစီ) ရှိသည်။ တန်ဖိုး ၁ ရှိ ပေးသုံးလုံး သို့မဟုတ် တန်ဖိုး ၅ ရှိ ပေးသုံးလုံးကို အလယ်မှတန်းဆီသို့ ရွှေ့ခြင်းဖြင့် ၁ သို့မဟုတ် ၅ ကို မှတ်သားနိုင်သည်။ လက်ယာမှ လက်ဝဲသို့ ရွှေ့သောအခါတိုင်း တိုင်များပေါ်ရှိ ဖော်ပြသော ကိန်းကို ၁၀ ဖြင့် မြှောက်ရသည်။ ပုံများတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ပေးသုံးလုံးများ ရွှေ့ခြင်းဖြင့် အပေါင်း၊ အနုတ်၊ အမြောက်၊ အစား ပြုလုပ်နိုင်သည်။




ပေးသုံးတွက်နေသောကလေးတစ်ယောက်

တရုတ်ပေးသုံးခုံတွင် တိုင်တစ်ခုစီ အထက်ပိုင်းတွင် ပေးသုံးနှစ်လုံးစီရှိ၍ အောက်ပိုင်းတွင် ပေးသုံးငါးလုံးစီ ရှိသည်။






ဂျပန်ပေးသုံးခုံ၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး



ကိန်းများကို ပေးသုံးဖြင့်ပြပုံ 34

759







2863




ပေးသုံးသုံး၍ တွက်ချက်ပုံ


အပေါင်း

အနုတ်






လျှော့တွက်တံသည် အမြောက်နှင့်အစားတွက်ရာတွင် အသုံးဝင်သောကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည်။



လက်သုံးဂဏန်းတွက်စက်ကို သုံးရာတွင် ခလုတ်ကို ချွေပြီး လက်ကိုင်ကို လှည့်ရမည်။



၂×၄ ကို ရှာရန်။ အလယ်ပေတံကို C စကေးပေါ်ရှိ ၁ အမှတ်နှင့် D စကေးပေါ်ရှိ ၂ အမှတ်တို့ တထပ်တည်းကျသည့်အထိ ရွေ့ပါ။ C စကေးပေါ်ရှိ ၄ အမှတ်နှင့် တထပ်တည်းကျသော D စကေးပေါ်ရှိ ကိန်းကို ဖတ်ပါ။ အဖြေ ၈ ရမည်။
 ၄ ÷ ၂ ကို ရှာရန်။ D စကေးပေါ်ရှိ ၄ အမှတ်နှင့် C စကေးပေါ်ရှိ ၂ အမှတ်တို့ တထပ်တည်းကျအောင် အလယ်ပေတံကို ရွေ့ပါ။ C စကေးပေါ်ရှိ ၁ နှင့် တထပ်တည်းကျသော D စကေးပေါ်ရှိကိန်းကို ဖတ်ပါ။ အဖြေ ၂ ရမည်။

လျှော့တွက်တံ အသုံးပြုနည်း



လျှပ်စစ်သုံး ဂဏန်းတွက်စက်ကို ခလုတ်များ နှိပ်ခြင်းဖြင့် တွက်နိုင်သည်။

ခေတ်အမီဆုံးတွက်စက်သည် ကွန်ပျူတာဖြစ်သည်။၎င်းသည် နှစ်လီစနစ်ကို သုံးသည်။

ပေသီးနှင့် အလားတူ ဂဏန်းတွက်စက် များစွာ ရှိသည်။ လျှော့တွက်တံတွင် ပေတံနှစ်ခုကို တခုနှင့် တခု အပြိုင် ရွေ့ရှားနိုင် အောင် တပ်ထားသည်။ ထိုပေတံများတွင် စကေးများ ရေးမှတ်ရာ၌ လော်ဂရစ်သမ် ဥပဒေသများကို အသုံးပြု ထားသည်။ ကိန်းများကြီးလာလေ ကိန်းများကြားရှိ အလျားသည် သေးသွားလေ ဖြစ်သည်။ လော်ဂရစ်သမ် ဂုဏ်သတ္တိများသုံးလျက် ပေတံများပေါ်ရှိ ဖြတ်ပိုင်းများကို ပေါင်းခြင်း၊ နုတ်ခြင်းဖြင့် ကိန်းများကို မြှောက်နိုင် စားနိုင်သည်။

လက်သုံး ဂဏန်းတွက်စက်များတွင် ခွေးသွားစိပ်များကို သုံးသည်။ ဤစက်ပုံစံမျိုးကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၃၀၀ ခန့်က ပြင်သစ် သင်္ချာပညာရှင် ပါစကယ်က တီထွင်ခဲ့သည်။ လက်ကိုင်ကို ရွေ့သို့ လှည့်ခြင်းဖြင့် အပေါင်းနှင့် အမြောက်ကို တွက်နိုင်ပြီး နောက်သို့ လှည့်ခြင်းဖြင့် အနုတ်နှင့် အစားကို တွက်နိုင်သည်။

ယခုအခါ လျှပ်စစ်တွက်စက်တို့သည် အရွယ်အစား သေးလာသဖြင့် ပို၍ လူသုံးများသည်။


ကွန်ပျူတာသည် ခေတ်အမီဆုံးနှင့် အဆင့်အမြင့်ဆုံး တွက်စက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကိန်းကြီးများပါသော ရှုပ်ထွေးသည့် တွက်ချက်မှုများကို ကွန်ပျူတာဖြင့် လျင်မြန်စွာ တွက်နိုင်သည်။



အပေါင်းကိန်းများနှင့် အနှုတ်ကိန်းများ


‘ဝ’ထက်ကြီးသောကိန်းများ ဥပမာ(၁,၂,၃,...) နှင့် $(\frac{၁}{၂}, \frac{၁}{၃}, ...)$ တို့ကို အပေါင်းကိန်းများ ဟု
ခေါ်သည်။ အနှုတ်ကိန်းများသည် ‘ဝ’အောက်ငယ်သည်။ သုည(၀) သည် အပေါင်းကိန်းလည်း မဟုတ်၊
အနှုတ်ကိန်းလည်း မဟုတ်ပါ။ A သည် အပေါင်းကိန်းဖြစ်လျှင် -A သည် အနှုတ်ကိန်း ဖြစ်သည်။ ဥပမာ
-၁, -၂, -၃, ... တို့သည် အနှုတ်ကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။ -၂ သည် -၁ အောက်ငယ်ပြီး -၃ သည်
-၂ အောက် ငယ်သည်။ အနှုတ်ကိန်းများ၏ ကိန်းစဉ် -၁, -၂, -၃, ... သည် အဆုံးမရှိ ငယ်၍ ငယ်၍
သွားသည်။

အပေါင်းကိန်းများနှင့် အနှုတ်ကိန်းများ




အနှုတ်ကိန်းများသည် ‘ဝ’အောက်ငယ်၍ အပေါင်းကိန်းများသည် ‘ဝ’ထက်ကြီးသည်။ သုည(၀) သည် အပေါင်းကိန်းလည်း မဟုတ်၊ အနှုတ်ကိန်းလည်း မဟုတ်ပေ။

အပေါ်ထပ်နှင့် အောက်ထပ်




မြေပြင်ပေါ်ရှိ လှေကားထပ်ကို ‘ဝ’
ထပ်ဟု သတ်မှတ်ပါ။ အပေါ်သို့
တက်သော လှေကားထပ်များကို
အပေါင်း၊ အောက်သို့ ဆင်းသော
လှေကားထပ်များကို အနှုတ်ဟု
ယူဆနိုင်သည်။



ဆင်တိဂရိတ် သာမိုမီတာသည် အပူချိန်
တိုင်း ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အပူချိန်
သည် ‘ဝ’ဒီဂရီထက်များလျှင်အပေါင်း၊ ‘ဝ’
ဒီဂရီအောက်နည်းလျှင် အနှုတ်ဖြစ်သည်။

ပင်လယ် ရေပြင်ညီကို ‘ဝ’မီတာ ဟု
သတ်မှတ်လျှင် ရေပြင်ညီအထက် အမြင့်
တို့သည် အပေါင်း၊ ရေပြင်ညီ အောက်
အနက်တို့သည် အနှုတ် ဖြစ်သည်။


ငွေသွင်းခြင်းနှင့် ငွေထုတ်ခြင်း



ဘဏ်တွင် သွင်းငွေကို
အပေါင်းဖြင့် ဖြစ်၍ ထုတ်
ငွေကို အနှုတ်ဖြင့် ဖြစ်လေ့
ရှိသည်။



လက်ဝဲသွားခြင်းနှင့် လက်ယာသွားခြင်း



သစ်ပင်၏နေရာကို ‘ဝ’ဟု သတ်မှတ်ပြီး သစ်ပင်၏ လက်ယာဘက်ကို
အပေါင်းဟုသတ်မှတ်လျှင် သစ်ပင်၏လက်ဝဲဘက်သည် အနှုတ်ဖြစ်ရမည်။

ရှေ့စာမျက်နှာများတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ကိန်းအားလုံး ၁,၂,၃,... စသော
သဘာဝကိန်းများ ၀.၁,၀.၂,... စသော ဒသမကိန်းများ $\frac{၁}{၂}, \frac{၁}{၃}, ...$ စသော
အပိုင်းကိန်းများသည် ‘ဝ’ထက် ကြီးကြသည်။
ကိန်းမျဉ်းပေါ်ရှိ ‘ဝ’အမှတ်၏ လက်ယာဘက်တွင် ‘ဝ’ထက်ကြီးသော ကိန်း
များကို မှတ်သားလေ့ရှိသည်။ ထိုကိန်းများကို အပေါင်းကိန်းဟု ခေါ်သည်။
မျဉ်းပေါ်တွင် ၁,၂,၃,... တို့ကိုမှတ်ရန် တစ်စုံတည်းသွားရမည်။ ‘ဝ’အမှတ်၏
လက်ဝဲဘက်တွင်လည်း -၁, -၂, -၃,... အစီအစဉ်အတိုင်း မှတ်သားနိုင်သည်။
အနှုတ်ကိန်းများသည် အပေါင်းကိန်းများ၏ မှန်ရိပ်များ ဖြစ်သည်။ အပေါင်း
ကိန်း ၁, ၂, ၃, ... စသည်တို့သည် အဆုံးမရှိ ကြီးသွားပြီး အနှုတ်ကိန်း
-၁, -၂, -၃, ... စသည်တို့သည် အဆုံးမရှိငယ်သွားသည်။ သင်္ကေတ (<) ကို
သုံး၍ $-၂ < -၁ < -\frac{၁}{၂} < ၀ < \frac{၁}{၂} < ၁ < ၂, ...$ ဟု ရေးနိုင်သည်။

ပုံသဏ္ဌာန်များ



ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြိုက်ပုံ၊ စတုရန်းပုံ၊ စက်ဝိုင်းပုံ စသည်ဖြင့် ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးကို တွေ့ရသည်။ ထိုပုံသဏ္ဌာန်များကို လေ့လာခြင်းသည် သင်္ချာဘာသာတွင် အရေးကြီးသော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ‘အခြေခံပုံများ’ နှင့် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သည့် ‘မျဉ်းပြိုင်ခြင်း၊ မျဉ်းများထောင့်မတ်ကျခြင်း၊ ပုံလှည့်ခြင်း၊ ခေါက်ချိုးညီခြင်း၊ သဏ္ဌာန်တူခြင်း၊ ထပ်တူညီခြင်း’ အစရှိသည်တို့ကို ဥပမာများဖြင့် လေ့လာကြမည်။ ထို့ပြင် မျဉ်းတစ်ကြောင်း၊ ပြင်ညီတစ်ခု၊ ဟင်းလင်းပြင်ရှိအမှတ်တို့၏ တည်နေရာသတ်မှတ်နည်းကိုလည်း လေ့လာကြမည်။



စက်မှုပြပွဲတစ်ခု။ ဤပုံတွင် ပြခန်းများ၏ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးကို တွေ့နိုင်သည်။


ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ပြခန်း

အီတလီနိုင်ငံ ပြခန်း



စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံသဏ္ဌာန်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံသဏ္ဌာန်များစွာကို တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့ကို သဘာဝအတိုင်းသော်လည်းကောင်း၊ လူတို့ ဖန်တီးပြုလုပ်ထားသော အရာဝတ္ထုများအဖြစ်သော်လည်းကောင်း တွေ့နိုင်သည်။ 'ရွှေအချိုး'သည် အလျားနှင့်အနံ၏ ဟန်ချက်အညီဆုံးသော အချိုးအဖြစ် ပန်းချီ ပန်းပု အနုပညာရှင်များက ယူဆထားကြသည်။ ဟန်ချက်ညီခြင်းသည် ပုံသဏ္ဌာန်တစ်ခု လှပစေရန်အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ မျဉ်းမြောင်းမှုနှင့် မျဉ်းကွေးများကို အသုံးပြု၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပုံသဏ္ဌာန်များကို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်သည်။




ပန်းပွင့်ပုံသည် မျဉ်းကွေးပုံများပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။

ခရုခွံတွင် ခရုပတ်ခွေပုံ ရှိသည်။

ပန်းပွင့်ဖတ်များ၊ နှင်းပွင့်များ၊ ပျားသလက်ခန်းများ၊ ခရုခွံမှ ခရုပတ်ခွေများ စသည်ကဲ့သို့ သဘာဝက ဖန်တီးထားသည့် လှပသော ပုံသဏ္ဌာန်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ လူတို့ပြုလုပ်ထားသည့် အရာဝတ္ထုများတွင်လည်း လှပသော ပုံသဏ္ဌာန်များကို တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အလျားအနံ ရွှေအချိုးရှိသည့် ထောင့်မှန်စတုရန်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ၁:၀.၆၂ သည် ရွှေအချိုး၏ တန်ဖိုးနီးပါး ဖြစ်သည်။

ရှေးဟောင်း ဂန္ထဝင်ဗိသုကာများသည် ရွှေအချိုးကို စံအဖြစ်ယူလေ့ရှိသည်။ ယနေ့ထက်တိုင် စာအုပ်၊ ဖဲချပ်စသည့် ထောင့်မှန်စတုရန်းပုံများစွာတွင် ရွှေအချိုးကို အသုံးပြုဆဲဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ခန့်က တည်ဆောက်ခဲ့သည့် ဂရိနိုင်ငံ အေသင်မြို့ရှိ ပါသီနွန် အဆောက်အအုံသည် ရွှေအချိုးကို အခြေခံထားသည်။ ရွှေအချိုးကဲ့သို့ လှပသည့် အခြားအချိုးများလည်း ရှိသေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုလျှင် အချိုးပြေပြစ်သော ပုံသည် လှပသည်။

ရွှေအချိုး လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ လောက်က ဂရိအနုပညာရှင်များသည် ရွှေအချိုးကို ပုံတွင်ပြထားသည့်နည်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



ပုံတွင် ABCD သည် စတုရန်းဖြစ်ပြီး G သည် BC ၏ အလယ်မှတ်ဖြစ်သည်။ G ကို ဗဟိုထားလျက်ချင်းဝက် GD ဖြင့် စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆွဲရာ BC ဆက်ဆွဲမျဉ်းကို F ချိတ်တွေသည်။ BF:AB သည် ၁:၀.၆၂ နီးပါး ရှိသော ရွှေအချိုးပင် ဖြစ်သည်။



လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ က ဆောက်ခဲ့သော ပါသီနွန် အဆောက်အအုံသည် ရွှေအချိုးပေါ် အခြေခံခဲ့သည်။



ဤထောင့်မှန်စတုရန်း ဗူးနှစ်ဗူးသည် ရွှေအချိုးအပေါ် အခြေခံပြုလုပ်ထားသည်။





တိုကျိုမြို့ရှိ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ မျက်နှာပြင်များကို မျဉ်းဖြောင့်များဖြင့် ပုံဖော်ထားသည်။

ပျားအုံ တစ်အုံမှ ပျား သ လက် ခန်း များ သည်
ဥသံညီ ဆဋ္ဌဂံများ ကို ဆက်ထားသည်နှင့် တူသည်။

စိန်၏ မျက် နှာ ပြင် များ ကို အရောင်
အများဆုံး လက်အောင် သွေးနိုင်သည်။


ပုံတွင်ပြထားသောအခန်း၏ ကြမ်းခင်း
ပုံစံသည် အချိုးအစား ညီညွတ်သည်။



ပုံသဏ္ဌာန်များ


တြိဂံသည် အခြေခံပုံသဏ္ဌာန် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ကိုင်ပဝါ၊ ပြတင်းပေါက်၊ ဓာတ်ပုံဘောင်တို့သည် စတုဂံ သို့မဟုတ် ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ ဖြစ်သည်။ စက်ဝိုင်းသည် ဟန်ချက်အညီဆုံး မျဉ်းကွေးပုံ ဖြစ်သည်။ စက်လုံး (ဘောလုံး) တစ်လုံးသည် ဟန်ချက်အညီဆုံး ထုပုံဖြစ်သည်။ လုံးချွန် (ကတော့ပုံ) သည် စက်ဝိုင်းများ (သို့မဟုတ် အခြားမျဉ်းကွေးတခုခု) တွင် အောက်ခြေခံ၍ အမှတ်တစ်ခုသို့ တဖြည်းဖြည်းစုသွားသော ထုပုံ ဖြစ်သည်။ လုံးရှည် (ဆလင်ဒါ) သည် တလိမ့်တုံးကဲ့သို့ ထုပုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပရစ်ဇမ်သည် ကုဗတုံး သို့မဟုတ် သေတ္တာပုံ ဖြစ်သည်။

တြိဂံများ



တြိဂံတွင် အနားသုံးခု ရှိသည်။ ၎င်းသည် အခြေခံပုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့ရှက်၊ ပုံဆွဲပစ္စည်း၊ တီးဝိုင်းသုံး တြိဂံတို့သည် တြိဂံပုံများ ဖြစ်သည်။

စတုဂံများ




စတုဂံသည် အနား ၄ ဘက်ပါပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ စတုရန်းနှင့်စိန်ပုံများပါသည်။ စားပွဲခုံ၊ ပန်းချီကားဘောင်တို့သည်စတုဂံများဖြစ်သည်။


စက်ဝိုင်း



စက်ဝိုင်းများသည် ဟန်ချက်အညီဆုံး မျဉ်းကွေးပုံ ဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပြားများ၊ ပိုက်ဆံပြားများ၊ စားပွဲဝိုင်းများ၊ ကားတာယာများ၊ အချို့နာရီမျက်နှာပြင်များ (အောက်ပုံ) သည် စက်ဝိုင်းပုံများ ဖြစ်သည်။




လမ်း၏ လက်ယာဘက်ရှိ တြိဂံပုံ လမ်းပြဆိုင်းဘုတ်



ထောင့်မှန်စတုဂံပုံပြတင်းပေါက်များ




စက်ဝိုင်းပုံနာရီမျက်နှာပြင်တစ်ခု




ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပုံများကို ပြင်ညီပုံ၊ ထုပုံ ဟူ၍ နှစ်မျိုး ခွဲနိုင်သည်။ ပြင်ညီပုံများကို ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်၌ ရေးဆွဲ နိုင်ပြီး ၎င်းတွင် အလျားနှင့် အနံပါသည်။ ကြိတ်၊ ထောင့်မှန်စတုရန်းနှင့် စက်ဝိုင်းပုံများသည် ပြင်ညီပုံများ ဖြစ်သည်။ ထုပုံများတွင် အလျား၊ အနံနှင့် အမြင့် ပါသည်။ စက်လုံး၊ လုံးချွန်၊ ပိရမစ်နှင့် ပရစ်ဇမ်တို့သည် ထုပုံမျိုးဖြစ်သည်။

စက်လုံးများ




စက်လုံးသည် ဟန်ချက်အညီဆုံး ထုပုံဖြစ်သည်။ ဘော လုံး၊ မရဲသီး၊ ကမ္ဘာလုံးနှင့် ရေနံချက်စက်ရုံသုံး စာတံ ငွေလောင်းစိုး အချို့သည် စက်လုံးပုံများ ဖြစ်သည်။

စက်ဝိုင်းလုံးချွန်နှင့် ပိရမစ်ပုံများ



လုံးချွန်နှင့်ပိရမစ်များသည်အောက်ခြေကျယ်၍ထိပ် ချွန်သည်။ အိဂျစ်ပိရမစ်၊ သုံးချောင်းထောက်၊ ဦးထုပ် အချို့သည် လုံးချွန်နှင့် ပိရမစ်ပုံများပင် ဖြစ်သည်။


လုံးရှည် (ဆလင်ဒါ) နှင့် ပရစ်ဇမ်များ



လုံးရှည်များသည် တလိမ့်တုံးပုံ ဖြစ်သည်။ ပရစ်ဇမ် သည် ထက်အောက် မျက်နှာပြင်တူ ထုပုံ ဖြစ်သည်။ အောက်၌ လုံးရှည်နှင့် ပရစ်ဇမ်များကိုပြထားသည်။



စက်လုံးပုံသဏ္ဌာန်များ



အိဂျစ်နိုင်ငံရှိ ပိရမစ်တစ်ခု



လုံးရှည်နှင့်ပရစ်ဇမ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိအဆောက်အအုံများ




မျဉ်းမြောင်းများနှင့် ထောင့်များ

မျဉ်းမြောင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောပုံကို 'မျဉ်းမြောင်းပြီးပုံ' ဟု ခေါ်သည်။ မျဉ်းမြောင်းတွင် အစအဆုံးမရှိ။ မျဉ်းဝက်တွင် အစရှိပြီး အဆုံးမရှိ။ မျဉ်းဝက် နှစ်ကြောင်း ဆုံရာ၌ ထောင့်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထောင့်များကို ဒီဂရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့် ယူနစ်များဖြင့် တိုင်းသည်။ ကွန်ပါဗျူဆာမှ တြိဂံကို သုံး ထောင့်ကျင်တွယ်ဟု ခေါ်သည်။ အမှတ်တစ်ခုကိုသုံး၍ အခြားအမှတ်တစ်ခုကို ဖော်ပြရန်ညွှန်ရာအရပ်ဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။





'တိုနို' အိမ်မှ စာတိုက်သို့ သွားသောလမ်းကြောင်း 'ပန်းရောင်' ကို လိုက်လံမှတ်သားလျှင် မျဉ်းမြောင်းပြီးပုံ တစ်ခုကို ရသည်။

မျဉ်းမြောင်းပြီးပုံများ



မျဉ်းမြောင်းပြီး ပုံများတွင် ဖွဲ့စည်း ထား သော မျဉ်းမြောင်းများကို အနားများဟု ခေါ်သည်။ အနားနှစ်ခုတို့ ဆုံမှတ်ကိုထောင့်စွန်းဟုခေါ်ပြီး ထောင့်စွန်း တစ်ခု၌ ထောင့်တစ်ထောင့်ကို ဖြစ်စေသည်။

မျဉ်းဝက်နှင့် မျဉ်းမြောင်း




မျဉ်းမြောင်းတစ်ကြောင်းပေါ်ရှိ အမှတ်နှစ်ခုကြား အစိတ်အပိုင်းကို 'မျဉ်းပြတ်' ဟု ခေါ်သည်။ မျဉ်းဝက်တစ်ခုသည် အစသောရှိ၍ အဆုံးမရှိသောမျဉ်းဖြစ်၏။ ထောင့်များကို တိုင်းရာတွင် ခြောက်ဆယ်လီစိတ်ကို သုံးသည်။ ဤစနစ်တွင်

၁ ဒီဂရီ = ၆၀ မိနစ်

၁ မိနစ် = ၆၀ စက္ကန့်ရှိသည်။

ဒီဂရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်များကို '°', '′', '″' သင်္ကေတဖြင့် အသီးသီး ဖော်ပြသည်။ မျဉ်းဝက် နှစ်ကြောင်း ဆုံ၍ မျဉ်းမြောင်း တစ်ကြောင်း ဖြစ်လာလျှင် ထိုထောင့်ကို ထောင့်မြောင်းဟုခေါ်သည်။ ထောင့်မြောင်းတွင် ၁၈၀° ရှိသည်။ ထောင့်မှန်တွင် ၉၀° ရှိပြီး ထောင့်မြောင်း၏ ထက်ဝက် ဖြစ်သည်။ ပုံဆွဲရာတွင် အသုံးပြုသည့် ထောင့်ကျင်တွယ်များသည် ထောင့်မှန်တြိဂံပုံများ ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုတွင် ထောင့်မှန်တစ်ခုနှင့် ၄၅° ထောင့်နှစ်ခုပါပြီး ကျန်တစ်ခုတွင် ထောင့်မှန်တစ်ခု၊ ၆၀° နှင့် ၃၀° ထောင့်များပါသည်။

ထောင့်များတိုင်းခြင်း




မြေတိုင်းရာ၌ အင်ဂျင်နီယာများသည် ရေညီထောင့်များကိုတိုင်းရန် 'ထရန်စ်စ်' ခေါ် ကိရိယာကိုသုံးသည်။

အရာဝတ္ထုငယ်များ၏ ထောင့်များကို တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ် နိုင်သည်။

ထောင့်များကို တိကျစွာတိုင်းရန် ထောင့်တိုင်းကိရိယာကို သုံးသည်။

သုံးထောင့်ကျင်တွယ်များ


သုံးထောင့်ကျင်တွယ်သုံး၍ ထောင့်ပြုလုပ်ခြင်း




သုံးထောင့်ကျင်တွယ် (နှစ်မျိုး) တစ်စုံရှိသည်။ တစ်ခုသည် နှစ်နားညီ ထောင့်မှန်တြိဂံပုံ ဖြစ်၏။ အခြားတစ်ခုသည် ထောင့် ၃၀° နှင့် ထောင့် ၆၀° ပါရှိသော ထောင့်မှန်တြိဂံပုံ ဖြစ်သည်။

ကျင်တွယ်တစ်စုံကိုသုံး၍ ထောင့်အမျိုးမျိုးပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုံတွင်ပြထားသော ထောင့်များ နှင့်မတူသည့် ထောင့်များကို ပြုလုပ်ကြည့်ပါ။

ညွှန်ရာအရပ်များ



အိမ်မြှောင်၏ ညွှန်ရာအရပ်များ




အမှတ်တစ်ခုကို အခြားအမှတ်တစ်ခုမှ မည်သည့် နေရာ၌ ရှိသည်ကို ညွှန်ရာ အရပ်များသုံးလျက် ပြောနိုင်သည်။ ထောင့်များဖြင့်လည်း ညွှန်းနိုင်သည်။ ဥပမာ ပုံတွင်ဝက်ရံသည် အိမ်၏အရှေ့ဘက် ၁၃၀° ထောင့်၌ရှိသည်။ အရပ် လေးမျက်နှာသည် အိမ်မြှောင် တစ်ခု၏ အဓိက ညွှန်ရာအရပ်များ ဖြစ်၏။ ထပ်မံစိတ်ပိုင်း ကာ အရပ် ၁၆ မျက်နှာအထိ ညွှန်းနိုင်သည်။

မျဉ်းပြိုင်နှင့် မျဉ်းမတ်

ပြင်ညီတစ်ခုထဲတွင် တခုနှင့်တခု မဆုံသော မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို 'မျဉ်းပြိုင်များ' ဟုခေါ်သည်။ ထောင့်မှန်တွေ့ထိနေကြသော မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ မျဉ်းတစ်ကြောင်းနှင့် ပြင်ညီတစ်ခုကိုလည်းကောင်း၊ ပြင်ညီနှစ်ခုကိုလည်းကောင်း တခုနှင့်တခု ထောင့်မှန်ကျသည်ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။ ပြင်ညီတခုတည်း မကျရောက်ပဲ တကြောင်းနှင့်တကြောင်းလည်း မတွေ့ဆုံသော မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို 'မျဉ်းစေ့မျဉ်းစောင်း' များဟု ခေါ်သည်။

ရှေးခေတ် အီဂျစ်နိုင်ငံတွင် နိုင်းမြစ်ရေ လျှံမှုကြောင့် ကန်သင်းများ နှစ်တိုင်း ပျောက်ပျက်ကုန်သည်။ ရေကျလျှင် တိုင်းကြီးကိရိယာများဖြင့် မြေများကို ပြန်တိုင်းယူရသည်။ ထိုကြိုးကိရိယာတွင် အကွာအဝေးတူ အထုံးများ ပါသည်။ ယခုခေတ်သုံး ပေတံများကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထောင့်မှန် တစ်ခုကိုတိုင်းလိုလျှင် ထိုကြိုးဖြင့် အနား ၃း၄း၅ ရှိသော တြိဂံ တစ်ခုကို တည်ဆောက်၍ တိုင်းရသည်။ အနား ၃း၄း၅ ရှိသော တြိဂံတိုင်းသည် ထောင့်မှန် တြိဂံဖြစ်သည်။


ပိုက်သာဂိုရသီအိုရမ်



ထောင့်မှန်တြိဂံတစ်ခုတွင် ထောင့်မှန်ခံ အနား၏ နှစ်ထပ်ကိန်းသည် ကျန်အနားနှစ်ခု၏ နှစ်ထပ်ကိန်းများ ပေါင်းလဒ်နှင့် တူညီသည်။ ထောင့်မှန်တြိဂံ တစ်ခုတွင် ထောင့်မှန်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားကို 'ထောင့်မှန်ခံအနား' ဟုခေါ်၍ အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထောင့်မှန်ခံအနား၏ အလျားသည် c ဖြစ်ပြီး ကျန် အနားနှစ်ဘက်တို့၏ အလျားများသည် a, b အသီးသီး ဖြစ်သော် ပိုက်သာဂိုရသီအိုရမ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။

$$c^2 = a^2 + b^2$$

ဤတွင် $a^2 = a \times a$, $b^2 = b \times b$
 $c^2 = c \times c$ ဖြစ်သည်။



မျဉ်းပြိုင်များ


စက်လှေကား



လည်စီးပေါ်ရှိ အစင်းကြောင်းများ



မျဉ်းပြိုင်များဆွဲသားပုံ



ပြောင့်တန်းနေသော ရထားလမ်း



ထောင့်မှန်ကျမျဉ်းများနှင့် ပြင်ညီများ




အဆောက်အအုံတို့၏ မျက်နှာစာများသည် လမ်းကို ထောင့်မှန်ကျ နေကြသည်။


ချိန်သီးကြိုး



ထောင့်မှန်များတည်ဆောက်ပုံ



သုံးထောင့်ကျင်တွယ်များအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ထောင့်မှန်များကို လွယ်ကူစွာ ရနိုင်သည်။




မျဉ်းပြိုင်နှင့်ထောင့်မှန်ကျမျဉ်းများ



မျဉ်းပြိုင်နှင့် ထောင့်မှန်ကျ မျဉ်းများပါသောနံရံ

ဂျပန်အိမ်တစ်ဆောင်မှ ပြတင်းပေါက်ဘောင်



ကားလမ်းနှင့်မီးရထားလမ်းတို့သည် မည်သည့်အခါမျှမဆုံတွေ့ကြချေ။ သို့သော်လည်း ဤမျဉ်းဖြောင့်နှစ်ကြောင်းသည် မပြိုင်ကြချေ။ ၎င်းတို့သည် ပြင်ညီတခုတည်းတွင် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မပြိုင်သော မဆုံသော မျဉ်းဖြောင့်နှစ်ခုကို မျဉ်းစေ့ မျဉ်းစောင်းဟု ဆိုနိုင်သည်။

ပြင်ညီတစ်ခုထဲတွင်ရှိပြီး မဆုံတွေ့နိုင်ကြသောမျဉ်းဖြောင့် နှစ်ကြောင်းကို မျဉ်းပြိုင်များဟု ခေါ်သည်။ မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းသည် ထောင့်မှန်ဖြစ်အောင် တွေ့ဆုံကြလျှင် ၎င်းတို့သည် တခုနှင့်တခု ထောင့်မှန် ကျနေသည် ဟု ဆိုသည်။ ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် အထုံးပါ ကြိုးများဖြင့် ထောင့်မှန်များပြုလုပ်ကြသည်။ နှိုင်းမြစ် ရေလွှမ်းပြီးနောက် မြေတိုင်းရန် ကြိုးကို အသုံးပြုသူများကို ကြိုးဆွဲတိုင်းသူများဟု ခေါ်သည်။ ယခုအခါ လူတို့သည် မြေပြင်သို့ ထောင့်မှန်ကျသော မျဉ်းတစ်ခုရရန် ချိန်သီးကြိုးကို အသုံးပြုကြသည်။ လက်ယာဘက်ပုံတွင် မြင်ရသည့်အတိုင်း အချို့မျဉ်းများသည်မပြိုင်သော်လည်းမည်သည့်အခါမျှ မဆုံတွေ့နိုင်ကြချေ။ ဤသို့သော ဖြစ်ရပ်မျိုးတွင် မျဉ်းစေ့ မျဉ်းစောင်း အနေအထားတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။



တြိဂံများ

တြိဂံတစ်ခုသည် အနားသုံးနားဖြင့် ဘောင်ခတ်ထားသော ပြင်ညီပုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ တြိဂံပုံတစ်ခုတွင် အနားသုံးနား ထောင့်သုံးထောင့် နှင့် ထိပ်စွန်းမှတ်သုံးခုပါသည်။ တြိဂံများကို ပုံသဏ္ဌာန်အလိုက် အမျိုးအစား ခွဲခြားသည်။ တြိဂံတစ်ခု၏အတွင်းထောင့်သုံးခု ပေါင်းလဒ်သည် ၁၈၀° ဖြစ်သည်။



ပုံမှာ မီးရထားတံတားကို သံမဏိရက်မများဖြင့် ဆောက်ထားပြီး တြိဂံများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

တြိဂံအမျိုးအစားများ




အနားမညီတြိဂံ




နှစ်နားညီတြိဂံ



အနားညီတြိဂံ




ထောင့်မှန်တြိဂံ




နှစ်နားညီထောင့်မှန်တြိဂံ

တြိဂံများကို ၎င်းတို့၏ အနားများ နှင့် ထောင့်များဆက်သွယ်ချက်ကို လိုက်၍ အမျိုးအစား များစွာခွဲခြား နိုင်သည်။ အနားမညီ တြိဂံတစ်ခု တွင် အနားများ ထောင့်များသည် တခုနှင့် တခု မတူညီကြပေ။ နှစ် နားညီ တြိဂံတစ်ခုတွင် တူသော အနားနှစ်ခုပါပြီး အနားညီ တြိဂံ တစ်ခုတွင် အနားများ အားလုံး တူညီသည်။


တြိဂံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများ




ခဲတံများဖြင့် တြိဂံပုံဖော်ခြင်း




အနားမညီတြိဂံ




နှစ်နားညီတြိဂံ



အနားညီတြိဂံ





နှစ်နားညီ ထောင့်မှန်တြိဂံ



ထောင့်မှန်တြိဂံ


တြိဂံများ၏ဂုဏ်သတ္တိများ



မည်သည့် တြိဂံတွင် မဆို အတွင်းထောင့် သုံးထောင့် ပေါင်းခြင်းသည် ၁၈၀° နှင့် ညီသည်။




နှစ်နားညီတြိဂံတစ်ခု၏ အခြေထောင့်များ တူညီကြသည်။



တြိဂံတစ်ခု၏ အနားနှစ်ဘက်ပေါင်းလဒ်သည် ကျန်အနားထက် အစဉ် ကြီး၏။ အနားနှစ်ဘက် ခြားနားခြင်းသည် ကျန် အနားအောက်ငယ်သည်။

အနားညီတြိဂံတစ်ခု၏ ထောင့်သုံးခုစလုံးသည် တူညီကြသည်။



တြိဂံများကို ဖျဉ်းသုံးကြောင်းဖြင့်တည်ဆောက်ထား၏။ ထိုဖျဉ်းများကို တြိဂံ၏ အနားများဟုခေါ်သည်။အနားများတွေ့ဆုံရာအမှတ်ကိုထောင့်စွန်းဟု ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့်တြိဂံတစ်ခုတွင် အနားသုံးဘက် ထောင့်စွန်း သုံးခုနှင့် ထောင့်သုံးခု ပါသည်။ တြိဂံအမျိုးမျိုးရှိသည်။ အနားများကို လိုက်၍လည်းကောင်း၊ ထောင့်များကိုလိုက်၍လည်းကောင်း နှစ်နားညီ တြိဂံ၊ အနားညီတြိဂံ (သုံးနားညီ)၊ ထောင့်ကျဉ်းတြိဂံ၊ထောင့်ကျယ်တြိဂံ၊ထောင့်မှန်တြိဂံစသည်ဖြင့် ခွဲခြားနိုင်သည်။ တြိဂံများတွင် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိနှစ်ခု ရှိသည်။ တစ်ခုမှာ အတွင်းထောင့် သုံးခုပေါင်းသည် ၁၈၀° ရှိခြင်း ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ မည်သည့် တြိဂံတွင်မဆို အနားနှစ်ဘက်တို့၏ ပေါင်းလဒ်သည် ကျန် အနားထက်ကြီးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

စတုဂံများ

အနားလေးဘက်နှင့် ထောင့်လေးခုပါသော ပြင်ညီပုံကို စတုဂံဟု ခေါ်သည်။ စတုဂံတစ်ခုတွင် ထောင့်စွန်းလေးခုနှင့် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း နှစ်ခုရှိ၏။ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုလိုက်၍ စတုဂံအမျိုးအစားကို ခွဲနိုင်သည်။ အတွင်းထောင့် လေးခု ပေါင်းခြင်းသည် ၃၆၀° ဖြစ်သည်။

စတုဂံတစ်ခုတွင် ထောင့်စွန်းလေးခု၊ အနားလေးဘက်နှင့် ထောင့်လေးထောင့် ပါရှိသည်။ စတုဂံတစ်ခု၏ အတွင်းထောင့်လေးခု ပေါင်းခြင်းသည် ၃၆၀° သို့မဟုတ် ထောင့်မှန်လေးခုနှင့်တူညီသည်။

စတုဂံတစ်ခုတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထောင့်စွန်း နှစ်ခုကို ဆက်သွယ်သောမျဉ်းအား ထိုစတုဂံ၏ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းဟု ခေါ်သည်။ စတုဂံတစ်ခုတွင် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း နှစ်ခု ရှိသည်။

စတုဂံတစ်ခု၏ အနားလေးဘက်နှင့် ထောင့်လေးခုကို ကြည့်၍ စတုဂံအမျိုးအစားများ ခွဲနိုင်သည်။ သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွေ့မြင်နိုင်သော စတုဂံအမျိုးမျိုးကို ရှာကြည့်ပါ။


ပုံတွင်စတုဂံများရှာကြည့်ပါ။



စတုဂံအမျိုးမျိုး



တြာပီဇီယမ်



ထောင့်မှန်စတုဂံ




စတုရန်း




အနားပြိုင်စတုဂံ



ရွှမ်းပတ်



တြာပီဇိုက်




စွန်ပုံ




မြားခေါင်းပုံ

ပုံသဏ္ဌာန်ကို လိုက်၍ စတုဂံ အမျိုးအစားကို ခွဲနိုင်သည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားများ ပြိုင်နေသော စတုဂံကို အနားပြိုင်စတုဂံဟု ခေါ်သည်။ ထောင့်မှန် စတုဂံ၊ စတုရန်း၊ ရွှမ်းပတ် တို့သည် အနားပြိုင် စတုဂံများပင် ဖြစ်သည်။ စတုရန်းနှင့် ရွှမ်းပတ်များတွင် အနားအားလုံး တူညီသည်။ တြာပီဇီယမ်တစ်ခုတွင် အနားတစ်စုံ ပြိုင်သည်။ တြာပီဇိုက်သည် အနားပြိုင် ကင်းမဲ့သော စတုဂံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စွန်ပုံတစ်ခုတွင် တူညီသော နှစ်အနား နှစ်စုံ ရှိသည်။ မြားခေါင်းပုံ စတုဂံတစ်ခုသည် ထူးခြားသော စတုဂံတစ်ခု ဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာ အတွင်းထောင့် တစ်ခုသည် ၁၈၀° ထက် ကြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။

စတုဂံတစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းများ






ခဲတံများဖြင့် စတုဂံပုံဖော်ခြင်း



စတုဂံတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများ


ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများ၏ အလျား နှင့်၎င်းတို့ အချင်းချင်းပိုင်းဖြတ်ပုံ

စတုဂံတစ်ခု၏ အတွင်းထောင့်များ ပေါင်းလဒ်သည် ၃၆၀° ရှိ၏။




စတုဂံနှင့် ကြာပီဇိုယမ်ပုံတို့တွင် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏အလျားနှင့် ၎င်းတို့ အချင်းချင်း ပိုင်းဖြတ်သည့်နည်း အတိအကျ မရှိချေ။

စတုဂံကို လေးပိုင်းပိုင်းပြီး ထောင့်ခွန်းများကို ဆိုင်၍ ကော် နှင့် ကပ်ကြည့်ပါ။



ထောင့်မှန်စတုဂံ





စတုရန်း

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများ အလျား တူပြီး အချင်းချင်း ထက်ဝက် ပိုင်းသည်။

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများ အလျားတူပြီး အချင်းချင်း ထောင့်မှန် ကျ ထက်ဝက် ပိုင်းသည်။

အနားပြိုင်စတုဂံ



ရှမ်းဗတ်

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းအချင်းချင်း ထက်ဝက် ပိုင်းသော်လည်း အလျားချင်း မတူညီကြချေ။

ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း အချင်းချင်း ထောင့်မှန်ကျ ထက်ဝက်ပိုင်းသော်လည်း အလျားချင်း မတူညီကြချေ။



စက်ဝိုင်းများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် စက်ဝိုင်းသော ပုံဆောင်သည့် အရာဝတ္ထုများစွာ ရှိသည်။ စက်ဝိုင်းပေါ်ရှိအမှတ်တိုင်းသည် ဗဟိုမှညီတူကွာဝေးကြသည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိကိုအသုံးပြု၍ အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိသော စက်ဝိုင်းများကို ရေးဆွဲကြသည်။ စက်ဝိုင်း၏ စက်ဝန်းအလျားသည် အချင်းအလျား၏ သုံးဆခန့် ရှိသည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းတွင် မည်သည့်ဥသညီဗဟိုကိုမဆို ဆွဲနိုင်သည်။ ဗဟို၏ အနားအရေအတွက် များလာလေ ဗဟိုသည် စက်ဝိုင်းနှင့် တူလာလေ ဖြစ်သည်။

ရှေးအခါမှစ၍စက်ဝိုင်းပုံများကိုလှပသောပုံသဏ္ဌာန်များအဖြစ် မှတ်ယူကြသည်။ ကွန်ပါကိုသုံး၍ စက်ဝိုင်းများရေးဆွဲနိုင်သည်။ ကွန်ပါကို အမှတ်တစ်ခု (ဗဟို) ၌ ထောက်၍ လက်တံတစ်ဘက်တွင် ခဲတံကို တပ်ဆင်ကာ ကွန်ပါကို တစ်ပတ်လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ စက်ဝန်းပေါ်လာသည်။ စက်ဝန်းပေါ်ရှိ အမှတ်တိုင်းသည် ဗဟိုမှ ညီတူညီမျှ ကွာဝေးကြသည်။ စက်ဝိုင်းအတွင်း ဗဟိုကို ဖြတ်သွားသည့်မျဉ်းကို အချင်းဟု ခေါ်သည်။ စက်ဝိုင်း၏ဗဟိုမှ စက်ဝန်းပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခုကို ဆက်သွယ်ထားသောမျဉ်းကို ချင်းဝက် (ရေဒီယ) ဟု ခေါ်သည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အချင်းသည် ချင်းဝက်၏ နှစ်ဆ ရှိသည်။

စက်ဝိုင်းတစ်ခုအတွင်းတွင် သုံးနားညီတြိဂံ၊ စတုရန်း၊ ဥသညီညီပုံ အစရှိသည့်ပုံများကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲနိုင်သည်။ အဆိုပါပုံများ၏ အနားအရေအတွက် များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဗဟိုပုံတို့သည် စက်ဝန်းနှင့် ပိုမိုနီးစပ်လာသည်။ စက်ဝန်းနှင့် ၎င်း၏အချင်းတို့ အချိုးကို ဖော်ပြသော ဂရိစာလုံး π (ပိုင်) အကြောင်းကို နောင်တွင်ဆက်လက်လေ့လာကြမည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ ဧရိယာရှာနည်းကိုလည်း ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ကြမည်။



စက်ဝိုင်းများကိုရေးဆွဲပုံ



ဖန်ခွက်နှုတ်ခမ်းအသုံးပြု၍ရေးဆွဲခြင်း




ကွန်ပါကိုအသုံးပြု၍ရေးဆွဲခြင်း အပ်နှင့်အပ်ချည်ကိုအသုံးပြု၍ရေးဆွဲခြင်း



တုတ်ချောင်းကိုသုံး၍ ရေးဆွဲခြင်း

စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အဝိတ်အပိုင်းများ




စက်ဝန်းနှင့် ၎င်း၏အချင်းမျဉ်းအလျား




မျဉ်းကြောင်းတလျှောက် ပိုက်ဆံပြားကို လိုမိပါ။

စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ စက်ဝန်းအလျားသည် ထိုစက်ဝိုင်း၏ အချင်း အလျားထက် သုံးဆကျော်ကျော် ရှည်သည်။

စက်ဝန်းတလျှောက်ရှိ ပုတီးစေ့အရေအတွက်နှင့် အချင်းမျဉ်းတလျှောက်ရှိ ပုတီးစေ့ အရေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။




တီးဝိုင်းသုံးတြိဂံ
(အနားညီတြိဂံ)




ရောင်စုံစက္ကူများ
(စတုရန်း)




ဆီးပွင့်တစ်မျိုး
(ဥသံညီပဉ္စဂံ)




လိပ်ခွံ
(ဥသံညီဆဋ္ဌဂံ)




ထိမ်း
(ဥသံညီအဋ္ဌဂံ)



တာယာ
(စက်ဝိုင်း)



ကွန်ပါကိုသုံး၍ဆွဲနိုင်သောပုံစံများ



ကွန်ပါတစ်ခုကိုသုံး၍လှပသောပုံစံများ ဖော်နိုင်သည်။ ပုံတွင် ပြထားသော ပုံစံများကဲ့သို့ အဆင်များကို ရေးဆွဲကြည့်ပါ။

စက်ဝိုင်းလုံးချွန်တစ်ခုကို ပြင်ညီတစ်ခုဖြင့်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် စက်ဝိုင်း၊ အလစ်၊ ပရာဗလ၊ ဟိုက်ပါ၊ ဗလာ စသည့် ကောနစ် ဖြတ်ပိုင်းပုံ မျဉ်းကွေးများကို ရရှိနိုင်သည်။ စက်ဝိုင်းသည် တခါတရံ ၎င်း၏စက်ဝန်းဟုအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဥသံညီဗဟုဂံများဖြင့် နှိုင်းစပ်ခန့်မှန်းကြည့်ခြင်းကို ရှေးကတည်းက သိခဲ့ကြသည်။ ထိုအယူအဆသည် စည်းသတ်တန်ဖိုးအလိုက် ပြောင်းနှိုးရှာခြင်း၊ သမုဟပြုခြင်း သဘောတရားများ၏အခြေခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် စက်ဝိုင်း၏ အဝန်းနှင့် ရေယာတို့ကို အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ရာတွင် ထိုသဘောတရားများကို အသုံးပြုရပြန်သည်။

မျဉ်းကွေးအမျိုးမျိုး

ကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မျဉ်းကွေးများဖြင့် ဘောင် ခတ်ထားသော ပုံသဏ္ဌာန်များကို တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်း မျဉ်းကွေးများတွင် စက်ဝိုင်းများ၊ 'အီလစ်ပ့်' များ၊ 'ဘဲဥပုံ' များ၊ 'ပရာဗလာ' များ၊ 'ဟိုက်ပါဗလာ' များ၊ 'ကတိန်ရီ' များ၊ 'အင်ဗိုလု' များ၊ 'ဆိုက်ကလိုက်' များ ပါဝင်သည်။

မျဉ်းကွေးတစ်ခုစီ သီးသန့်အမည်တစ်ခုစီ ရှိကြသည်။ လုံးဝ စက်ဝိုင်းနေသော မျဉ်းကွေးကို စက်ဝိုင်းဟုလည်းကောင်း၊ ထိုစက်ဝိုင်းကို အနည်းငယ် ညှစ်လိုက် ခြင်းဖြင့် ရသောပုံများကို 'အီလစ်ပ့်' ဟု လည်းကောင်း၊ လေထဲသို့ပစ်လိုက်သော ဘောလုံး၏ သွားရာလမ်းကြောင်း ပုံမျိုးကို 'ပရာဗလာ' ဟု လည်းကောင်း ခေါ် သည်။ လုံးချွန် (ကတော့ပုံ) တစ်ခု၏ ဘေးနှင့် အခြေကိုပြင်ညီတစ်ခုဖြင့် ပိုင်းဖြတ် ရာမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ပုံမျိုးကို 'ဟိုက်ပါဗလာ' ဟု လည်းကောင်း၊ အမြင့်တူ အမှတ်နှစ်ခုကို ကြိုးတစ်ခုဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကြိုး၏ပုံမျိုးကို 'ကတိန်ရီ' ဟု လည်းကောင်း ခေါ်သည်။ အပ်ချည်လုံး၏ ချည်စ အစွန်းကိုဆွဲ၍ အပ်ချည်လုံးကို လှည့်ပတ် ဆွဲသောအခါ ရလာသည့်ပုံကို 'အင်ဗိုလု' ဟု ခေါ် သည်။ ဘီး၏အပြင်အနားပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခုကို ယူပါ။ ထိုဘီးကို မျဉ်းကြောင်း တစ်ကြောင်းပေါ်၌ လှိမ့်လိုက်သောအခါ ထိုအမှတ်၏ သွားရာ လမ်းကြောင်းကို 'ဆိုက်ကလိုက်' ဟု ခေါ်သည်။

မုန်လာဥနီကို ပိုင်းဖြတ်ထားပုံများ





မုန်လာဥနီတစ်ခုကို သုံးမျိုးပိုင်းဖြတ်ခြင်း ဖြင့် မျဉ်းကွေး သုံးမျိုး ရလာသည်။




စာတ်ပြား (စက်ဝိုင်း)





ဂြိုဟ်တုတစ်ခု၏ လမ်းကြောင်း (အီလစ်ပ့်)




ဘဲဥ (ဘဲဥပုံမျဉ်းကွေး)



အမြောက်ဆန်တစ်ခု၏လမ်းကြောင်း (ပရာဗလာ)




ဂျပန်ဗို (ဟိုက်ပါဗလာ)



ကြိုးတံတား (ကတိန်ရီ)






စေးကပ်သော တိပ်ခွေတစ်ခု၏ အစွန်း၌ ခဲတံထား၍ တိပ်ခွေကို ပတ်ပြီး ဆွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် အင်ဗိုလုပ်တစ်ခုကိုရနိုင်သည်။


စက်ဘီး တစ်စီး၏ ဘီးကိုမျဉ်းပြောင်း အတိုင်း လှိုမ့်လှိုင်ဘီး၏ အဝန်းပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခု၏ သွားရာ လမ်းကြောင်းသည် ဆိုက်ကလွိုက်ပုံ ဖြစ်လာသည်။




မျဉ်းပြောင်းများနှင့် မျဉ်းကွေးများ



မျဉ်းပြောင်းများဖြင့် ဆွဲထားသော မျဉ်းကွေးများ




မျဉ်းပြောင်းများဖြင့် ဆွဲထားသော စက်ဝိုင်းတစ်ခု




စက်ဝိုင်းများဖြင့် ဆွဲထားသော စက်ဝိုင်းတစ်ခု


ပုံသဏ္ဌာန်များနှင့် ရှင်မြူးစရာ အမြင်မှားယွင်းမှု




မြားခေါင်းများကြောင့် အောက် မျဉ်းပြောင်းသည် အထက် မျဉ်းပြောင်းထက် ပိုရှည်သည်ဟု ထင်ရသည်။



မျဉ်းခေါင်းနှစ်ခု တတန်းတည်း ကျနေသော်လည်း မကျဟု ထင်ရသည်။




မျဉ်းပြိုင် သုံးကြောင်းမှာ မပြိုင်ဟု ထင်ရသည်။



စတုရန်းများ၏ အနားများ မပြောင်းဟု ထင်ရသည်။



ဒေါင်လိုက် မျဉ်းက ရေညီမျဉ်းထက် ပိုရှည်သည်ဟု ထင်ရသည်။



တိုင်သုံးလုံးအမြင့်တူညီကြသည်။




အနက်ရောင်ကိုသာ ကြည့်လျှင် မျက်နှာချင်းဆိုင်နေကြသည်လူနှစ်ဦးကို တွေ့ရမည်။ အဖြူကိုသာ ကြည့်လျှင် ယောက်ျား တစ်ဦး၏ ခေါင်းပေါ်၌ မိန်းမတစ်ဦး၏ ဦးခေါင်းစောက်ထိုးကို တွေ့ရမည်။

ပုံတစ်ခုသည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပုံသဏ္ဌာန်များကြောင့် ပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲသွားသည်ဟု ထင်ရတတ်သည်။ ထိုအဖြစ်မျိုးကို လူ့လောက၌လည်း ကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ လူတစ်ယောက်သည် အဝတ် အစား အဆင်အပြင်ကြောင့် ဝလာသည် သို့မဟုတ် ပိန်သွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ လည်ဆံမွေးများကြောင့် ခြင်္သေ့အထီးသည် ခြင်္သေ့အမထက်လည်းကောင်း၊ ရှည်သောအမြီးများကြောင့် ဒေါင်းဖိုသည် ဒေါင်းမထက်လည်းကောင်း ပိုမို ကြီးထွားသည်ဟု ထင်ရသည်။

ထုပုံများ


ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထုပုံများစွာ တွေ့နိုင်သည်။လုံးချွန် (ကတော့ပုံ) တွင် စက်ဝိုင်း ပုံအခြေရှိပြီး ထိပ်သို့စုသွားသည်။ ပိရမစ်တွင် ဗဟိုအခြေနှင့် ထိပ်စွန်းမှတ်၌ ဆုံကြသော ဩဂံပုံဘေးမျက်နှာပြင်များရှိသည်။ လုံးရှည် (ဆလင်ဒါ) သည် တလိမ့်တုံးပုံမျိုးဖြစ်ပြီး ပရစ်ဇမ်သည် ကုဗတုံးပုံမျိုး ဖြစ်သည်။ ထုပုံတစ်ခု၏ ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်ကျသော အရိပ်ကို ပုံရိပ်ဟု ခေါ်သည်။ ဝင်ရိုးတစ်ခု၌ ပြင်ညီပုံကိုလှည့်လျှင် 'လှည့်ထု' တစ်ခု ရသည်။



စက်မှုပြပွဲတစ်ခုမှ ပြခန်းတစ်ခု


ပြင်ညီပုံတစ်ခု၌ ထူနှင့် အမြင့် မရှိချေ။ ထုပုံ တစ်ခု၌ အလျား၊အနံနှင့်အမြင့်ရှိသည်။ ပိရမစ်တစ်ခု၏ အခြေတွင် အနား သုံးနား၊ လေးနား၊ ခြောက်နား၊ ရှစ်နား ရှိသည်ကိုလိုက်၍ ထိပ်ရမစ်ကို ဩဂံပိရမစ်၊ စတုဂံပိရမစ်၊ ဆဋ္ဌဂံပိရမစ်၊ အဋ္ဌဂံပိရမစ် ဟု ခေါ်သည်။ ပိရမစ်၏အခြေဖြစ်သည့် ဥသည့်ဗဟိုမှ အနားအရေအတွက် အလွန်များလာသော အခါ ပိရမစ်သည် လုံးချွန်တစ်ခု နီးပါး ဖြစ်လာပေမည်။ ပရစ်ဇမ်တစ်ခုတွင် အထက်နှင့် အောက် မျက်နှာပြင် နှစ်ခုသည် ထပ်တူကျပြီးပြိုင်နေသည့် ဗဟိုပုံများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းပရစ်ဇမ်တို့၏ ဘေး မျက်နှာပြင်များသည် ထက်အောက် ဗဟိုများ၏ အနားများ ပေါ်ရှိ မျက်နှာချင်းဆိုင် အမှတ် တစ်စုံစီကို ဆက် သွယ်၍ ရသော မျဉ်းပြိုင်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။ အထက်နှင့် အောက်ခြေမှ ပုံသဏ္ဌာန်ကိုလိုက်၍ ဩဂံပရစ်ဇမ်၊ စတုဂံပရစ်ဇမ်၊ ဆဋ္ဌဂံပရစ်ဇမ် စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိသည်။ အနားစောင်းခြောက်ခုပါခံတံတစ်ခုမှာ ဆဋ္ဌဂံပရစ်ဇမ် ပုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အောက်ခြေမျက်နှာပြင် ဥသည့် ဗဟို၌ အနားအရေအတွက် အလွန်များသောအခါ ပရစ်ဇမ်သည် စက်ဝိုင်းလုံးရှည် နီးပါး ဖြစ်လာမည်။

ပုံရိပ်ချခြင်း



လုံးချွန်ပုံတစ်ခု၏ပုံရိပ်ချခြင်း


လုံးချွန်ပုံကို ဘေးမှမြင်ရပုံ



လုံးချွန်ပုံကို အပေါ် နှင့်အောက်မှမြင်ရပုံ

ထုပုံတစ်ခု၏ ပုံရိပ်ဇယားတွင် ထိုပုံအား ပြင်ညီ အနေ အထား အမျိုးမျိုးသို့ချ၍ ရသောပုံရိပ်များ ပါဝင်သည်။

ပိရမစ်နှင့်လုံးချွန်ပုံများ




ပုံမှန်ဩဂံပိရမစ်

ပုံမှန်စတုဂံပိရမစ်

ပုံမှန်ဆဋ္ဌဂံပိရမစ်

ပုံမှန်အဋ္ဌဂံပိရမစ်

ပရစ်ဇမ်များနှင့်လုံးရှည်များ



ပုံမှန်ဩဂံပရစ်ဇမ်

ပုံမှန်စတုဂံပရစ်ဇမ်






ပုံမှန်ဆဋ္ဌဂံပရစ်ဇမ်

ပုံမှန်အဋ္ဌဂံပရစ်ဇမ်





စက်ဝိုင်းပုံ ယပ်တောင်ငယ် ကိုလှည့်ခြင်းဖြင့် ဘောလုံးပုံထုတစ်ခု ရလာသည်။

ပြင်ညီ မျက်နှာပြင်များစွာပါသော ထုကို 'မျက်နှာ
များထု' ဟုခေါ်သည်။ မျက်နှာများပုံမှန်ထု၏ မျက်
နှာများသည်ထပ်တူကျညီညွတ်မှုများဖြစ်သည်။
လေးမျက်နှာပုံမှန်ထု၊ ခြောက်မျက်နှာပုံမှန်ထု၊ ရှစ်
မျက်နှာပုံမှန်ထု၊ ဆယ်နှစ်မျက်နှာပုံမှန်ထု နှင့် မျက်နှာ
နှစ်ဆယ်ပုံမှန်ထု တို့၏ ပုံများကို ပုံဖော်ပြထားသည်။
ထောင့်မှန်တြိဂံတစ်ခု၏ ထောင့်မှန်ဆောင် အနား
တစ်ဘက်ကို ဝင်ရိုးယူ၍ တစ်ပတ်လှည့်ယူခြင်းဖြင့်
ဝက်ဝိုင်းလုံးချွန်တစ်ခုရနိုင်သည်။ ထို့အတူထောင့်မှန်
တတုဂံတစ်ခု၏အနားတစ်ဘက်ကိုဝင်ရိုးယူ၍တစ်ပတ်
လှည့်လျှင် လုံးရှည်တစ်ခုရသည်။ စက်ဝိုင်းခြမ်းတစ်ခု
၏ အချင်းကို ဝင်ရိုးထား၍ တစ်ပတ်လှည့်ယူလျှင်
ဝက်လုံးတစ်ခုရသည်။ ပြင်ညီပုံတစ်ခုသည် ဝင်ရိုး
တစ်ခုကို ပတ်၍လှည့်ခြင်းဖြင့် ထုပုံရနိုင်သည်။ ထို
စုပုံကို လှည့်ထုဟု ခေါ်သည်။ ကြွေအိုးနှင့် မြေအိုး
များမှာ လှည့်ထုများ၏ ဥပမာအချို့ဖြစ်သည်။ မြေ
အိုးဖုတ်သူ၏ အိုးလှည့်စက်သည် လှည့်ထုပြုလုပ်သည့်
ကိရိယာတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။




မုန့်ထုပ်တစ်ထုပ်

အန်စာတုံး




ပြက္ခဒိန်တစ်ခု


ဘောလုံးတစ်လုံး



စက်ဝိုင်းလုံးချွန်



စက်ဝိုင်းလုံးရှည်



စက်ဝိုင်းခြမ်းတစ်ခုကို အချင်း၌ပတ်၍ လှည့် ခြင်း ဖြင့် စက်လုံး ကို ရသည်။

အမှတ်များ၏ နေရာများ

အမှတ်နှစ်ခုကို ဖြတ်၍ မျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်း ဆွဲနိုင်သည်။ မျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်းပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခု၏နေရာကို ကိန်းတစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခု၏နေရာကို ကိန်းနှစ်လုံးတွဲဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဟင်းလင်းပြင် တစ်ခုရှိ အမှတ်တစ်ခု၏နေရာကို ကိန်းသုံးလုံးတွဲဖြင့် ဖော်ပြ နိုင်သည်။ မည်သည့်ပုံပင်ဖြစ်စေ အမှတ်များ ပါဝင်သော အစုသာ ဖြစ်သည်။


မျဉ်းဖြောင့် တစ်ကြောင်းပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ တည်နေရာကို ကိန်းများဖြင့် ဖော်ပြရန် ထိုမျဉ်းပေါ်တွင် မူလမှတ်၊ ယူနစ်အလျားနှင့် အပေါင်းညွှန်ရာဘက် တို့ကို ရွေးရသည်။ အောက်ပုံတွင် 'ဗီး'၏ အိမ်ကို မူလ အမှတ်၊ ၁၀ မီတာကို ယူနစ်အလျား၊ အရှေ့ဘက်ကို အပေါင်းညွှန်ရာဘက်အဖြစ် ရွေးထားသည်။ ပြင်ညီတစ်ခုပေါ်ရှိ အမှတ်များ၏ တည်နေရာကို ကိန်း ခုတွဲများဖြင့် ဖော်ပြရန် ထောင့်မှတ်ကျ မျဉ်း နှစ် ကြောင်းဆွဲပါ။ ထိုမျဉ်းများ ဖြတ်မှတ်ကို မူလအမှတ် ဟုယူပါ။ မျဉ်းနှစ်ကြောင်းကို x -ဝင်ရိုးနှင့် y -ဝင်ရိုး ဟု ခေါ်ပါ။ အမှတ် p သည် y -ဝင်ရိုးမှ ထောင့်မှတ် အကွာအဝေး a ရှိပြီး x -ဝင်ရိုးမှ b ရှိလျှင် p ကို (a, b) ဖြင့် ပြနိုင်သည်။ (a, b) ကို အစီအစဉ်ကျ စုံတွဲ၊ a နှင့် b ကို ကိုဩဒိနိတ်များဟု ခေါ်သည်။

ခေတ်မီမြို့တစ်မြို့ကို ကောင်းကင်မှကြည့်လျှင် ကျား ကွက်ပုံအတိုင်း မြင်ရသည်။ လမ်းများသည် အရှေ့ အနောက်၊ တောင်မြောက် တန်းနေသည်။ လမ်းဆုံ များကို သုံး၍ မြို့၏ဒေသများကို ဖော်ပြနိုင်သည်။




ပြင်ညီပေါ်ရှိအမှတ်များ


ဗီး၏အိမ်လမ်းပကြီးကိုပုံတွင်ဖော်ပြထားသည်။ အိမ်၏အရှေ့ဘက် မီတာ ၃၀ တွင် စာတိုက်ပုံးရှိ၍အနောက်ဘက်မီတာ ၄၀ တွင် ကားမှတ်တိုင်ရှိသည်။ အိမ်ကို မူလအမှတ်ဟုသတ်မှတ်လျှင် စာတိုက်၏ နေရာကို မီတာ ၃၀ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကားမှတ်တိုင်ကို မီတာ -၄၀ ဖြင့်လည်းကောင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။




ပြင်ညီပေါ်ရှိအမှတ်များ




ကျားကွက်ပေါ်တွင် ဒေါင်လိုက်မျဉ်း ၆ နှင့် ရေညီမျဉ်း ၄ တို့၏ ဖြတ်မှတ်နေရာ၌ ကျား တစ်ကောင် တွေ့နိုင်သည်။ ထိုနေရာကို (၆, ၄) အမှတ်ဟုဖော်ပြနိုင်သည်။ ဒေါင် လိုက် မျဉ်းအတွက် ကိန်းကို ပထမဦးဆုံး ယူရသည်။ ကျားကွက်ပေါ်ရှိ အမှတ်တစ်ခု စီကိုကိန်းစုံတွဲ (A, B) ဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။



မြေပုံပေါ်တွင် ခြယ်မှုန်းထား သောနေရာကို $(D, 4)$ နေရာဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။



အမှတ်များပါသော အစုအမျိုးမျိုး



အရောင်တူသော မျဉ်းပြတ်တို့သည် အလျား တူသည်။

ဟင်းလင်းပြင်ရှိအမှတ်တစ်ခု၏နေရာ
အမှတ်တစ်ခု၏ နေရာကို သတ်မှတ်ရန် x -ဝင်ရိုး၊
 y -ဝင်ရိုး၊ z -ဝင်ရိုးများကိုသုံးသည်။ ဝင်ရိုးသုံးခု
သည် O အမှတ်၌ တခုကိုတခု ထောင်မှန်ကျ
သည်။ အမှတ် P သည် yz -ပြင်ညီမှ ၃ ယူနစ်၊
 xz -ပြင်ညီမှ ၄ ယူနစ်နှင့် xy -ပြင်ညီမှ ၅ ယူနစ်
အသီးသီးကွာဝေးသည်။ ထို့ကြောင့် P အမှတ်ကို
(၃, ၄, ၅) ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။



ဂေါ်လီလူးများဖြင့် ပုံဖော်ထားသော မော်တော်ကားပုံ
ဇာပန်းထိုးပုံ




နီယွန်မီးချောင်းသုံးကြော်ငြာများ
ပွဲကြည့်သူများ ပြည့်နေသည့် ကစားကွင်း




သင်္ချာပုံစံများ


ထုပ်ပုံတစ်ခု၏ သုံးဘက်တိုင်း ပုံစံတစ်ခုသည် ထိုထုပ်အား အနားများ၊ မျက်နှာပြင်များ၊ ထိပ်စွန်းမှတ်များဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဆောက်လုပ်ထားသည်ကို ပြသသည်။ အချို့သော ထုပ်ပုံများကို စောင်းများတလျှောက် ဖြတ်ပြီး ဖြန့်ထုတ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ထုပ်ပုံမပြင်ညီပုံတစ်ခုကို ရနိုင်သည်။ ၎င်း ပြင်ညီပုံကို အနားစောင်းများတလျှောက် ကော်ကပ်ယူလျှင် မူလထုပ်ကို ပြန်လည်ရရှိသည်။




မျက်နှာပြင်များသော ပုံမှန်ထုပ်များ



ပိရမစ်နှင့်လုံးချန်ပုံများ (ထုပုံ-အပြာရောင်၊သုံးဘက်တိုင်းပုံစံ-မျဉ်းအပြာများ၊ခေါက်ရိုးအလိုက်ဖြန့်ထားပုံ-မျဉ်းအနီများ)



ပရစ်ဇမ်များနှင့် လုံးရှည်များ (ထုပုံ-အပြာရောင်၊သုံးဘက်တိုင်းပုံစံ-မျဉ်းအပြာများ၊ခေါက်ရိုးအလိုက်ဖြန့်ထားပုံ-မျဉ်းအနီများ)




အပ်ပေါက်ကင်မရာ


ကတ်ပြားတစ်ခု၏အနားစောင်းများကိုခေါက်ပြီး ကော်ကပ်ခြင်းဖြင့် အပ်ပေါက်ကင်မရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။

ဆင်တိမီတာဖြင့် ပြထားသည်။

(အောက်ပုံ) တစ်ဘက်ပွင့် အတွင်း သေတ္တာ၏ အခြား တစ်ဘက်တွင် အပ်ပေါက်ဖောက်ထားပြီး ပုံကူးစက္ကူ ဖြင့် ကော်ကပ်ပြီး ပိတ်ထားပါ။



(ယာပုံ) အတွင်း သေတ္တာငယ်ကို အပြင် သေတ္တာအတွင်းသို့ ထည့်ပါ။ ပုံရိပ်သည် ပုံကူးစက္ကူပေါ်၌စောက် ထိုးပေါ်လာမည်။





ထုပုံများ တည်ဆောက် ထားပုံကို နားလည် ရန် နည်းတစ်ခုမှာ ထိုထုပုံ၏ပြင်ညီပေါ်တွင် ခေါက်ရိုး အလိုက် ဖြန့်ထားပုံကို ကြည့်ရှုနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဖြန့်ထားပုံများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် လေးမျက်နှာ ပုံမှန်ထု တစ်ခု၌ သုံးနားညီ တြိဂံလေးခု ပါဝင် ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကုဗတုံးတစ်ခု၌ ထပ် တူညီစတုရန်း ခြောက်ခု ပါဝင်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ရှစ်မျက်နှာပုံမှန်ထု၌ သုံးနားညီ တြိဂံရှစ်ခု ပါဝင်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း သိနိုင် သည်။ စက္ကူပုံး တစ်ခု၏ အနားစောင်းများ တလျှောက် ဖြတ်ခြင်းဖြင့် စက္ကူပုံး၏ ခေါက်ရိုး အလိုက် ဖြန့်ထားပုံကို ပြင်ညီပုံအဖြစ် ရရှိသည်။ ထုပုံတစ်ခု၏ သုံးဘက်တိုင်း ပုံတစ်ခုကို ဆွဲလို လျှင် မြင်နိုင်သော အနားစောင်း များအတွက် မျဉ်းရိုးရှိ၊ မမြင်နိုင်သော အနားစောင်း များ အတွက် အစက်မျဉ်းများကိုသုံး၍ ဆွဲရသည်။ ထုပုံ တစ်ခု၏ ပြင်ညီဖြန့်ထားပုံကို အနားစောင်းများ တလျှောက် ပြန်လည်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ထုပုံစံကို ပြန်ရသည်။

သဏ္ဌာန်တူခြင်းနှင့် ထပ်တူညီခြင်း

ဂရိသင်္ချာပညာရှင် သေးလီသည် ပီရမစ်၏ အမြင့်ကို ရှာရန် သဏ္ဌာန်တူခြင်း သဘောတရားကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပုံနှစ်ခုသည် အရွယ်အစားမတူသော်လည်း ပုံစံတူကြလျှင် ထိုပုံများကို 'သဏ္ဌာန်တူ' သည်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ပုံတစ်ခုကို နောက်ပုံတစ်ခုပေါ်၌ တထပ်တည်း ကျအောင် ထပ်နိုင်လျှင် ပုံနှစ်ခု 'ထပ်တူညီ' သည်ဟု ဆိုသည်။

ပီရမစ်တစ်ခု၏အမြင့်ကိုရှာပုံ
လွန်ခဲ့သော နှစ် ၂၅၀၀ ခန့်က ဂရိ
သင်္ချာပညာရှင် သေးလီ သည် တုတ်
ချောင်း တစ်ချောင်း၏ အရိပ်အလျားမှ
ပီရမစ် တစ်ခု၏အမြင့်ကို တွက်ပြခြင်း
ဖြင့်လူအများကို အံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။



သေးလီ၏ တွက်နည်းတွင် ပီရမစ်နှင့် ၎င်း၏ အရိပ်
ပါသည့် တြိုက် ABC သည် တုတ်ချောင်းနှင့် ၎င်း၏
အရိပ်ပါသည့် တြိုက် DCE နှင့် သဏ္ဌာန်တူသည်
ဟူသောအချက်တွင်အခြေခံသည်။ သဏ္ဌာန်တူခြင်း
ဂုဏ်သတ္တိအရ

$$\frac{AB}{BC} = \frac{DC}{CE} \text{ ရသည်။}$$

သေးလီသည် အလျား BC, DC နှင့် CE တို့ကို
တိုင်းတာပြီး အထက်ပါ ညီမျှခြင်းမှ ပီရမစ်၏ အမြင့်
AB ကို တွက်နိုင်ခဲ့သည်။


ဖလင်တစ်ခုမှ ဓာတ်ပုံများကို လိုအပ်သည့် အရွယ်ရအောင် ချဲ့ယူနိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံနှင့် ဖလင်တို့မှာ
အရွယ်မတူသော်လည်း ပုံသဏ္ဌာန်တူသည်။ ဓာတ်ပုံနှင့်မူရင်းပုံသည် သဏ္ဌာန်တူသည်ဟု ခေါ်မည်။
ပုံတစ်ခုကို အခြားပုံတစ်ခုပေါ်၌ အတိအကျညီနေအောင် ထပ်နိုင်လျှင် ထိုပုံတို့သည် ထပ်တူညီ
သည်ဟု ခေါ်သည်။ သဏ္ဌာန်တူပုံများနှင့် ထပ်တူညီပုံများကို သင့်ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှာကြည့်ပါ။

ထပ်တူညီပုံများ



ဓာတ်အိတ်များ

ဓာတ်အုပ်များ




ဇွန်းများ



နွားနို့ပုလင်းများ



သဏ္ဌာန်တူ ပုံများ



ရိပ်ထင်အရုပ်

သစ်ရွက်အကြီးနှင့်အငယ်



လိပ်ပြာများ



ကားတစ်စီးနှင့်
၎င်း၏ ပုံစံငယ်

ချို့ထားသောပုံများ ချွဲထားသောပုံများ

ပုံတစ်ပုံ၏ချို့ထားသော ပုံငယ်သည် မူရင်းပုံနှင့်ပုံ သဏ္ဌာန်တူသော်လည်း အရွယ်ပမာဏပို၍ငယ်သည်။ ထို့အတူ ပုံကြီး ချွဲထားသော ပုံသည် အရွယ်ပမာဏ ပို၍ ကြီးသည်။ ပုံတစ်ပုံကို ဒေါင်လိုက် သက်သက်၊ အလျားလိုက် သက်သက် ချို့လျှင် ချွဲလျှင် မူရင်း ပုံနှင့် သဏ္ဌာန် မတူတော့သော ပုံပျက်ကိုသာရသည်။

မြေပုံဆွဲနည်း



ကောင်းကင်မှ ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း




မြေတိုင်းနေစဉ်



ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ

မြေပုံတစ်ခုသည် ချို့ထားသော ပုံငယ်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင် ဓာတ်ပုံနှင့် မြေတိုင်းထားချက်တို့ကို အသုံးပြု၍ ယာဘက်မှ မြေပုံမျိုး ဆွဲနိုင်သည်။



—	ဘူတာရုံ
⊕	ဆေးရုံ
⊗	ကျောင်း
⬆	ဘုရားကျောင်း
⊗	ရဲစခန်း
⊙	ကစားကွင်း
⊕	စက်ရုံ
↓	သင်္ဘောဆိပ်
⊕	စာတိုက်


ချို့ထားသောပုံများ၊ ချွဲထားသောပုံများ



ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသည် ပုံငယ်အဖြစ် ချို့ခြင်း ဖြစ်သည်။




နက်ဂတစ်မှ ပုံကြီးချွဲသည်။



ပုံကြီးချွဲထားသောပုံသည် မူရင်းပုံနှင့် သဏ္ဌာန်တူသော်လည်း အရွယ်ကြီးသည်။ ချို့ထားသော ပုံသည် မူရင်းပုံနှင့် သဏ္ဌာန်တူသော်လည်း အရွယ်ငယ်သည်။ ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံသည် မူရင်းပုံကို ချို့၍ ရိုက်ထားသောနက်ဂတစ်ကို တဖန်ပြန်၍ ပုံကြီးချွဲ ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံကိုအလျားလိုက် သက်သက် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက် သက်သက် ချို့ခြင်း ချွဲခြင်းဖြင့် ပုံပျက်တစ်ခုသာ ဖြစ်ပေါ်လာမည်။

ပုံပျက်များ



ပုံပျက်စေသော မှန်တစ်ချပ်


ခေါက်ချိုးညီခြင်းများ

ပုံတစ်ခုသည် အခြားပုံတစ်ခု၏ ကြေးမုံရိပ်ဖြစ်လျှင် ထိုပုံနှစ်ခုတို့သည် ခေါက်ချိုးညီသည်ဟု ဆိုသည်။ အမှတ်တစ်ခုကို အသေထား၍ ထိုအမှတ်၌ ၁၈၀ လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံနှစ်ခုသည် တထပ်တည်းကျနေလျှင် ထိုပုံနှစ်ခုကို ခေါက်ချိုးညီသည်ဟုခေါ်သည်။ အမှတ်တစ်ခု၌ခေါက်ချိုးညီခြင်း၊ မျဉ်းတစ်ကြောင်း၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်းနှင့် ပြင်ညီတစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်းဟူ၍သုံးမျိုးရှိသည်။




မူလပုံနှင့် ၎င်း၏ ကြေးမုံရိပ်တို့သည် ကြေးမုံမျက်နှာပြင်တလျှောက် ခေါက်ချိုးညီသည်။

ခေါက်ချိုးညီခြင်းအမျိုးမျိုး




ပုံတစ်ခုကို မျဉ်းဖြောင့် တလျှောက်ခေါက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံ၏ ဝဲဘက်ခြမ်းနှင့် ယာဘက်ခြမ်း သည် တ ထပ်တည်း ကျ လျှင် ထိုပုံကို ၎င်းမျဉ်းတလျှောက်ခေါက်ချိုးညီသည်ဟု ဆိုသည်။

ပုံတစ်ခုကို အမှတ်တစ်ခု၌ မူသေထား၍ ထောင့် ၁၈၀ လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် မူလပုံအတိုင်း ဖြစ်နေလျှင် ထိုပုံကို ထိုအမှတ်၌ ခေါက်ချိုး ညီသည်ဟု ဆိုသည်။



ထုပုံတစ်ခုကို ပြင်ညီတစ်ခုဖြင့် ထက်ဝက်အညီပိုင်း၍ ရ လျှင် ထိုပုံသည် ထိုပြင်ညီ၌ ခေါက်ချိုးညီသည်ဟု ဆိုသည်။

ခေါက်ချိုးညီပုံများ



လေရဟတ်တစ်ခု၏ အရွက်များ

အမှတ်တစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း



ပန်းကာတစ်ခု၏ဒလက်များ

အမှတ်တစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း



လိပ်ပြာတစ်ကောင်သည် ပြင်ညီတစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီသည်။
လိပ်ပြာ၏ဓာတ်ပုံမှာမူမျဉ်းတစ်ကြောင်း၌ ခေါက်ချိုးညီသည်။



ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု



စက်မှုပြပွဲတစ်ခု၏တံဆိပ်

မျဉ်းတစ်ကြောင်း၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း



ဂျပန်အလံ

မျဉ်းတစ်ကြောင်း၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း
အမှတ်တစ်ခုနှင့် မျဉ်းတစ်ကြောင်းတို့၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း

ပုံတစ်ခုသည် အခြားပုံတစ်ခု၏ ကြေးမုံရိပ်ဖြစ်လျှင် ထိုပုံနှစ်ခုတို့သည် ခေါက်ချိုးညီသည်ဟုဆိုသည်။ အမှတ်တစ်ခုကို အသေထား၍ ထိုအမှတ်၌ ၁၈၀ လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် ပုံနှစ်ခုသည် တထပ်တည်းကျနေလျှင် ထိုပုံနှစ်ခုကိုလည်း ခေါက်ချိုးညီသည်ဟု ခေါ်သည်။ အမှတ်တစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်း၊ မျဉ်းတစ်ကြောင်း၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်းနှင့် ပြင်ညီတစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီခြင်းဟူ၍ သုံးမျိုး ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်အများစု၏ ကိုယ်ခန္ဓာများသည် ပြင်ညီတစ်ခု၌ ခေါက်ချိုးညီကြသည်။ သူတို့၏ ဝဲဘက်သည် ယာဘက်၏ ကြေးမုံရိပ်များ အသွင်ဆောင်သည်။ စက်ဝိုင်းသည် ဗဟိုနှင့် အချင်းမျဉ်းတလျှောက် ခေါက်ချိုးညီသည်။ စက်လုံးသည် ထိုစက်လုံး၏ ဗဟိုကိုဖြတ်သော ပြင်ညီ၌လည်းကောင်း၊ ဗဟို၌လည်းကောင်း၊ အချင်းမျဉ်း၌လည်းကောင်း ခေါက်ချိုးညီသည်။

အေတိုင်းအတာပမာဏများ

မုဉ်းတံ၏အလျား၊ ပန်းသီး၏ အလေးချိန်၊ ပုလင်း အတွင်းရှိ နို့၏ ထုထည်၊ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခု၊ ကြာမြင့်သည့်အချိန် စသည့် အတိုင်းအတာ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အချိန်၏ အတိုင်း အတာ ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ခက် ခဲ သည်။ တိုင်း တာ ရာ တွင် အသုံး ပြုသည့် ယူနစ် အမျိုးမျိုး ရှိ သည်။ ၎င်း တို့ကို လေ့လာကြစို့။

တိုင်းတာသည့်နည်းလမ်းများ

လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်က ဂရိဘုရင်တစ်ပါးသည် သင်္ချာ ပညာရှင် အာခီမီးဒီးအား သူ၏သရဖူကိုမပျက်ပဲ ရွှေစစ် မစစ် စစ်ဆေး ရန် အမိန့်ပေးသည်။ ထိုအခါ အာခီမီးဒီးသည် အရည်မကျိပ် သရဖူ၏ ထုထည်အား တိုင်းတာနည်း တစ်ခုကိုရှာသည်။ သို့မှသာ သရဖူ၏ အလေးချိန်ကို ထုထည်တူ ရွှေအစစ်၏အလေး ချိန်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သရဖူ ရွှေစစ် မစစ် ပြောနိုင်မည်။ တနေ့တွင် အာခီမီးဒီး သည် ရေချိုးနေစဉ် 'ရေအပြည့်ရှိစဉ်ထဲသို့ တစ်တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါက လျှံကျ လာသည့် ရေ၏ထုထည်သည် ရေတွင်နစ်သည့် အပိုင်း၏ ထုထည်နှင့် တူကြောင်း' သိသွားသည်။ အာခီမီးဒီးသည် ပျော်လွန်းသဖြင့် အဝတ်မပါပဲ လမ်းပေါ်တွင် လျှောက်ပြေးပြီး 'ငါတွေ့ပြီ' ဟု အော်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းကိုသုံးကာ ဘုရင်၏ သရဖူ တွင် ဈေးသက်သာသည့် သတ္တုတစ်မျိုး ရောထားကြောင်း သိခဲ့သည်။



အရာဝတ္ထုတို့၏ အလျားများကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ နှိုင်းယှဉ်၍မရသော ဝတ္ထုတို့၏ အလျားကို တိုင်းရန် စံအလျားတစ်ခုကို ယူနှစ်တစ်ခုအဖြစ် ရွေးနိုင်သည်။ ‘အကွာအဝေး’ ဟူသည် အလျားတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ လမ်းကောက်အတိုင်း တိုင်းသော အမှတ်နှစ်ခု၏အကွာအဝေးသည် မျဉ်းပြောင်းထက်ရှည်သည်။ ‘အမြင့်’ နှင့် ‘အတိမ်အနက်’ တို့သည်လည်း အလျားတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ မြေပုံတွင် စကေးကို သိလျှင် နေရာ နှစ်ခုအကွာအဝေးကို သိနိုင်သည်။ စက်ဝိုင်း၏စက်ဝန်းအလျားသည် အချင်း၏ သုံးဆကျော်မျှ ဖြစ်သည်။




အမြင့်တို့ကို တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။

ခဲတံ တို့ကို ဘေးချင်း ယှဉ်၍ တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ် ကြည့်နိုင်သည်။

ခဲတံစွန်းတို့မညီလျှင် သို့မဟုတ် တည်တည်ယှဉ်မနေလျှင် အလျားကို တိုက်ရိုက်မနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပေ။

အလျား
ယူနှစ်
များ



လက်မနှင့် လက်ခလယ် အကြားအကွာ၁၅ဆင့်တိ မီတာခန့် (15 cm)



ခြေတစ်လှမ်း၏အကျယ်၆၀ ဆင့်တိမီတာခန့် (60 cm)

လက်မောင်းတို့ကို ဆန့် တန်းထားလျှင် ဝဲယာ လက်ထိပ်များများကြား အကွာ အဝေး ၉၀ ဆင့်တိမီတာခန့် (90 cm)



သစ်ပင်တစ်ပင်၏ လုံးပတ်

ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့၏ အလျားများကို တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်၍ မရစေကာမူ အလျားယူနှစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း ဖြင့် တိုင်းတာနှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။




စာရေးခုံတစ်ခု၏အကျယ်




ကျောင်းသို့အကွာအဝေး



တစ်မီတာ (1 m) သည် အလျားတိုင်းယူနစ်ဖြစ်ပြီး 'မရီဒီယန်'ခေါ် ကမ္ဘာလုံး၏ မွန်းတည့်မျဉ်း (ဝင်ရိုးစွန်းများကို ဖြတ်သွားသော 'မရီဒီယန်'ခေါ် ကမ္ဘာ တစ်ပတ်စက်ဝိုင်းကြီး) တစ်ပတ်အလျား၏ သန်း၄၀ပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။ စံပြထား သော မီတာသည် (1 m) အတိအကျ ရှည်သည်။ ၁၉၆၀ က စ၍ ခရစ်ပတွန် အလင်း၏ လှိုင်းအလျားကို အလျားတိုင်းစံယူနစ်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။



စံပြထားသော မီတာသည် ပလက်တီနီယမ်နှင့် အီရီဒီယမ် သတ္တုများ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသည့် သတ္တုချောင်းတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။



ခရစ်ပတွန် ဓာတ်ငွေ့သုံး လျှပ်စစ်ထုတ်လွှတ်ပြန် တစ်ခုမှ အလင်းရောင် ထုတ်လွှတ်နေပုံကို ပုံတွင် မြင်တွေ့ရမည်။ ဤပြန်ချောင်းသည် ကြော့ဒြာ များတွင်အသုံးပြုသည့် နီယွန်မီးချောင်းများနှင့် အလားတူသည်။


အလျားတိုင်းစံယူနစ်များ

ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့၏ အလျားများကို တခါတရံ တိုက်ရိုက် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ တိုက်ရိုက်မှီခိုင်းယှဉ်နိုင်လျှင် အလျား ယူနစ်တစ်ခုကိုရွေးပြီးဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏အလျားများ ကို တိုင်းတာ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ လူ့ခြေဖဝါး၏ပျမ်းမျှ အလျားကို အလျားတိုင်းယူနစ်အဖြစ် ရွေးက အသုံးပြုခဲ့ ကြသည်။ ယခုမူ မက်ထရစ်စနစ် ယူနစ်များကို နှိုင်း ခိုင်း အများအပြားတွင် သုံးကြသည်။ တစ်မီတာ (1 m)သည်

နိုင်ငံတကာသုံး အလျားယူနစ် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ၏ မွန်းတည့်မျဉ်း တစ်ပတ်အလျား၏ သန်း ၄၀ ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်သည်။
 တစ်ကီလိုမီတာ (1 km) = ၁၀၀၀ မီတာ (1000 m)
 တစ်ဆင်တီမီတာ (1cm) = ၁/၁၀၀ မီတာ (1/100 m)
 တစ်မီလီမီတာ (1mm) = ၁/၁၀၀၀ မီတာ (1/1000m)

တို့သည်လည်း အလျားတိုင်းယူနစ်များ ဖြစ်သည်။ ခဲတံအရွယ်အရာဝတ္ထုအချို့၏ အလျားကို တိုင်းလိုသော် ဆင်တီမီတာကို သုံးသည်။ ပိုက်ဆံ၏ အချင်းကိုသို့သော် ငယ်သောအလျားများကို တိုင်းလိုသော် မီလီမီတာကို သုံးသည်။ မြို့နယ်မြို့ကြားအကွာအဝေးအလျားရှည်များ တိုင်းတာရာတွင်ကီလိုမီတာကို သုံးသည်။ လက်ရှိအလျား ယူနစ်သည်ခရစ်ပတွန်အလင်း၏လှိုင်းအလျားဖြစ်သည်။


အလျားတိုင်းကိရိယာများ



သေးငယ်သည့် ဝတ္ထုတို့၏ အလျားများကို အတိအကျ တိုင်းရန် လျှော့ခွများနှင့်ဝက်အူ ခွများကို အသုံးပြုသည်။

မြေပုံပေါ်ရှိ အကွာအဝေးနှင့် မျဉ်းကွေး တလျှောက် အကွာအဝေးတို့ကို တိုင်းရန် မျဉ်းကွေးတိုင်းကိရိယာကို အသုံးပြုသည်။


အမြင့်နှင့်အနက်



သစ်ပင်တစ်ပင် သို့မဟုတ် အိမ်တစ်ဆောင်၏အမြင့်သည် မြေပြင်မှ ထိပ်ဖျားအထိ အကွာအဝေးပင် ဖြစ်သည်။



တောင်၏အမြင့်သည် ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်မှ တောင်ထိပ်အထိအကွာအဝေး ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ၏ အနက်သည် ရေမျက်နှာပြင်မှ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်အထိ အကွာအဝေး ဖြစ်သည်။




တြိဂံတစ်ခု၏အမြင့်သည် အခြေမှမျက်နှာချင်း ဆိုင် အစွန်းမှတ်အထိ အကွာအဝေး ဖြစ်သည်။

အကွာအဝေး



နေရာနှစ်ခုကြားအကွာအဝေးသည် အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုး ဆောင်နိုင်သည်။ တစ်မျိုးမှာ ထိုနေရာနှစ်ခုကိုဆက် ထားသည့် မျဉ်းကွေး လမ်းတလျှောက် အကွာ အဝေးဖြစ်ပြီး ကျန်တစ်မျိုးမှာထိုနေရာနှစ်ခုကိုဆက် ထားသည့် မျဉ်းဖြောင့်တလျှောက် အကွာ အဝေး ဖြစ်သည်။ မျဉ်းဖြောင့် တလျှောက် အကွာအဝေး သည် မျဉ်းကွေးတလျှောက် အကွာအဝေးထက်ပို၍ တိုသည်။ လက်ယာဘက်ပုံတွင် တောင်ကြောတစ်ခု ပေါ်၌ ဖောက်လုပ်ထားသော မြေလိမ်မြေကောက် လမ်းကို တွေ့နိုင်သည်။




ဒြပ်ပေါ်ရှိလမ်းအကွာအဝေးကိုတိုင်းခြင်း



မြေပုံစကေးသည် သေးကပြစ်ပါစေ။ ကြိုးအတစ်စကိုမြေပုံပေါ်ရှိလမ်းတလျှောက်ချပါ။

၏အလျားကိုတိုင်းပြီး 'က' မြောက်ပါ။ မြောက်လမ်းသည်လမ်း၏အရှည်ဖြစ်သည်။







အထက်ပါမြေပုံ၏စကေးသည် ၁:၂၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အနီရောင်ခြယ်ထားသည့်လမ်းတလျှောက်အကွာအဝေးသည် မည်မျှနည်း။ ထိုအကွာအဝေးသည် အပြာရောင်လမ်းတလျှောက် အကွာအဝေးထက် ပို၍တိုသလော သို့မဟုတ် ရှည်သလော။ ဒီဇိုင်းမြို့သည်တောင်နယူးဇီလန်ကျွန်းမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။

ကိန်း π

$\pi = 3.14159265358979323846 \dots$



စားပွဲတလျှောက်လှိမ့်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုးတစ်ခုကို သုံးခြင်းဖြင့် ပန်းကန်ပြား၏ အဝန်းကိုတိုင်းပါ။ ထိုအလျားကိုအချင်းဖြင့် စားပါ။ π ၏ တန်ဖိုးကိုရမည်။



ကိန်း π ('ပိုင်' ဟု ဖတ်သည်။ ဂရိအက္ခရာ၏ တစ်ဆယ့်ခြောက်လုံးမြောက် ဖြစ်သည်။) စက်ဝိုင်း၏ စက်ဝန်းနှင့်အချင်းတို့၏ အချိုးဖြစ်သည်။ ထိုကိန်းသည် $\frac{1}{4}$ ခန့် သို့မဟုတ် ၃.၁၄ နီးပါး တန်ဖိုးရှိသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် π တန်ဖိုးတွင် ဒသမကိန်းနေရာ အရေအတွက် အကန့်အသတ် မရှိချေ။ မကြာမီက ကွန်ပျူတာစက်များအားဖြင့် π ၏ တန်ဖိုးကို ဒသမ ၁၀၀,၀၀၀ နေရာအထိ တွက်ခဲ့သည်။ ဥသည့်ဗဟုဂ်တစ်ခု၏ ပတ်လည်အနားနှင့်၎င်းပုံ၏အချင်းတို့အချိုးသည် ဗဟုဂ်၏အနားအရေအတွက်တိုးလာသည်နှင့်အမျှ π တန်ဖိုးနှင့် နီးကပ်လာသည်။

အမြင့် သို့မဟုတ် အနက်ကိုတိုင်းရန် အလျားယူနစ်များကိုအသုံးပြုသည်။ သစ်ပင်၏ အမြင့်သည်မြေပြင်မှ ထိပ်ဖျားအထိ အကွာအဝေး ဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာ၏ အနက်သည်ရေမျက်နှာပြင်မှ အောက်ကြမ်းပြင်အထိ အကွာအဝေး ဖြစ်သည်။ လမ်းတလျှောက် အကွာအဝေးသည်နေရာနှစ်နေရာကို ဆက်သော မျဉ်းဖြောင့် အကွာအဝေး ထက်

ပိုရှည်သည်။ ဥပမာ-စကေးသည် ၁:၂၀,၀၀၀ ဖြစ်ပြီး နေရာ နှစ်နေရာသည် မြေပုံပေါ်တွင် ၁ဆင်တိ ကွာခြားလျှင် အမှန် ထိုနေရာတို့သည် (၁ဆင်တိ $\times$ ၂၀,၀၀၀) = ၂၀၀ မီတာ ဝေးကွာကြောင်း သိနိုင်သည်။ စက်ဝိုင်းတစ်ခု၏ အဝန်းနှင့်အချင်းတို့အချိုးသည် π ဖြစ်သည်။ π ၏ ပျမ်းမျှတန်ဖိုးအဖြစ် ၃.၁၄ကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။

ယူနစ်ဇယား

1 km = 1 000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

$\pi = 3.14$


ဧရိယာ

တခါတရံ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧရိယာနှစ်ခုကို တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်သည်။ ဧရိယာဆိုင်ရာ ယူနစ်တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် မျက်နှာပြင် အကျယ် အဝန်း၏ ဧရိယာတို့ကို တိုင်းတာရှာဖွေနိုင်သည်။ ဂရပ်စကူကို သုံးခြင်း ဖြင့်လည်း ပြင်ညီပုံများ၏ ခန့်မှန်းခြေဧရိယာတို့ကို ရှာနိုင်သည်။ ပုံအချို့၏ ဧရိယာကို ရှာရန် ပုံသေနည်းများလည်း ရှိသည်။

ဧရိယာများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း



တစ်ခုအပေါ် တစ်ခုထပ်ခြင်းဖြင့် တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း




ကတ်ပြားများ အသုံးပြု၍ သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာနည်း။ ပုံအမျိုးမျိုးကို ဖုံးအုပ်ရန် လိုအပ်မည့် ကတ်ပြားအရေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ထိုပုံတို့၏ ဧရိယာများကို သွယ်ဝိုက်၍ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။



မြေတိုင်းပညာကို မြေကွက်ဧရိယာများ ရှာရာတွင် အသုံးပြုသည်။

ဧရိယာယူနစ်




တစ်စတုရန်း ဆင်တိမီတာ (1 cm²) သည် အနားတစ်ဘက် လျှင် ၁ ဆင်တိမီတာ စတုရန်းတစ်ခု၏ ဧရိယာ ဖြစ်သည်။



တစ်စတုရန်းမီတာ (1 m²) သည် အနားတစ်ဘက်လျှင် 1 m ရှိ စတုရန်းတစ်ခု၏ ဧရိယာဖြစ်သည်။ ဧရိယာကြီးများ တိုင်းတာရာတွင် ၎င်းယူနစ်ကို အသုံးပြုသည်။

ပြင်ညီပုံတစ်ခု၏ ဧရိယာသည် ထိုပုံ၏ အနားများဖြင့် ကာရံထားသည့် နေရာ အကျယ်အဝန်းဖြစ်သည်။ ထိုပုံတစ်ခုအတွက်ဆိုလျှင် အပေါ်ယံ မျက်နှာပြင် အားလုံး၏ ဧရိယာ စုစုပေါင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဧရိယာတိုင်းရန် လွယ်ကူသော နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိသည်။ တစ်နည်းမှာ ဧရိယာ တစ်ခုအပေါ်တစ်ခု ထပ်ကြည့်၍ တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်သည့်နည်း ဖြစ်သည်။ ကျန် တစ်နည်းမှာ သွယ်ဝိုက်တိုင်းတာနည်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကတ်ပြားများကို ဧရိယာယူနစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ သို့သော် အဆိုပါနည်းတို့ကိုသုံး၍ တိုင်းတာ မရနိုင်သည့် ဝတ္ထုပစ္စည်းများရှိသည်။ ထိုအခါ အနားတစ်ဘက် 1 cm ရှိစတုရန်း တစ်ခုကို ဧရိယာယူနစ်အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါစတုရန်း၏ ဧရိယာမှာ 1 cm² ဖြစ်သည်။ ပို၍ကြီးသည့် ဧရိယာယူနစ်မှာ 1 m² ဖြစ်ပြီး အနားတစ် ဘက်လျှင် 1 m ရှိစတုရန်းတစ်ခု၏ ဧရိယာပင်ဖြစ်သည်။ ဧရိယာယူနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဧရိယာကို ကိန်းတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သည်။

ပုံသဏ္ဌာန်မမှန်သောပုံတို့၏ ဧရိယာများ




အနား 1 cm သို့မဟုတ် 1 mm ရှိ စတုရန်းကွက် စက္ကူ (ဂရပ်) ကိုသုံး၍ ပုံမှန်ဝတ္ထုတို့၏ ဧရိယာကိုရှာနိုင်သည်။


ယူနစ်ဇယား

1 km² = 100 ha = 10 000 a = 1 000 000 m²
 1 ha (one hectare) = 100 a = 10 000 m²
 1 a (one are) = 100 m²
 1 m² = 10 000 cm²


ရေယာရှာသည့် ပုံသေနည်းများ





$$S = \frac{1}{2} \times a \times h$$



$$S = \text{အခြေ} \times \text{အမြင့်} = a \times h$$



$$S = \frac{1}{2} \times a \times b$$



$$S = r \times (\pi \times r) = \pi r^2$$

အောက်ပါ တို့တွင် S သည် ရေယာကို ကိုယ်စားပြုသည်။

တြိဂံ

တြိဂံတစ်ခုသည် ပုံတွင် ပြထားသကဲ့သို့ ထောင့်မှန်စတုရန်း၏ ထက်ဝက်ဖြစ်သည်။

$$S = \frac{\text{အခြေ} \times \text{အမြင့်}}{2}$$

ရွှမ်းပတ်



ရွှမ်းပတ်တစ်ခုသည် ပုံတွင် ပြထားသော ထောင့်မှန်စတုရန်း၏ ရေယာတဝက်ဖြစ်သည်။

$$S = \frac{(\text{ပထောင့်ဖြတ်}) \times (\text{ဒုထောင့်ဖြတ်})}{2}$$

စက်ဝိုင်း


စက်ဝိုင်းတစ်ခုကို တူညီသော အစိတ်အပိုင်းငယ်များအဖြစ် စိတ်ပိုင်းပြီး ထိုအပိုင်းငယ် တို့ကို ပြန်စီခြင်းဖြင့် အနားပြိုင်စတုရန်းနှင့် တူသောပုံတစ်ခု ရမည်။ ထိုအနားပြိုင်စတုရန်း၏ အခြေသည် စက်ဝန်း၏ တဝက်ဖြစ်သည်။ ထိုပုံ၏ အမြင့်သည် စက်ဝိုင်း၏ အချင်းဝက် r နှင့် အနီးဆုံး တူသည်။ စက်ဝန်း၏ တဝက်သည် πr ဖြစ်သဖြင့် ထို အနားပြိုင်စတုရန်း၏ ရေယာသည် πr^2 ခန့် ဖြစ်သည်။

ထုပုံတို့၏ မျက်နှာပြင်ရေယာ ထောင့်မှန်ထု (ကျူဗိုက်)




$$S = 2 \times (a \times b + b \times c + c \times a)$$

အန်စာတုံး





$$S = 6 \times a^2$$





လုံးရှည် (ဆလင်ဒါ)

ထိပ်စက်ဝိုင်းသည် အချင်းဝက် r ရှိသည်။



$$S = 2 \times (\pi r^2 + \pi r \times h)$$

ပိုက်သာဂိုရသီအိုရမ်



ပိုက်သာဂိုရသီအိုရမ်အရ ထောင့်မှန် တြိဂံတစ်ခုတွင် (အရှည်ဆုံး အနား) ထောင့်မှန် ခံ အနားပေါ်ရှိ စတုရန်းသည် ကျန်အနားနှစ်ဘက်ပေါ်ရှိ စတုရန်းများပေါင်းလဒ်နှင့် တူညီသည်။
 $a^2 + b^2 = c^2$ ဖြစ်သည်။
 ပုံ ၁ တွင် ထောင့်မှန် တြိဂံတစ်ခု၏ အနားများ ပေါ်၌ ဆွဲထားသည့် စတုရန်းတို့ကို ဖော်ပြသည်။ ပုံ ၂ တွင် အရောင်တူတို့ကို ယှဉ်တွဲခြင်းဖြင့် ထောင့်မှန်ခံ အနားပေါ်ရှိ စတုရန်း၏ ရေယာသည် ကျန်စတုရန်းတို့၏ ရေယာများပေါင်းလဒ်နှင့် တူကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။


ထုထည်

အရည်တစ်ခု၏ ထုထည်တိုင်းရန် ဒေါင်လိုက်စကေးတိုင်းပါရှိသည့် ဆလင်ဒါပုံခွက်တစ်ခုကို ရံဖန်ရံခါ အသုံးပြုကြသည်။ ထုထည် အတိအကျဖော်ပြလိုလျှင် ကိန်းတစ်ခုနှင့် ထုထည်ယူနစ်တစ်ခု တွဲ၍ ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ရေဖြည့်ထားသည့် ခွက်တစ်ခုအတွင်းသို့ ဝတ္ထုတစ်ခုနှစ်လိုက်လျှင် ဝတ္ထုက ဖယ်ထုတ်လိုက်သော (လျှံကျလာသည့်) ရေ၏ ထုထည်သည် ထိုဝတ္ထု၏ ထုထည်နှင့် တူညီသည်။ ဤနိယာမကို အသုံးပြု၍ လိမ္မော်သီး၊ ကျောက်ခဲကဲ့သို့သော ပုံသဏ္ဌာန် မမှန်သည့် ဝတ္ထုတို့၏ ထုထည်ကို ရှာနိုင်သည်။ ထုပုံပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ ထုထည်ကိုရှာသော ပုံသေနည်းများ ရှိသည်။



ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေခြင်းကြောင့် သာမန်ကြည့်ရုံဖြင့် မည်သည့်ဗူး၊ မည်သည့်ပုလင်းသည် ပို၍ဆုံသည်ဟု ပြောရန်မလွယ်ကူ။ ထိုပုလင်းများ ဗူးများမှ အရည်တို့၏ထုထည်တို့ကို ပုံသဏ္ဌာန်တူသည့် တိုင်းတာခွက်များအတွင်း (ပုံအတိုင်း) လောင်းထည့်ပြီး နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။


ထုထည်ယူနစ်များ




ယူနစ်ဇယား

$1 \text{ l} = 10 \text{ dl}$
 $1 \text{ dl} = 100 \text{ cm}^3$
 $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ cc}$
 $\text{l} = \text{litre}$
 $\text{dl} = \text{decilitre}$
 $\text{cc} = \text{cubic centimetre} = \text{cm}^3$


ထုထည်တိုင်းခြင်း





တူညီသော ရွှံ့စေးပမာဏကိုယူ၍ ပြုလုပ်ထားသည့် ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးသည် ထုထည် တူကြသည်။


ထုပုံတို့၏ ထုထည်ရှာသည့်ပုံသေနည်းများ
ထောင့်မှန်ထုပုံ (ကျူဗိုက်)



$$V = \text{အလျား} \times \text{အနံ} \times \text{အမြင့်}$$


V သည် ထုထည်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။

ကုဗတုံး



$$V = \text{အနား} \times \text{အနား} \times \text{အနား} \\ (\text{ကုဗပုံ၏အနားတစ်ဘက်အလျား})$$

ပရစ်မစ်




အမြင့်

ဆလင်ဒါ



အမြင့်

စက်လုံး



$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

(r = စက်လုံး၏ ချင်းဝက်)
 $r^3 = r \times r \times r$

$$V = \text{အခြေ၏ဧရိယာ} \times \text{အမြင့်}$$

ခြင်တွယ်ပစ္စည်းများ




တစ်လီတာခွက်

ခြင်တွယ်ခွက်

ပိပက်


ထုထည်တိုင်းပန်ဗူး

အတိုင်းအတာဖတ်နည်း




ခြင်တွယ်ဆလင်ဒါ

တြိဂံပုံပိရမစ်



အမြင့်

လုံးချွန်



အမြင့်

$$V = \frac{1}{3} \times \text{အခြေ၏ဧရိယာ} \times \text{အမြင့်}$$

အရည်တစ်မျိုး သို့မဟုတ် ထုပုံတစ်ခု၏ ထုထည်သည် ၎င်းဝတ္ထု၏ အရွယ်ပမာဏကို ဖော်ပြသည်။ ပုံနှစ်ခု၏ အလျား သို့မဟုတ် ဧရိယာကို တခါတရံ တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်နိုင် သော်လည်း ထုပုံတို့၏ထုထည်ကိုမူ တိုက်ရိုက်နှိုင်းယှဉ်၍ မရပေ။ အရွယ်မတူ ပုလင်း နှစ်လုံးရှိ အရည်များ၏ ထုထည်ကို နှိုင်းယှဉ်လိုလျှင် ပုံတူခွက်များအတွင်း လောင်း ထည့်ရမည်။ ထုထည်ယူနစ်များကို ထုထည်များတိုင်းရာတွင် အသုံးပြုသည်။ တစ်ကုဗဆင်တီမီတာ (1cc) သည် အနားတစ်ဘက် 1 cm ရှည်သည့် ကုဗတုံး၏ ထုထည်ဖြစ်ပြီး အရည်ပမာဏအနည်းငယ်ကို တိုင်းရာတွင် အသုံးပြု သည်။ 1cm³ ဟု ရေးသည်။ ယူနစ် တစ်ကုဗမီတာ (1m³) သည် အနားတစ်ဘက် 1 m ရှည်သည့် ကုဗတုံး၏ ထုထည်ဖြစ်ပြီး ကြီးသော ပမာဏများ တိုင်းရာတွင် သုံးသည်။ တစ် ဂရမ်ဆီလီတာ (1l) နှင့် တစ်လီတာ (1l) တို့ကိုလည်း အရည်ထုထည်တို့ကိုတိုင်းရန် သုံးသည်။ 1l = 100 cc နှင့် 1l = 10 dl = 1000 cc ဖြစ်သည်။ ခွက်တစ်ခု ဝင်ဆုံသည့် ထုထည်ကိုခွက်၏ ‘ဝင်ဆုံမှုပမာဏ’ ဟု ခေါ်သည်။ ရေဖြည့်ထားသည့် ဇလုံတစ်ခုအတွင်း ကျောက်ခဲတစ်လုံးကိုထည့်လိုက်လျှင် လျှံ ကျလာသော ရေပမာဏ သည် ကျောက်ခဲ၏ထုထည်နှင့် တူညီသည်။



အလေးချိန်

ဝတ္ထုတစ်ခု၏ အလေးချိန်ကို တိုက်ရိုက်မမြင်နိုင်။ အလေးချိန်တိုင်းရန် ချိန်ခွင်ကဲ့သို့သော ကိရိယာများလိုသည်။ အလေးချိန်ယူနစ်များမှာ တစ်ဂရမ်(1g) နှင့် တစ်ကီလိုဂရမ်(1kg)ဖြစ်သည်။ ကီလိုဂရမ်သည် တိုင်းပြည်အများ၏ စံအလေးချိန်ဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းတို့ကို အထုပ်၊ သံဗူး၊ ကရား တို့တွင်ထည့်၍ ရောင်းလျှင် ပါသည့်ပစ္စည်းအလေးချိန်ကို 'အသားတင်အလေးချိန်' ဟု ခေါ်ပြီး ခွက်၏အလေးချိန်ကို 'အပိုဆောင်းအလေးချိန်'ဟု ခေါ်သည်။ နှစ်ခုပေါင်းလျှင် ထည့်ဝင်ခွက်နှင့် ပစ္စည်းတို့၏ စုစုပေါင်းအလေးကို ရသည်။

အလေးချိန်များကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း

ဦးနှင်းပဲ့ထောင် ကစားစရာ (ဆီးဆော) တစ်ဘက်စီ သည် အလေးချိန် တူနေလျှင် ဟန်ချက်ညီနေမည်။ ဤနိယာမကို ချိန်ခွင်ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။

နှစ်ဘက်အလေးချိန်ညီနေသဖြင့် ပျဉ်ပြား တန်းသည် ဟန်ချက်ညီနေသည်။



လက်ဝဲဘက် ကလေးသုံးဦးသည် လက်ယာဘက်ကလေးထက် ပို၍ လေးသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဝဲဘက်စွန်းသည် အောက်သို့နိမ့်ကျနေသည်။

လက်ယာဘက်သည် လက်ဝဲ ဘက်ထက် ပို၍ လေးသည်။



ခံ ကီလိုဂရမ်သည် ပလက်တိန်နှင့် အီရိုဒီယမ်သတ္တု ရောဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် သတ္တုတုံးတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ချိန်ခွင်များ


ချိန်ခွင်အမျိုးမျိုးရှိပြီး တစ်ခုစီကို တစ် မျိုးစီသုံးရန် ရည်ရွယ်ပြုလုပ်ထားသည်။




စပရင်ချိန်ခွင်




စင်းချိန်ခွင်




ကျောင်းသုံးစာတုချိန်ခွင်



ဒိုင်ခွက်ချိန်ခွင်



ဈေးဆိုင်ချိန်ခွင်



ကတ္တား

အလေးချိန်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်ဦးနှင်းပဲ့ထောင် (ဆီးဆော) နိယာမမျိုးကိုသုံးသည်။ အလေးချိန် တိုင်းသည် ကိရိယာတစ်မျိုးကို ချိန်ခွင် သို့မဟုတ် စကေးဟု ခေါ်သည်။ အပူချိန် ၄ ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်တွင် ရေသန့်သန့် တစ် ကုဗဆင်တီမီတာ (1 cc) ၏ အလေးချိန်ဖြစ်သည့် 1 g ကို အလေးချိန်ယူနစ်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ ဤ အပူချိန်ရှိရေသန့်တစ်လီတာသည် 1kg လေးသည်။ စံ kg သည် 1 kg အတိအကျ လေးသည်။

အထက်ပါချိန်ခွင်တို့အပြင် ပေါ့ပါးသည့် ဝတ္ထု၏ အလေးချိန်တို့ကိုအတိအကျရှာနိုင်သည့်အနုစိတ် စာတုချိန်ခွင်များလည်း ရှိသေးသည်။

ခွေးတစ်ကောင်၏အလေးချိန်

‘ဂျန်’၏ အလေးချိန်
နှင့် ခွေး၏အလေးချိန်
နှစ်ခုပေါင်း 35 kg
သည် ဒိုင်ခွက်တွင် ပြ
နေသည်။



‘ဂျန်’တစ်ဦးတည်းသည်
30kgလေးသည်။



‘ဂျန်’သည် ခွေး၏အလေးချိန်ကို ရှာလိုသည်။ သို့သော်
ခွေးသည် အလေးချိန် ကိရိယာပေါ်တွင် မနေသဖြင့်
သင့်လျော်သည့်နည်းကို သုံးရသည်။ ဦးစွာ ‘ဂျန်’သည်
ခွေးကိုပိုက်၍ အလေးချိန်သည်။

ခွေး၏ အလေးချိန်သည်
 $35 \text{ kg} - 30 \text{ kg} = 5 \text{ kg}$




အပိုဆောင်းအလေးချိန်နှင့် အသားတင်အလေးချိန်
ခွက်၏အလေးချိန် + ထည့်သည့် ပစ္စည်း၏အလေးချိန်



အပိုဆောင်းအလေးချိန် + အသားတင်အလေးချိန်

ခွက်အလေးချိန်



အပိုဆောင်းအလေးချိန်

ကော်ဖီကုန်း သို့မဟုတ် သစ်သီးပူး တစ်ခုတွင် ထည့်ထား
သည့် ပစ္စည်းတို့၏ အသားတင် အလေးချိန်ကိုရှာနိုင်သည်။

ထည့်ဝင်ပစ္စည်း၏အလေးချိန်




အသားတင်အလေးချိန်

အလေးချိန်ပညာမျှနည်း

ငါးတစ်ကောင်ရှိသည့်ငါးကန်၏အလေးချိန်သည်
ငါးနှင့်ကန်၏အလေးချိန် ပေါင်းလဒ် ဖြစ်သည်။



500 g



100 g



600 g

စုစုပေါင်း အလေးချိန်သည် ထည့်မည့် ပစ္စည်းနှင့် ထည့်
သည့်ခွက်တို့၏အလေးချိန်ဖြစ်သည်။ အသားတင် အလေး
ချိန်သည် ထည့်ထားသည့် ပစ္စည်း၏ အလေးချိန်သာ ဖြစ်
သည်။ အပိုဆောင်းအလေးချိန်သည် ခွက်၏ အလေးချိန်
သာဖြစ်သည်။

အလေးချိန်နှင့် အရွယ် အစား ဆက်သွယ်ချက်နှင့် ပတ်
သက်၍ ရှုပ်ထွေးတတ်သည်။ သိုးမွေးချည်နှင့် ငှက်မွေးကို
သို့သော် ဝတ္ထုအချို့သည် ပမာဏကြီးသော်လည်း ပေါ့နေ
တတ်သည်။ သို့သော် ခဲတုံးသည် သေးငယ်သော်လည်း
လေးသည့် ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။ အလေးချိန်နှင့် အရွယ်
(ပမာဏထုထည်)တို့၏ ဆက်သွယ်ချက်ကို သိပ်သည်းခြင်း
ဟု ခေါ်သည်။ မက်ထရစ်ယူနစ်တွင် သိပ်သည်းခြင်းသည်
ဝတ္ထု 1 cm³ ၏ အလေးချိန် ဖြစ်သည်။ သိပ်သည်းခြင်း
ကြီးလျှင် ဝတ္ထုပစ္စည်းသည် သေးငယ်သော်လည်း လေး
သည်။ သိပ်သည်းခြင်းငယ်လျှင် ဝတ္ထုသည် အရေအတွက်
ပမာဏ ကြီးကောမူပေါ့သည်။

သိပ်သည်းဆသည် 1 cm³ ထုထည်ရှိ ဝတ္ထု၏ အလေးချိန်
နှင့် 1 cm³ ထုထည်ရှိရေ၏အလေးချိန်တို့ အချိုးဖြစ်သည်။
ရေ 1 cm³ သည် 1 gm လေးသဖြင့် (ဆိုလိုသည်မှာ
ရေတွင် သိပ်သည်းခြင်း 1 ရှိသဖြင့်) သိပ်သည်းဆနှင့်
သိပ်သည်းခြင်းသည် ကိန်းတန်ဖိုးတူနေသည်။

ထုထည်များနှင့် အလေးချိန်များ



သိုးမွေးချည်



သံ

ဝတ္ထုတစ်ခု၏ သိပ်သည်းခြင်းသည် အလေး
ချိန်နှင့် ထုထည်အချိုး ဖြစ်သည်။
သိပ်သည်းခြင်း = အလေးချိန် ÷ ထုထည်
သိပ်သည်းဆသည် ဝတ္ထုနှင့်ရေ၏သိပ်သည်း
ခြင်းတို့အချိုးဖြစ်သည်။

Gold	19.3
Lead	11.34
Iron	7.8
Ice	0.917
Cypress wood	0.49
Cedar wood	0.40

အလေးချိန်ယူနစ်များ

တစ်တန် (1t) = 1000 kg
1 kg = 1000 gm
(တန် = မက်ထရစ်တန်)


အချိန်

အချိန်ဟူသည် ကာလအပိုင်းအခြားနှစ်ခု၏ကြားတွင်ရှိသော ကာလကိုခေါ်သည်။ ဥပမာ တစ်တရုတ်ပြုလုပ်ရန်ကြာချိန်။ အချိန်သည် နာရီက ညွှန်ပြသည့်အချိန်ကဲ့သို့ အချိန် အတိအကျကိုလည်း ဆိုလိုသေးသည်။ နာရီများကို အချိန်တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည်။ အချိန်ယူနစ်များမှာ စက္ကန့်၊ မိနစ်နှင့် နာရီတို့ ဖြစ်သည်။ နာရီက ညွှန်ပြသည့် အချိန်မှာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နေရာဒေသအလိုက် ကွဲပြားသည်။

အချိန်တာသည် ကျွန်ုပ်တို့ မမြင်နိုင်သည့် အတိုင်း အတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အချိန်၏အစနေရာ အဆုံးနေရာကို မသိနိုင်။ သင်သည် ၇ နာရီတွင် အိမ်မှ ထွက်ခဲ့ပြီး ဘူတာရုံသို့ ၈ နာရီတွင် ရောက်သည်ဆိုပါစို့။ သင်သည် ထိုခရီးကို ၁ နာရီကြာ သွားခဲ့ရသည်။ ဤဥပမာတွင် နာရီက ညွှန်ပြသည့် အချိန်နှင့် တစ်တရုတ်ပြုလုပ်ရန် ကြာချိန်တို့၏ခြားနားချက်ကို တွေ့နိုင်သည်။ ၁ ရက်တွင် ၂၄ နာရီ၊ ၁ နာရီတွင် မိနစ် ၆၀၊ ၁ မိနစ်တွင် စက္ကန့် ၆၀ ရှိသည်။ နာရီ၊ မိနစ်၊ စက္ကန့်တို့သည် အချိန်၏ ယူနစ်များ ဖြစ်ကြသည်။

အချိန်တိုင်းခြင်း

ကလေးတို့သည် မည်မျှ ကြာကြာ ရေငုပ်နိုင်သည်ကို သိရန် ချိန်ရပ် နာရီကို အသုံးပြုသည်။



နွေကျောင်းပိတ်ရက် တရက်တာ



အိပ်ခြင်း




ကိုယ်လက်သန့်စင်ခြင်း



နံနက်စာစားခြင်း



ကစားခြင်း



၁၅ မိနစ်



၁၅ မိနစ်




၁ နာရီ

အချိန်အချင်းချင်းပေါင်းခြင်း

‘ဒေးဗစ်’သည် ၂ နာရီတွင် အိမ်မှ ဆံသဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့သည်။ သွားချိန် ၁၅ မိနစ်၊ ဆံပင်ညှပ်ချိန် ၁ နာရီ၊ အိမ်သို့အပြန် ၁၅ မိနစ် ကြာလျှင် မည်သည့် အချိန်တွင် အိမ်ပြန်ရောက်မည်နည်း။ စုစုပေါင်း ကြာချိန်ကို ၂ နာရီတွင် ပေါင်းလျှင် အဖြေရမည်။
 $၁၅ \text{ မိနစ်} + ၁ \text{ နာရီ} + ၁၅ \text{ မိနစ်} = ၁ \text{ နာရီ } ၃၀ \text{ မိနစ်}$
 ၎င်းကို ၂ နာရီတွင် ထည့်ပေါင်းသော် ၃:၃၀ နာရီတွင် ‘ဒေးဗစ်’ အိမ်ပြန်ရောက်သည်။


နာရီ၊ မိနစ်နှင့်စက္ကန့်



လက်တံတိုသည် နာရီကိုပြပြီး ၁၂ နာရီပြည့်တိုင်း တစ်ပတ်ပတ်ပြီးဖြစ်သည်။ လက်တံရှည်သည် မိနစ်ကို ညွှန်ပြပြီး တစ်ပတ်ပြည့်ရန် မိနစ် ၆၀ (၁ နာရီ) ကြာသည်။ ဒိုင်ခွက်ပေါ်ရှိ ကိန်းတစ်ခုစီသည် နာရီ ကိုပြသည်။ လက်တံရှည်သည် ကိန်းတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ရွှေ့ရန် ၅ မိနစ်ကြာသည်။

ယူနစ်ဇယား

- ၁ ရက် = ၂၄ နာရီ
- ၁ နာရီ = ၆၀ မိနစ်
- ၁ မိနစ် = ၆၀ စက္ကန့်



အချိန်အချင်းချင်းနုတ်ခြင်း

‘တို့နီ’ အိမ်မှထွက်ခဲ့ပြီး မြို့တော်ခန်းမသို့ အလာ ဘတ်စ် ကားစီး မိနစ် ၂၀၊ လမ်းလျှောက် ၁၅ မိနစ်၊ ပူး၁၅ နာရီ ရောက်သည်။ ထွက်ချိန် သိရန် ရောက်ချိန်တွင် လာခဲ့သည့် ကြာချိန်ကို နုတ်ရမည်။


ရောက်ချိန် = ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ်

ကြာချိန် = (၂၀ + ၁၅) မိနစ် = ၃၅ မိနစ်

ထွက်ချိန် = ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် - ၃၅ မိနစ်

= ၂ နာရီ ၄၀ မိနစ်

တိုကျိုမြို့ တနင်္ဂနွေနေ့ မွန်းတည့်ချိန်၌ ကမ္ဘာ့ဒေသများရှိ အချိန်များ



တစ်ရက်တွင် ၂၄ နာရီ၊ တနာရီတွင် မိနစ် ၆၀၊ မိနစ်တွင် စက္ကန့် ၆၀ ပိုင်းခြားထားသည်။ တစ်ရက်သည် ၁၂ နာရီ (၂၄၀၀ နာရီ) တွင် အစပြုပြီး နောက်နေ့ ၁၂ နာရီတွင် ကုန်ဆုံးသည်။ နေသည် ကောင်းကင်တွင် အမြင့်ဆုံးနေရာ ရောက်လျှင် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ (၁၂၀၀ နာရီ) ဖြစ်သည်။ မွန်းမတည့်မီ (နံနက်ပိုင်း) အချိန်သည် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီ မတိုင်မီ အချိန်တာ ၁၂ နာရီ ဖြစ်ပြီး မွန်းလွဲပိုင်းသည် မွန်းတည့်ပြီး အချိန်တာ ၁၂ နာရီကို ဆိုလိုသည်။ နံနက်ပိုင်းနှင့် မွန်းလွဲပိုင်း နှစ်ခုပေါင်းသည် ၂၄ နာရီရှိ တစ်ရက် ဖြစ်သည်။

စက္ကန့်၊ မိနစ်... နှင့် နှစ်များ



ရက်စွဲကို ပါပေးပြသည့် နာရီတစ်လုံး

TIME TABLE G. 5

	MONDAY	TUESDAY	WEDNESDAY	THURSDAY	FRIDAY
8:40	Art, Bangkok	Sun, Wang, Bangkok	Reading, John, London	Sun, Wang, Bangkok	Gen. Club, Wm. Lark
9:30	Art, Bangkok	Reading, John, London	Wm. Lark, London	Reading, John, London	Reading, John, London
10:30	R E C E S S				
10:30	Science, John, London	S P A N U S W Sr. Wm. Lark, Wm. Lark			Wm. Lark, London
11:30	L U N C H				
12:30	Geography, John, London	Navigation, Sr. Condon	Geography, John, London	Reading, John, London	Geography, John, London
1:00	English, John, London	Science, John, London	Religion, W. P. P. P.	Wm. Lark, London	Religion, W. P. P. P.
1:40	Wm. Lark, London	Wm. Lark, London	Wm. Lark, London	Wm. Lark, London	English, Reading, John, London
2:00	Theresa, John, London	Reading, John, London	English, Reading, John, London	Wm. Lark, London	Wm. Lark, London

EXPO'70 calendar

နာရီတစ်လုံးရှိ လက်တံများသည် စက္ကန့်၊ မိနစ်၊ နာရီ တစ်ခုစီကို ညွှန်ပြသည်။ ကျောင်း အချိန် ၄ ယာ တစ်ခုသည် သိတင်းတစ်ပတ် အတွက် သင်ခန်းစာ အချိန်တို့ကို စာရင်းပြုစုပေးထားသည်။ ပြက္ခဒိန်တစ်ခုသည် လအသီးသီးရှိ ရက်စွဲတို့ကို ပေးပြသည်။ တစ်နှစ်တွင် ၃၆၅ ရက်ရှိသည်။ သို့သော် လေးနှစ်ပြည့်တိုင်း ၃၆၆ ရက်ရှိသည့် ရက်ထပ်နှစ် တစ်နှစ် ဖြစ်လာသည်။ လတစ်လတွင် ရက် ၃၀ သို့မဟုတ် ၃၁ ရက်ရှိသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မူ ၂၈ ရက် (ရက်ထပ်နှစ်တွင် ၂၉ ရက်) ရှိသည်။ သိတင်းတစ်ပတ်တွင် တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ ကြာသပတေး၊ သောကြာ၊ စနေဟူ၍ ၇ ရက်ရှိသည်။

တစ်ရက်တွင် ၂၄ နာရီ တစ်နာရီတွင် မိနစ် ၆၀ တစ်မိနစ်တွင် စက္ကန့် ၆၀ ရှိသည်။


ကျောင်းအချိန်ဇယားတစ်ခု

ပြက္ခဒိန်တစ်ခု

ရွှေ့လျားမှုနှုန်း မြန်နှုန်း

ရွှေ့လျားနေသည့် ဝတ္ထုတစ်ခု၏မြန်နှုန်းသည် အချိန်တစ်ခုအတွင်း ဝတ္ထုရွှေ့လျားခဲ့သည့် အကွာအဝေးကို ဖော်ပြသည်။မြန်နှုန်း၏ယူနစ်အဖြစ်ကီလိုမီတာ/နာရီ (km/h) ကို သုံးသည်။ မြန်နှုန်းကြီးလျှင် (km/min) သို့မဟုတ် (km/sec) (ကီလိုမီတာ/မိနစ် သို့မဟုတ် ကီလိုမီတာ/စက္ကန့်) ယူနစ်များကို သုံးသည်။ပရာဗလာရွှေ့လျားခြင်း၊ အောက်သို့ ကျဆင်းခြင်း၊ တသမတ်ရွှေ့လျားခြင်းနှင့် လွှဲခြင်းစသည့် ရွှေ့လျားမှုအမျိုးမျိုး ရှိသည်။

ပို၍ပို၍မြန်သော



ရွှေ့လျားမှုအမျိုးမျိုး



လေထဲသို့ပစ်လိုက်သည့် အောက်လုံး၏ လမ်းကြောင်းသည် ပရာဗလာပုံ ရွှေ့လျားမှု ဖြစ်သည်။

မြန်နှုန်းသည် အတိုင်းအတာတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး အချိန်တစ်ယူနစ်အတွင်း ရွှေ့လျားသည့် ခရီးကို ဖော်ပြသည်။ လမ်းလျှောက်သူ၏ မြန်နှုန်းသည် တစ်မိနစ် ၆၅ မီတာခန့် (65m/min) ဖြစ်သည်။မြန်နှုန်း (50km/h) ဆိုသည်မှာ တစ်နာရီ၅၀ ကီလိုမီတာ သွားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းများကို နှိုင်းယှဉ်နည်း နှစ်မျိုးရှိသည်။ ခရီးတစ်ခုကိုသွားရန်ကြာချိန်တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် အချိန်တစ်ခုအတွင်း သွားခဲ့သည့် ခရီးများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။မြန်နှုန်းသေးလျှင် တစ်နာရီ ဘယ်မျှ၊ ကြီးလျှင် တစ်စက္ကန့်ဘယ်မျှသွားသည်ဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။ အသံလှိုင်း၏ မြန်နှုန်းမှာ 340m/sec ဖြစ်ပြီး အလင်း၏ မြန်နှုန်းမှာ 300,000 km/sec ဖြစ်သည်။

အောက်သို့ ကျဆင်းခြင်းသည် ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် ရွှေ့လျားမှု ဖြစ်သည်။

လွှဲခြင်းဟူသည် ချိန်သီးလွှဲခြင်းကဲ့သို့သော ရွှေ့လျားမှုမျိုး ဖြစ်သည်။



တသမတ် ရွှေ့လျားခြင်းသည် တသမတ်မြန်နှုန်းဖြင့် မျဉ်းဖြောင့်တလျှောက် ရွှေ့လျားခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာ ကျလာသည့် မိုးရေစက်များ၏ရွှေ့လျားမှု။



တိုက်ရိုက် အချိုးတူခြင်းများ

ငါးဈေးနှုန်းနှင့် ငါးအရေအတွက်ကဲ့သို့သော ကိန်းရှင်နှစ်ခု၏ အချိုးသည် အမြဲ တူနေလျှင် ကိန်းရှင်တစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုနှင့် တိုက်ရိုက်ပြောင်းလဲသည်ဟု ဆိုသည်။ ကုန်ကျငွေများလျှင် ငါးအရေအတွက်များမည်။ ဤတွင်ကိန်းရှင်နှစ်ခု တိုက်ရိုက်အချိုးတူသည်ဟုလည်း ပြောနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက် ဂရပ်သည် လက် ယာဘက်သို့ စောင်း၍ တက်သွားသည့် မျဉ်းပြောင်းတစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။




ငါးသေတ္တာတစ်စင်း ၁ ဒေါ်လာတန်သည်ဆိုပါစို့။ တစ်ဦးလျှင် ၁ ဒေါ်လာ၊ နှစ်ဦးလျှင် ၂ ဒေါ်လာ၊ သုံးဦး လျှင် ၃ ဒေါ်လာ ပေးရသည်။ တန်ဖိုးငွေသည် သံဗူးအရေအတွက်ကို လိုက်၍ မှန်မှန်တိုးလာသည်။

ဈေးနှုန်းပြဇယား

ဗူးအရေအတွက်	1	2	3	4	5
ဈေးနှုန်း (ဒေါ်လာ)	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00


x = ဗူးအရေအတွက်၊ y = ဈေးနှုန်း
 y -ဝင်ရိုး: $y = x$ ၏ ဂရပ်ကို ဆွဲနိုင်သည်။
 (ဒေါ်လာ) ဂရပ်သည် လက်ယာဘက်သို့တက်သွားသော မျဉ်းပြောင်းတစ်ကြောင်း ဖြစ်သည်။



မြန်နှုန်းနှင့် အကွာအဝေး

- လူ 4 km/h
- စက်ဘီး 20 km/h
- ကား 50 km/h


အချိန် (နာရီ)	1	2	3	4	5	
အကွာအဝေး (km)	လူ	4	8	12	16	20
	စက်ဘီး	20	40	60	80	100
	ကား	50	100	150	200	250



စည်သတ်ဗူးတစ်ဗူးသည် တစ်ဒေါ်လာပေးရသည် ဆိုပါစို့။ x = ဗူးအရေအတွက်၊ y = ဈေးနှုန်း (ဒေါ်လာဖြင့်) ဟု ထားလျှင် x နှင့် y သည်တိုက် ရိုက် အချိုးကျ ပြောင်းလဲသည်။ ဥပမာ $x = 1$ ဖြစ်လျှင် $y = 1$ ၊ $x = 2$ ဖြစ်လျှင် $y = 2$ ၊ စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ $y = 1x$ ရလေသည်။ $y = 1x$ ဂရပ်ကို ဆွဲရန် x နှင့် y ၏ တန်ဖိုးများပါသော ဇယားကို အထက်ပါအတိုင်း တည်ဆောက်ပါ။ ထို ဇယားအရ x သည် 1, 2, 3, ... တန်ဖိုးများ ဆောင် ထားသောအခါ y သည် 1, 2, 3, ... တန်ဖိုးအသီးသီး ဆောင်ကြောင်း သိရသည်။ အမှတ်များ (1,1), (2,2), (3,3), ... စသည်တို့ကို ဂရပ်စက္ကူပေါ် တွင် နေရာချပြီး ထိုအမှတ်တို့ကို ဖြတ်၍ မျဉ်းတစ် ကြောင်း ဆွဲပါ။ ထိုမျဉ်းသည် $y = 1x$ ၏ ဂရပ် ဖြစ်သည်။


ပြောင်းပြန် အချိုးတူခြင်း

မြန်နှုန်းနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ခရီး အကွာအဝေး တစ်ခုကို သွားရန် ကြာချိန်တို့၏ ဆက်သွယ်ချက်




မြန်နှုန်းမတူသည့် ယာဉ်နှစ်ခုဖြင့် နေရာ တခုမှ တခုသို့ ခရီးသွားလျှင် ယာဉ်တစ်ခုစီ သွားသော ကြာချိန်ချင်း မတူပေ။ ကြာချိန်နှင့် မြန်နှုန်းတို့၏ ဂရပ်သည် လက်ယာဘက်သို့ နှိမ့်ဆင်းသွားသည့် ဟိုက်ပါဘလာပုံ ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်းနှင့် ကြာချိန်တို့သည် တခုနှင့်တခု ပြောင်းပြန် အချိုးတူနေကြသည်။

ကိန်းရှင်နှစ်ခု၏ မြောက်လဒ်သည် ကိန်းသေဖြစ်လျှင် ထိုကိန်းရှင်တို့သည် ပြောင်းပြန် အချိုးတူသည်ဟုဆိုသည်။ တစ်ခု၏ တန်ဖိုးတိုးလာလျှင် ကျန်တစ်ခု၏ တန်ဖိုးသည် လျော့သွားသည်။ ပြောင်းပြန်အချိုးတူဂရပ်သည် လက်ယာဘက်သို့ နှိမ့်ဆင်းသွားသည့် ဗျဉ်းကွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကွာအဝေးတစ်ခုကိုသွားရန် ကြာချိန်သည် မြန်နှုန်းနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးတူသည်။ ကိန်းနှစ်ခု မြောက်လဒ်သည် တန်ဖိုးမပြောင်းလျှင် ကိန်းတစ်ခုသည် ကျန်ကိန်းနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးတူသည်။




မြို့နှစ်မြို့၏ အကွာအဝေးသည် 550 km ဖြစ်သည်။ 100 km/h မြန်နှုန်းဖြင့် ကားစီးသွားလျှင် ၅ နာရီကြာမည်။ 550 km/h မြန်နှုန်းရှိ လေယာဉ်စီးလျှင် ၁ နာရီသာ ကြာမည်။ သွားနှုန်းမြန်လေ သွားချိန်ညည်းလေဖြစ်သည်။ နေရာ နှစ်နေရာအကြား သွားရန်ကြာချိန်သည် မြန်နှုန်းနှင့် ပြောင်းပြန်အချိုးတူသည်။ ပြောင်းပြန်အချိုးတူ ကျသည့် ဖြစ်ရပ်များ ရှိသေးသည်။ အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးစီးရန် ကြာချိန်သည် အလုပ်သမားဦးရေနှင့် ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲသည်။ ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခု၏ ဧရိယာသည် မပြောင်းလဲလျှင် အလျားသည် အနံနှင့် ပြောင်းပြန်ပြောင်းလဲသည်။



အချိုးနှိုင်းရာခိုင်နှုန်း

အတိုင်းအတာနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ရန် ပထမအတိုင်းအတာကို ဒုတိယအတိုင်းအတာဖြင့် စား၍ ရသည့်အချိုးကို အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ ၃ နှင့် ၆ ၏ အချိုးသည် $\frac{၃}{၆}$ (၁ နှင့် ၂ ညီသည်) ဖြစ်သည်။ ၃ နှင့် ၆ ဟုလည်းရေးသည်။ ဤအချိုးကို ပိုင်းခြေ ၁၀၀ ရှိသည့် အပိုင်းကိန်း $\frac{၁၀၀}{၃}$ ဖြင့်လည်း ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤတွင် အချိုးသည် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ လူဦးရေ သိပ်သည်းကိန်းသည် ဒေသတစ်ခုအတွင်းရှိ လူဦးရေကို ဖော်ပြသည်။

ပျမ်းမျှထိချက်



အနီရုပ်ပုံတစ်ခုစီသည် ဗေဒစာသင်တန်းတစ်ခုရှိ ရိုက်ရာတွင် ထိသည့် အကြိမ်များကိုဖော်ပြပြီးအပြာရုပ်ပုံများသည်လွဲချော်သည့်အကြိမ်များကို ဖော်ပြသည်။ သူ၏ပျမ်းမျှထိချက်သည် ၃:၁၀ ဖြစ်ပြီး ၀.၃ နှင့်ညီသည်။

အဝါရောင်ပန်းများ၏အချိုး



ပန်းအိုးထဲတွင် ပန်း ၂၀ ပွင့်ရှိသည့် အနက် ၇ ပွင့်မှာ အဝါရောင် ဖြစ်သည်။ အဝါရောင်ပန်းများနှင့် ပန်းစုစုပေါင်းတို့၏ အချိုးသည် $\frac{၇}{၂၀}$ ဖြစ်ပြီး $\frac{၇}{၂၀} = ၀.၃၅$ နှင့်ညီသည်။ အနီရောင်ပန်းတို့နှင့် ပန်းစုစုပေါင်းအချိုးမှာ $၁ - ၀.၃၅ = ၀.၆၅$ ဖြစ်သည်။



ပြင်းအား



‘အင်’သည်လိမ္မော်ရည်အပြင်းကို ရေရောပြီး ပျော်ရည်တစ်ခွက် ပျော်လိုသည်။ ဖန်ခွက်တွင် လိမ္မော်ရည်အပြင်း 10 cc ကိုထည့်ပြီး၊ ရေ 30 cc ထည့်ရာ စုစုပေါင်း အရည် 40 cc ရသည်။ ပျော်ရည်၏ ပြင်းအားသည် ၁:၄ ဖြစ်ပြီး $\frac{၁}{၄} = ၀.၂၅$ နှင့်ညီသည်။

ဗေဒစာသင်တန်းသမားတစ်ဦးသည် ရိုက်ချက် ၈၆ ချက်အနက် ၂၇ ချက်ထိသည်။ ပျမ်းမျှ ထိချက်မှာ $\frac{၂၇}{၈၆} = ၀.၃၁၄$ ဖြစ်ပြီးအနီးဆုံး ၀.၃၁၄ ဖြစ်သည်။ သစ်သီးပျော်ရည်၏ ပြင်းအား၊ ရထားတစ်စင်းပေါ်ရှိ လူပြည့်နေသည့် ထိုင်ခုံဦးရေ စသည်တို့ကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ ရထားတစ်စင်းတွင် ထိုင်ခုံ ၁၂၀ ရှိသည့်အနက် လူ ၃၀ သာစီးလျှင် ခရီးသည် သိပ်သည်းမှုသည် $\frac{၃၀}{၁၂၀} = ၀.၂၅$ ဖြစ်ပြီး ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းဟုဖော်ပြသည်။ သစ်သီးရည်ကို ရေရောလျှင် ပျော်ရည်ပျော့၏ ပြင်းအားသည် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ရောမွှေပြီးနောက် ပျော်ရည်တစ်ခွက်တွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ပြင်းအားအတူတူဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမည်။ မြို့ကြီးများတွင် လူနေ သိပ်သည်းပြီး တောအရပ်ဒေသများတွင် လူနေကွဲသည်။ တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာ (1 km²) ကဲ့သို့သော နယ်မြေတစ်ခုအတွင်း လူမည်မျှ နေသည်ကိုရှာကာ လူဦးရေ ပျံ့နှံ့မှုကို ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဤကိန်းကို လူဦးရေ သိပ်သည်းကိန်းဟု ခေါ်သည်။

ခရီးသည်သိပ်သည်းမှု



ထိုင်ခုံ ၁၅၀ အနက် ထိုင်ခုံ ၉၀ တွင် လူရှိသည်။

လူ ၉၀

ထိုင်ခုံ ၁၅၀

အထက်ပါ သိပ်သည်းမှုသည် ထိုင်ခုံ ၁၀၀ လူ ၆၀ သိပ်သည်းမှုနှင့် တူညီသည်။

လူ ၆၀



ထိုင်ခုံ ၁၀၀

ထိုင်ခုံ ၁၅၀ ရှိသည့် မီးရထားတွဲတွင် ခရီးသည် ၉၀ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ခရီးသည် သိပ်သည်းမှုသည် $၉၀ \div ၁၅၀ = ၆၀$ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ရထားတွင် လူမည်မျှပြည့်ကျပ်နေကြောင်းကိုပြသည်။ ဤကိန်းကိုရရန် ခရီးသည်ဦးရေကို ထိုင်ခုံစုစုပေါင်းဖြင့် စားရသည်။

လူဦးရေသိပ်သည်းမှု

နိုင်ငံတစ်ခု၏ လူဦးရေစုစုပေါင်းကို နိုင်ငံ၏ဧရိယာဖြင့်စားလျှင် ထိုနိုင်ငံ၏လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုကို ရသည်။ နယ်သာလန်၏ လူဦးရေသိပ်သည်းမှုသည် ၃၇၅ ဖြစ်ပြီး ဂျော်ဒန်တွင် ၂၂ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်တွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်စတုရန်း ကီလိုမီတာတိုင်း၌ လူ ၃၇၅ နေထိုင်ပြီး ဂျော်ဒန်၌မူ လူ ၂၂ ဦးသာ နေသည်။

ကျွန်းတစ်ကျွန်း၏ လူဦးရေသိပ်သည်းမှု



လူ ၅၀

လိမ္မော်ရောင်မြို့နယ် 255.8	ပန်းရောင်မြို့နယ် 483.5
အပြာရောင်မြို့နယ် 114.4	အစိမ်းရောင်မြို့နယ် 196.7

စမ်းကြည့်ကြစို့

- (၁) ဘောလုံးရိုက်သမားတစ်ဦးသည် ရိုက်ချက် ၂၀ ချက်ရိုက်သည့်အနက် ၈ ချက်ထိသည်။ ပျမ်းမျှထိချက်ကို ရှာပါ။
- (၂) 'ဂျူဒို'သည် စုပူးကိုဖောက်ရာ ၁ ဆင့်စေ့ ၆၈ စေ့၊ ၁၀ ဆင့်စေ့ ၂၄ စေ့နှင့် ၂၅ ဆင့်စေ့ ၁၂ စေ့ တွေ့သည်။ အကြွေစေ့ တစ်မျိုးစီသည် အကြွေစေ့ စုစုပေါင်း၏ မည်သည့်ရာခိုင်နှုန်းစီ ရှိသနည်း။

ပြစ်တန်ခွမ်း

ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ ဖြစ်တန်ခွမ်းကို အပိုင်းကိန်းဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။ အန်စာတုံး ပစ်သည့်အခါ တစ်ကျနိုင်မည့်ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် ခွဲ ဖြစ်သည်။ အခြားကိန်းများ၏ဖြစ်တန်ခွမ်းများသည်လည်း ခွဲ ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်ပြကိန်းသည် အရာဝတ္ထုအစုတစ်စုကို နည်းလမ်းမည်မျှဖြင့် စီစဉ်နိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ အတွဲပြကိန်းသည် အစုဝင်အရေအတွက် A ပါသည့်အစုထဲမှ အစုဝင်အရေအတွက် B ပါသည့်အစုပိုင်းများရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်း အရေအတွက် ဖြစ်သည်။

အန်စာတုံးပစ်ခြင်း



အန်စာတုံး ပစ်ရာတွင် တစ်ပြစ်ပေါ်လာမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် ခွဲ ဖြစ်သည်။ အခြားကိန်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည်လည်း ခွဲ ဖြစ်သည်။




စုံကိန်း တစ်ခု ပေါ်လာနိုင်သည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် $p \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ရပ် ၆ ခုအနက် စုံကိန်းကျသည့် ဖြစ်ရပ် ၂ ခု ရှိသည်။



မ ကိန်းကျနိုင်သည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် $p \times \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ ဖြစ်သည်။

အန်စာနှစ်တုံးပစ်ခြင်း



အန်စာတုံး နှစ်တုံးဖြင့် ပေါင်းလဒ် ၇ ရနိုင်သည့် နည်းလမ်း ၆ ခု ရှိသည်။ ဤပေါင်းလဒ်ရစေမည့် နည်းလမ်း ၆ ခုသည် အခြားပေါင်းလဒ်အားသီးရစေမည့် နည်းလမ်းထက် ပိုသည်။

ခေါင်းပန်းမြှောက်ခြင်း

ပိုက်ဆံပြား တစ်ပြားကို မြှောက်လျှင် ခေါင်း သို့မဟုတ် ပန်းကျနိုင်သည်။



ပန်း

ခေါင်း

ခေါင်းကျမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်း $\frac{1}{2}$ နှင့် ပန်းကျမည့်ဖြစ်တန်ခွမ်း $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။

ပိုက်ဆံပြားနှစ်ပြားမြှောက်ခြင်း



ခေါင်း



ခေါင်း



ပန်း



ပန်း



ခေါင်း



ပန်း



ပန်း



ခေါင်း

ပိုက်ဆံပြား နှစ်ပြားကို မြှောက်လျှင် ကျနိုင်မည့်နည်းလမ်း ၄ ခုရှိသည်။ ခေါင်းစုံကျမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် $\frac{1}{4}$ ၊ ပန်းစုံကျမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် $\frac{1}{4}$ ၊ ဘက် (ခေါင်းနှင့် ပန်း) ကျမည့် ဖြစ်တန်ခွမ်းသည် $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။

စက္ကူကတ်ကြေးနှင့် ကျောက်ခဲကစားနည်း



‘ဂျန်’နှင့် ‘အင်’တို့သည်စက္ကူကတ်ကြေးနှင့် ကျောက်ခဲကစားနည်းကို ကစားကြသည်။ ကျောက်ခဲ (လက်သီး) က ကတ်ကြေး (လက်နှစ်ချောင်း) ကို နိုင်၍

ကတ်ကြေးက စက္ကူ (လက်ဖဝါး) ကို နိုင်ပြီး စက္ကူကကျောက်ခဲကို နိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ဤတွင်ဖြစ်နိုင်သောအတွဲအတွဲရှိသည်။

အတွဲ ၉ တွဲအနက် ‘ဂျန်’ က ‘အင်’ ကို နိုင်နိုင်သည့် အတွဲ ၃ ခု ရှိသည်။

‘ဂျန်’ က ‘အင်’ ကို နိုင်နိုင်သည့် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ ဖြစ်သည်။

ပိုက်စုပ်တံရွေးခြင်း



ပိုက်စုပ်တံ ၁၀ ခုတွင် ပိုက်တို ၁ ခုပါသည်။ ထိုပိုက်စုပ်တံတို့ကိုရွေးနိုင်သူ အနိုင်ရမည်။ ပထမလူ အနိုင်ရမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{1}{10}$ ဖြစ်သည်။ ဒုတိယလူသည် ကျန် ၉ ချောင်းမှ ရွေးရမည်။ ဒုတိယလူ အနိုင်ရမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် ပထမလူရှုံးမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းနှင့် ဒုတိယလူပိုက်တိုရွေးမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းတို့၏ မြောက်လဒ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် $\frac{9}{10} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{10}$ ဖြစ်သည်။ တတိယလူအနိုင်ရမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{1}{10} \times \frac{9}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{10}$ ဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် အနိုင်ရမည့်ဖြစ်တန်စွမ်းသည် လူတစ်ဦးစီအတွက် အတူတူဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမည်။

‘ဂျမ်း’သည် အန်စာတုံး တစ်တုံးကို ပစ်ရာ တစ်ကျသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် လေးကျသည်။ တစ်ကြိမ်စီတွင် မည်သည့်ကိန်းကျမည်ကို တိကျစွာ ကြိုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော် အန်စာတုံးကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပစ်သောအခါ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်သည့် ခြောက်ကြိမ်လျှင် တစ်ကြိမ် ကျမည်။ တစ်၏ ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{1}{6}$ သို့မဟုတ် $\frac{1}{6}$ ဖြစ်သည်။ အခြား ကိန်းများ၏ ဖြစ်တန်စွမ်း အသီးသီးသည်လည်း $\frac{1}{6}$ ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံပြားတစ်ပြား မြောက်ရာတွင် ခေါင်း သို့မဟုတ် ပန်းကျမည့် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။


ဖြစ်တန်စွမ်း စုစုပေါင်းသည် ၁ ဖြစ်သည်။ အန်စာတုံးပစ်ရာတွင် ကိန်းတစ်ခုစီ ကျရန် ဖြစ်တန်စွမ်းသည် $\frac{1}{6}$ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်တန်စွမ်းစုစုပေါင်းသည် $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = 1$ ဖြစ်သည်။ ပိုက်ဆံပြားမြောက်ရာတွင် ခေါင်းကျမည့် ဖြစ်တန်စွမ်း $\frac{1}{2}$ နှင့် ပန်းကျမည့် ဖြစ်တန်စွမ်း $\frac{1}{2}$ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်တန်စွမ်းစုစုပေါင်းသည် $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ဖြစ်သည်။



ထိဆကြီးပေါက်နိုင်မည့် ဖြစ်တန်စွမ်း အလွန်နည်းသည်။


အကြောင်းအားလျော်စွာ ကြုံကြိုက်တိုက်ဆိုင်၍ ဖြစ်လာသည့်အဖြစ်အပျက်များကိုလေ့လာလျှင် တစုံတခုသော နိယာမ၌ အကျုံးဝင်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုနိယာမကို ဖြစ်တန်စွမ်းနိယာမဟုတ် ခေါ်ဆိုသည်။

အစီအစဉ်များ



အရာဝတ္ထုအများထဲမှ အချို့ကိုရွေးချယ်ပြီး နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် စီစဉ်သော် ရမည့် နည်းလမ်းတို့ကို အစီအစဉ်များဟုခေါ်သည်။ ဥပမာ အနီ၊ အပြာ၊ အဝါ အရောင်စက္ကူ သုံးချပ် ရှိသည်ဆိုပါစို့။ လက်ဝဲဘက်တွင် ပြထားသည့် အတိုင်း ဤအရောင်စက္ကူများကို တတန်းတည်း စီထားနိုင်သည့်နည်းလမ်း ၆ ခုရှိသည်။ အစုဝင် A ခုပါသော အစုတစ်ခုမှ အစုဝင် B ခုကို ရွေးပြီး စီလျှင်ရရှိမည့် အစီအစဉ်အရေအတွက်ကို အစီအစဉ်ပြကိန်းဟု ခေါ်ပြီး $A^P B$ ဟု ရေးသည်။

အတွဲများ




အရာဝတ္ထုအများထဲမှ အချို့အား အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပဲ ရွေးချယ်ခဲ့လျှင် ဤသို့ ရွေးချယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းတို့ကို အတွဲများဟု ခေါ်သည်။ ဥပမာ လက်ဝဲဘက်တွင် ပြထားသကဲ့သို့ ပစ္စည်း ၄ မျိုးထဲမှ ၂ မျိုးကို ရွေးနိုင်သည့် နည်း (အတွဲ) ပေါင်း ၆ ခုရှိသည်။ သို့သော် လက်ဝဲဘက် ပစ္စည်းတို့ကို လက်ယာဘက်ပစ္စည်းတို့နှင့် နေရာလဲ၍ အစီအစဉ် အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်နိုင်သဖြင့် အစီအစဉ်ပေါင်း ၁၂ ခု ရှိသည်။ အစုဝင် A ခုပါသော အစုတစ်ခုမှ အစုဝင် B ခုအား အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်း မစဉ်းစားပဲ ရွေးလျှင် ရွေးနိုင်သည့် နည်းလမ်းအရေအတွက်ကို အတွဲပြကိန်းဟုခေါ်ပြီး $\binom{A}{B}$ ဟု ရေးသည်။



ရွှင်မြူးစရာ ရုပ်ပုံလွှာ
ပရပ်ရှားပြည် ကိုနှင့်စမတ်မြို့တွင် ဟိုဂဲမြစ်ကို ဖြတ်သည့် တံတား ၇ ခုရှိသည်။ လူအများသည် တံတားတစ်ခုစီကို တစ်ကြိမ်သာဖြတ်လျက် တံတားအားလုံးကို ဖြတ်ကျော် လမ်းလျှောက်ရန် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ဆွစ်ဇာလန်ရှိ သင်္ချာပညာရှင် 'လီယိုနတ်အိုင်လာ' (၁၇၀၇-၁၇၈၃) က နောက်ဆုံးတွင် ဤသို့လမ်းလျှောက်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြခြင်းဖြင့် ပြဿနာကို ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သူသည် ဖောင်တိန်ကို စက္ကူမှ မခွာပဲ တဆက်တည်းရေးနိုင်သည့် မျဉ်းတစ်ကြောင်း ဆွဲပုံများ၏ သဘာဝကို လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

အောက်ပါပုံတို့ကို မျဉ်းတစ်ကြောင်းတည်းဖြင့် ဆွဲကြည့်ပါ။






စာရင်းအင်းသင်္ချာ

ဂရပ်များ၊ ဇယားများကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရှုပ်ထွေးသော အကြောင်းအရာများ နှင့် ဖြစ်ရပ်များ၏ သဘာဝကို စနစ်တကျ လေ့လာနိုင်သည်။ စာရင်းအင်းသင်္ချာတွင် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အပျိုးအစား ခွဲခြားခြင်းများ ပြုလုပ်သည်။ အောက်တွင် ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ အရပ်အနိမ့်အမြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန် စသော တိုင်းတာမှုများကို ဥပမာပေးကာ စာရင်းအင်းသင်္ချာကို လေ့လာထားသည်။


လူဦးရေပျံ့နှံ့မှု

အိုရှင်းနီးယားနိုင်ငံများ (သြစတြေးလျနှင့် နယူးဇီလန် အပါအဝင်) ၀.၆%



အရာဝတ္ထုများကို စနစ်တကျ စီစဉ်ခြင်းသည် စာရင်းအင်း သင်္ချာ၏ အခြေခံဖြစ်၏။ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ ကို ဇယားတစ်ခုတွင် အတန်းလိုက်နှင့် အတိုင်လိုက် စီစဉ် ထားနိုင်သည်။ ရာသီဥတု အခြေအနေ၊ အရပ်အနိမ့်အမြင့် နှင့် အလေးချိန်တို့ကို ဇယားဖြင့် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။

အစီအစဉ်နှင့် ဇယားများ



အရာဝတ္ထုများကို အမျိုးအစားအလိုက် ခွဲခြားထားပြီး အစီအစဉ် တစ်ခု ပြုလုပ်ပါက ရှင်းလင်းသော အခြေအနေတစ်ခုကို ရနိုင်သည်။

				
20	16	6	4	14

အထက် လက်ဝဲဘက် ဆိုင်တွင် သစ်သီးများကို မည်သို့မျှ စီစဉ်ထားပေ။ သို့သော် လက်ယာဘက်ဆိုင်တွင် သစ်သီး များကို အစီအစဉ်ဖြင့် ထားသည်။ သစ်သီးများကို စနစ် တကျစီစဉ်ထားသောအခါအမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်ကို လွယ်ကူစွာသိနိုင်သည့် ဇယားတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်သည်။


ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော အစားအစာ



ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သော အစားအစာပြဇယား




	ကော်ဖီ	ဖျော်ရည်	ကိတ်မုန့်	သစ်သီး
ဖေဖေ				
မေမေ				
ဘိုးဘိုး				
မမ				
ကျွန်တော်				
ညီလေး				

လေးဦး ကော်ဖီကြိုက်ပြီး နှစ်ဦး ဖျော်ရည်ကြိုက်၏။
သုံးဦး ကိတ်မုန့်ကြိုက်ပြီး ငါးဦး သစ်သီးကြိုက်၏။
နှစ်ဦး ကိတ်မုန့်နှင့် သစ်သီး နှစ်မျိုးစလုံးကြိုက်၏။



ရာသီဥတုအခြေအနေ			
သာယာ	တိမ်ထူထပ်	မိုးရွာ	ဆီးနှင်းကျ
			

ဖေဖော်ဝါရီလ၏ရာသီဥတုအခြေအနေ

1	2	3	4	5	6	7
						
8	9	10	11	12	13	14
						

အကျဉ်းချုပ်မှတ်တမ်း	
သာယာ	15 ခု ရက်
တိမ်ထူထပ်	8 ၆ ရက်
မိုးရွာ	4 ၄ ရက်
ဆီးနှင်းကျ	3 ၃ ရက်

မိမိ၏မိသားစု				
	အသက် (နှစ်)	အရပ် (cm)	အလေးချိန် (kg)	နှစ်သက်ရာ
 မေမေ	37	170	65	
 မေမေ	33	162	53	
 မမ	11	128	30	
 မိမိ	9	117	23	
 မောင်လေး	5	102	19	

‘မေရီ’သည် ဖေဖော်ဝါရီလ ရာသီဥတုအခြေအနေကို လေ့လာထား၏။ ထို့ပြင် သူမ၏ မိသားစုနှင့် သက်ဆိုင်သော အကြောင်းအရာ များကိုလည်း စုဆောင်းထား၏။ ‘ရာသီဥတုကို သာယာ၊ တိမ်ထူထပ်၊ မိုးရွာနှင့် ဆီးနှင်းကျ’ ဟူ၍ ခွဲခြားထားပြီး သိလွယ်သော သင်္ကေတများဖြင့် ဖော်ပြထား၏။ ထို့နောက် ကိန်းများကိုသာ အသုံးပြုလျက် ဇယားတစ်ခု တည်ဆောက်၏။ ဇယားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေအကျဉ်းချုပ်ကို အလွယ်တကူ သိနိုင်၏။


မိသားစုအခြေအနေပြဇယားတွင် ကိန်းများနှင့် ရုပ်ပုံများ တွဲဖက်သုံးထားသဖြင့် လွယ်ကူစွာ နားလည် နိုင်သည်။

ထိုကဲ့သို့သော ဇယားများကို သင်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် တည်ဆောက်ကြည့်ပါ။


ဂရပ်များ

ဇယားတစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြထားသော ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များကို ဂရပ်များဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဂရပ်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် အချက်အလက်များကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်၏။ ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်ဘားဂရပ်၊ ရုပ်ပြဂရပ်၊ စက်ဝိုင်းဂရပ်စသည်ဖြင့် ဂရပ်အမျိုးမျိုးရှိ၏။ အချက်အလက်ကိုလိုက်၍ သင့်လျော်သော ဂရပ်မျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာ လစဉ်ငွေစုဆောင်းမှုအတွက် လစဉ်ထည့်ပေါင်းနိုင်သော စုပေါင်းမျဉ်းဂရပ်တစ်ခုဖြင့် ဖော်ပြနိုင်၏။

သွားလာနေသောယာဉ်အမျိုးအစားနှင့် အရေအတွက်



အရေအတွက်



ဘားဂရပ်

တိုင်တစ်ခုစီ၏ အမြင့်သည် နေ့တစ်နေ့တွင် သွားလာ နေသော သက်ဆိုင်ရာ ယာဉ်အမျိုးအစား တစ်ခု၏ အရေအတွက်ကို ဖော်ပြသည်။ ဘားဂရပ်မှာထိုယာဉ်များ၏ အရေအတွက်ကို နှိုင်းယှဉ်လိုသော အခါလွယ်ကူစေသည်။

ဖခင်၏တနေ့တာ




ဖြန့်ဝေခြင်းပြအဖြောင့် ဂရပ်

အိပ်ချိန် ၈နာရီ

အလုပ်ချိန် ၇နာရီ

စားချိန် ၃နာရီ

အဆောက်အအုံ အချို့၏ အမြင့်များ




ရုပ်ပုံဂရပ်

ရုပ်ပုံဂရပ်သည် ရေးဆွဲရန် မလွယ်ကူသော်လည်း အချက်အလက်များကို သရုပ်ဖော်ရာတွင် အသုံးဝင်သည်။

မျဉ်းဂရပ်

ပမာဏများ၏ ပြောင်းလဲပုံကိုပြရာတွင် မျဉ်းဂရပ်ကို အသုံးပြုသည်။ ယာယီတွင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ် ငါးဖမ်းမှု တန်ဖိုးကို ဖော်ပြထားသည်။ လက်ယာဘက် အပေါ်သို့ တက်သွားသည့် မျဉ်းများသည် တိုးတက်မှုကို ညွှန်ပြသည်။ လက်ယာဘက်အောက်သို့ ဆင်းသွားသော မျဉ်းများသည် ကျဆင်းမှုကို ဖော်ပြသည်။




ဇယားရှိကိန်းများကို တစ်ချင်းဖတ်မှသာ အကြောင်းအရာများ၏ ဆက်သွယ်မှုကို သိနိုင်သည်။ ၎င်းကို ဂရပ်ဖြင့်ဖော်ပြလျှင် လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်သည်။ ဂရပ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပမာဏ၏အရွယ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင် ဘားဂရပ်ကို အသုံးပြုပြီး တိုးတက်မှုနှင့် ကျဆင်းမှုများ ပြရာတွင် မျဉ်းဂရပ်ကို သုံးသည်။ တစ်ခုလုံးနှင့် အစိတ်အပိုင်းတို့ ဆက်သွယ်ချက်ကိုပြလိုလျှင် မျဉ်းဖြောင့်ဂရပ်၊ စက်ဝိုင်းဂရပ်နှင့် စတုရန်းဂရပ်တို့ကို အသုံးပြုသည်။

ဖြန့်ဝေခြင်းပြစက်ဝိုင်းဂရပ်

အချက်အလက်များကို ဇယားဖြင့် စုစည်းဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့ကို ဂရပ်များဖြင့် ဖော်ပြပါက ပိုမိုလွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်သည်။ ရုပ်ပုံပြဂရပ်သည် ရုပ်ပုံငယ်များ၏ အရွယ်အစား သို့မဟုတ် အရေအတွက်ဖြင့် ပမာဏများကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ခေါင်လိုက် ဘားဂရပ်တစ်ခုတွင် ဘား(တိုင်) ၏ အမြင့်သည် အရေအတွက်ကို ညွှန်ပြပြီး တိုင်မြင့်လေလေ အရေအတွက်များလေလေဖြစ်သည်။ အပူချိန် သို့မဟုတ် အလေးချိန်ကဲ့သို့သော အချိန်နှင့်လိုက်၍ ပြောင်းလဲနေသော အတိုင်းအတာများကို ဖော်ပြရန် မျဉ်းဂရပ်သည် ပိုမိုအသုံးဝင်သည်။ ခေါင်လိုက် ဘားဂရပ်တစ်ခုတွင် ဘားများ၏ ထိပ်စွန်းများကို ဆက်သွယ်ပေးခြင်းဖြင့် မျဉ်းဂရပ်တစ်ခု ရသည်။ အရေအတွက် များလာသောအခါ မျဉ်းသည် တက်လာ၍ အရေအတွက်နည်းလာသောအခါ မျဉ်းသည် ကျဆင်းလာသည်။ ထို့ကြောင့် ပြောင်းလဲမှုကို ချက်ချင်းသိနိုင်သည်။ တစ်ခုလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လိုသောအခါ စက်ဝိုင်း၊ မျဉ်းဖြောင့်နှင့် စတုရန်း ဂရပ်များကို အသုံးပြုသည်။

တနေ့တာ ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်များ



စုပေါင်းမျဉ်းဂရပ်


ဤဂရပ်တွင် လစဉ်စုဆောင်းမိသော ငွေပေါင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ စုပေါင်းမျဉ်းဂရပ်တွင် မျဉ်းသည် အပေါ်သို့အစဉ်တိုးတက်နေသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။



လစဉ်စုငွေဇယား

လ	စုငွေ	ပေါင်း	လ	စုငွေ	ပေါင်း
1	10	10	5	10	40
2	5	15	6	5	45
3	5	20	7	20	65
4	10	30	8	5	70

စက်ဝိုင်းတစ်ခုလုံးသည် တနေ့တာအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားလွှင့်ချိန် စုစုပေါင်း နာရီ ဖြစ်သည်။ လစဉ်စုငွေပေါင်း




မျိုးခွဲခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း

စာကြည့်တိုက်ရှိ စာအုပ်များကဲ့သို့သော အစုတစ်ခုတွင် ပါဝင်သည့် အစုဝင်များကို အမျိုးအစားအလိုက် စုပေးပြီး အစုပိုင်းများအဖြစ် ခွဲထားနိုင်သည်။ ထို့နောက် ထိုအစုပိုင်းများအတွင်းတွင် ပြန်လည်စီစဉ်မှုပြုနိုင်သည်။ ကပွဲရုံများအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံများ၊ လမ်းတစ်လမ်းရှိ အိမ်များနှင့် ဟိုတယ်ကြီးများရှိ အခန်းများသည် အမျိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်း၏ နမူနာများဖြစ်ကြသည်။ အစုတစ်ခုကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မျိုးခွဲစိတ်နိုင်သည်။




ကပွဲရုံအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံများကို ခွဲခြားစီစဉ်ထားသည်။

ကပွဲရုံတစ်ခုအတွင်းရှိ ထိုင်ခုံနံပါတ်များ




ထိုင်ခုံတိုင်း၌ နံပါတ်ရှိ၏။ ဥပမာ 4 C သည် စတုတ္ထတန်းဝမှစရေလျှင်တတိယခုံဖြစ်သည်။



ဂျပန်တွင် အိမ်၏လိပ်စာကို ရပ်ကွက်ကြီးနံပါတ်၊ ရပ်ကွက်နံပါတ်နှင့် အိမ်နံပါတ်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။ မြို့နယ်တစ်ခုကို ရပ်ကွက်ကြီး၊ ရပ်ကွက်များ ထပ်မံခွဲခြားသည်။ ရပ်ကွက်များအတွင်းရှိ အိမ်များကို နံပါတ်ဖြင့် ဖော်ပြသည်။

စာအုပ်များကို အမျိုးခွဲခြားခြင်း




‘ဒေးဗစ်’ နှင့် ‘ဂျိန်း’ တို့သည် စာအုပ်စင်တစ်ခုကို အတူ သုံးသည်။ ဤတွင် အမှားနည်းရန် မျိုးခွဲခြားခြင်းနှင့် စီစဉ်ခြင်း နည်းကို သုံးသည်။ ‘ဂျိန်း’ ၏ မြေပုံစာအုပ်ကို J-3-5 ဟု ဝဲမှ မှတ်သည်။ J သည် ‘ဂျိန်း’ 3 သည် စင် 3 ဖြစ်၍ 5 သည် 5 အုပ်မြောက် ဖြစ်သည်။

ရထားလက်မှတ် အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း



ကွန်ပျူတာဖြင့်ထိန်းချုပ်သည့်လက်မှတ်ရုံ



ဂျပန်နိုင်ငံတိုက်ခိုင်းစီမံရေးလက်မှတ်ပုံစံ

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် လက်မှတ်များကို ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ရောင်းချသည်။ လက်ဝဲမှ နမူနာလက်မှတ်သည် ဇွန်လ ၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင်တိုကျိုမှ ရှင်အိုဆာကာသို့ သွားမည့် လက်မှတ်နံပါတ် ၁၉ ဖြစ်သည်။ တွဲနံပါတ်သည် ၇၊ ထိုင်ခုံနံပါတ်သည် ၆ E ဖြစ် သည်။ လက်မှတ်ကို ခေါ်သောသူ သာ ထိုင်ခွင့်ရှိသည်။

ကားအမျိုးအစားကို ခွဲခြားမှတ်မိစေရန် ကားနံပါတ်ပြားပေါ်တွင် အက္ခရာနှင့် ဂဏန်းများကို ရေးမှတ်ရသည်။




အကုန်အကျများကို အမျိုးအစားခွဲခြားရာ၌ ကိန်းများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ မီးရထားလက်မှတ် တစ်စောင်ပေါ်တွင် ထိုင်ခုံနံပါတ်ကို ရေးသားထားလေ့ရှိသည်။ ဥပမာ ၂-၁၀ သည် တွဲနံပါတ် ၂ ထိုင်ခုံ နံပါတ် ၁၀ ကို ဆိုလိုသည်။ ရုပ်ရှင်ရုံရှိ ထိုင်ခုံများကိုလည်း အတန်းနံပါတ်၊ ခုံနံပါတ်တို့ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားထားသည်။

ဂျပန်နိုင်ငံ မြို့ကြီးများရှိ အိမ်များကို ရုပ်ကွက်ကြီးနံပါတ်၊ ရုပ်ကွက်နံပါတ်၊ အိမ်နံပါတ်တို့ဖြင့် အမျိုးအစား ခွဲခြားထားသည်။ တိုက်ခန်းကြီးများတွင် ကိုယ်ပိုင်တိုက်ခန်း တစ်ခုစီအတွက် တိုက်နံပါတ်၊ အထပ်နှင့် အခန်းနံပါတ်များဖြင့် အလွယ်တကူဖော်ပြနိုင်သည်။


တိုက်အုပ်စုတွင် တိုက်ခန်းများခွဲခြားခြင်း




‘အင်’သည် တိုက်ခန်းအမှတ် 3-203 တွင်နေ၏။




ရှေ့ဆုံးမှ ၃ သည် ‘အင်’နေသည့် အဆောက်အအုံ နံပါတ် ၃ ကို ညွှန်ပြသည်။



ဒုတိယကိန်း ၂ သည် ထိုအဆောက်အအုံ၏ ဒုတိယထပ်ကို ညွှန်ပြသည်။



နောက်ဆုံးကိန်း ၀၃ သည် ထိုအထပ်၏ တတိယမြောက် တိုက်ခန်းကို ညွှန်ပြသည်။



စာကြည့်တိုက်တစ်ခုတွင် စာအုပ်အမျိုးခွဲစီရန် ဒူဝီဆယ်လီစနစ်ကိုသုံးသည်။



ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များကို အလွယ်တကူရှာနိုင်ရန် အမျိုးအစားခွဲခြားထားရ၏။

နံပါတ်	အမျိုးအစား
၀၀၀	အထွေထွေ
၁၀၀	ဒဿနိကဗေဒ
၂၀၀	ဘာသာရေး
၃၀၀	လူမှုရေးသိပ္ပံ
၄၀၀	ဘာသာစကား
၅၀၀	သဘာဝသိပ္ပံ
၆၀၀	အသုံးချသိပ္ပံ
၇၀၀	ပန်းချီနှင့်အပန်းဖြေ
၈၀၀	စာပေ
၉၀၀	သမိုင်းနှင့်ပထဝီဝင်

ဒူဝီ ဆယ်လီစနစ်

စာကြည့်တိုက်တွင် စာအုပ်များအမျိုးခွဲရန် ဒူဝီ ဆယ်လီစနစ်ကို သုံး၏။ စာအုပ်များကို ပထမ အမျိုးအစား ၁၀ မျိုးခွဲထား၏။ တစ်ခုစီအတွက် ၁၀ မျိုးစီထပ်ခွဲပြန်၏။ ဤသို့အကြိမ်ကြိမ်ခွဲခြား နိုင်သည်။ စာအုပ်တစ်အုပ်အတွက် ၂၃၇ ကဲ့သို့ နံပါတ်တစ်ခုစီ မှတ်သားထားရ၏။ အဓိပ္ပာယ်မှာ

ပထမသတ်မှတ်ချက်အရ ၂ နံပါတ်အမျိုးအစား ဖြစ်၍ ဒုတိယသတ်မှတ်ချက်အရ နံပါတ် ၃ အမျိုး အစားဖြစ်ပြီး၊ တတိယသတ်မှတ်ချက်အရ နံပါတ် ၇ အမျိုးအစားဖြစ်၏။ ဝဲဘက်ရှိဇယားမှာ ပထမ သတ်မှတ်ချက်အရခွဲခြားထားသော အမျိုးအစား ၁၀ မျိုးဖြစ်သည်။



1	15	14	4
12	6	7	9
8	10	11	5
13	3	2	16

အံ့ဖွယ်စတုရန်း

ရွှင်မြူးစရာ ကိန်းသင်္ချာ

ရှေးဟောင်းတရုတ်ဒဏ္ဍာရီအရ၊ လွန်ခဲ့သော ရာစု နှစ်ပေါင်းများစွာက လိပ်ကြီးတစ်ကောင်သည် မြစ်ဝါမြစ်တွင်းမှတက်လာ၏။ ထိုလိပ်ကြီး၏ကျော ကုန်းပေါ်တွင် အစက်များပါလာပြီး ၎င်းတို့မှာ ထူးဆန်းသည့်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်နေ၏။ ထိုအစက်များကို ကူးယူ၍ ရေတွက်ကြည့်သောအခါ ပုံတွင် တွေ့ရ သကဲ့သို့ အံ့ဖွယ်စတုရန်းတစ်ခု ပေါ်လာ၏။ ထို စတုရန်းရှိ ဂဏန်းများကို အလျားလိုက်၊ ဒေါင် လိုက်၊ ထောင့်ဖြတ်အတိုင်း မည်သို့ ပေါင်းပေါင်း ၁၅ ရကြောင်း ထူးဆန်းစွာတွေ့ရ၏။ ထို့နောက် လူများသည် အံ့ဖွယ်စတုရန်းများလုပ်နည်းကို တွေ့ ရှိခဲ့ကြ၏။ အပေါ်ပုံတွင် နမူနာ အံ့ဖွယ်စတုရန်း တစ်ခုကို ဖော်ပြထား၏။

8	1	6
3	5	7
4	9	2

ထင်ရှားသောသင်္ချာပညာရှင်များ



သေးလီ

အီစီ-၆၂၄ (?) အီစီ-၅၄၆
ဂရိ



သေးလီ

သေးလီသည် ဂရိပြည်ဖွား တွေးခေါ်ရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သင်္ချာ၊ နက္ခတ္တဗေဒ၊ ရူပဗေဒနှင့် အခြား သိပ္ပံပညာများကို လေ့လာခဲ့သည်။ အီဂျစ်ပြည်သို့ ပညာရှာရန်သွားခဲ့သည်။ သူသည် သဏ္ဌာန်တူခြင်း သဘောတရားကို အသုံးပြု၍ ပီရမစ်တစ်ခု၏အမြင့်ကို

တွက်ပြခဲ့သည်။ ထို့ပြင်နေကြိတ်မည့်ရက်ကိုလည်း ကြို တင် ဟောခဲ့သည်။ အချို့ကသူ့ အား သင်္ချာပညာနှင့် နက္ခတ္တဗေဒတို့၏ ဖခင်အဖြစ် တင်စားပြောဆိုကြ၏။ တစ်ညတွင် သေးလီသည် ကြယ်များကိုမော့ကြည့် ယင်း လမ်းလျှောက်လာရာ ရေမြောင်းတစ်ခုထဲသို့

ကျသည်။ ဤအဖြစ်ကိုမြင်သော အိမ်ဖော်မကြီးက သူ့အား 'သင်လျှောက်နေသော လမ်းကိုမျှ သင် မမြင်လျှင် ကြယ်တာရာများအကြောင်း မည်ကဲ့သို့ ပြောနိုင်မည်နည်း' ဟု ပြောခဲ့ဖူးသည်။ သေးလီနှင့် ပတ်သက်၍ ဤသို့သောပုံပြင်များစွာ ရှိပေသည်။

ပိုက်သာဂိုရ


ပိုက်သာဂိုရသည် ဂရိပြည်ဖွား တွေးခေါ်ရှင် တစ် ယောက်ဖြစ်သည်။ သူသည် သင်္ချာပညာကိုသာမက ဂီတနှင့် အခြားပညာများကိုပါ လေ့လာလိုက်စားခဲ့ သည်။ ပညာရှာရန်အီဂျစ်ပြည်နှင့်ဗေဗီလို့နီးယားပြည် သို့ သွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုအစွဲပြုကာ အမည်ပေးထား သည့် သီအိုရမ်ကြောင့် အထူးထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့ သည်။ 'ထောင့်မှန်တြီဂိုနာတစ်ခုတွင်ထောင့်မှန်ခံအနား ပေါ်ရှိ စတုရန်း၏ ဧရိယာသည် ကျန်အနားနှစ်ဘက်

ပေါ်ရှိ စတုရန်းများ၏ ဧရိယာပေါင်းလဒ်နှင့် တူညီ သည်' ဟု ပိုက်သာဂိုရ သီအိုရမ်က ဖွင့်ဆိုသည်။ ရှေးဟောင်း အီဂျစ်မြေတိုင်းသူများ အသုံးပြုခဲ့သော $၃ : ၄ : ၅$ ထောင့်မှန်တြီဂိုနာတစ်ခုသည် သူ၏ သီအိုရမ် $(၃^2 + ၄^2 = ၅^2)$ ကို အခြေခံသည်။ ပိုက်သာဂိုရ သည်သူ့ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်တွင်စတုရန်းကွက်များ ဖော်ထားသည့်ကြမ်းပြင်ကိုကြည့်ယင်း ဤသီအိုရမ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုကြသည်။

တစ်နေ့တွင် ပန်းပဲဖိုအနီးဖြတ်သွားစဉ်သူ့ကြားခွဲ သော တူထူသံအမျိုးမျိုးမှ အတွေးတစ်ခု ရခဲ့သည်။ ၎င်းမှာ တူ၏လက်ကိုင်တိုလေလေ ထွက်လာသော အသံ မြင့်လေလေ ဟူသော အတွေးပင် ဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်ကို အသုံးပြုကာ စောင်းနှင့် ပလွေ ပုံစံ သစ်များကို တီထွင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ပြင် ပိုက်သာဂိုရ သည် ယူနီဗာဆီနှင့် ပတ်သက်သော သီအိုရီများစွာကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ပိုက်သာဂိုရ

အီစီ-၅၈၂ (?) အီစီ-၄၉၃
ဂရိ





ယူကလပ်
အီစီ-၃၀၀ ခန့်
ဂရိ



ယူကလပ်

ယူကလပ်သည် ဂျီဩမေတြီကျမ်း ၁၃ တွဲကို ပြုစုခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းတွင် 'ပေးရင်းအမှတ်နှစ်ခုကို ဖြတ်လျက် မျဉ်းဖြောင့်တစ်ကြောင်းတည်းကိုသာ ဆွဲနိုင်သည်' ဟူသော အဆိုကဲ့သို့ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသည့် အဆိုများ (သစ္စကထာ များ) ဖြင့် အစ ပျိုးပြီး ဂျီဩမေတြီ သီအိုရမ် အားလုံးကို ထိုအဆိုများမှ တဆင့် တည်ဆောက်ယူခဲ့သည်။ ထိုကျမ်းများကို

အရေးပါသော ဂျီဩမေတြီကျမ်းများအဖြစ် ကမ္ဘာတဝန်းလုံးက အသုံးပြုခဲ့သည်။

ယူကလပ်သည် သင်္ချာပညာရပ်ကို သူ၏ အသက်မွေးမှု သက်သက် အတွက်သာ သဘောထားခဲ့သူ မဟုတ်ပဲ မဖြစ်မနေ လေ့လာရမည့် အရေးပါသည့် ပညာရပ်တစ်ရပ်အဖြစ်ခံယူခဲ့သူဖြစ်သည်။ တချိန်က ဘုရင်တစ်ပါးသည် သူ့အား 'ဂျီဩမေတြီကို တတ်

ကျမ်းနားလည်ရန် ကျွန်ုပ်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူသော နည်းလမ်းမရှိလေသလော' ဟုမေးလေသည်။ ထိုအခါ ယူကလပ်က 'မင်းစိုးရာဇာတ်အတွက် ဂျီဩမေတြီ လေ့လာ သင်ယူနည်းဟူ၍ သီးသီးသန့်သန့် မရှိပါ' ဟု အဖြေ ပေးခဲ့သည်။ ပညာရှာမှီးသူတိုင်းသည် မိမိကိုယ်တိုင် တွေးတောကြံဆ ကြိုးစားရမည်သာ ဖြစ်သည်။

အာခီမီးဒီး


အာခီမီးဒီးသည် သင်္ချာနှင့် ရူပဗေဒပညာရှင် ဖြစ်ပြီး တီထွင်မှုပေါင်း များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ကုတ်စည်းမျဉ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကုတ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ သဘောကြီးတစ်ခုလုံးအား ရွေ့လျားစေခြင်းဖြင့် ကုတ်စည်းမျဉ်းကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ပြခဲ့သည်။ 'ကျွန်ုပ်အား လုံလောက်သော အရှည်ရှိသည့်ကုတ်တစ်ချောင်းနှင့်ထိုကုတ်ကို ကိုင်တွယ်လှုပ်


ရှားရန် နေရာတစ်နေရာ ပေးခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာမြေကြီး တခုလုံးကိုပင်လျှင် နေရာ ရှေ့ပစ်နိုင်မည်' ဟုလည်း ဆိုခဲ့သေးသည်။

သူသည် ဘုရင်တစ်ပါး၏သရဖူမှ ရွှေ စစ်မစက်ကို သိပ်သည်းခြင်း သဘောတရားသုံး၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် စက်ဝိုင်း၏ အဝန်းနှင့် ဧရိယာများ အတွက်ပုံသေနည်းများကိုလည်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

အာခီမီးဒီး ဇရာပိုင်းသို့ ရောက်လျှင် သူ့နိုင်ငံသည် ရောမစစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ရန်သူစစ်သား တစ်ယောက် သူ့အခန်းတွင်းသို့ ဝင်လာချိန်တွင် သူသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသောစက်ဝိုင်းတစ်ခုကို စိတ်ဝင်စားစွာ လေ့လာနေဆဲဖြစ်ရာ 'ငါ့စက်ဝိုင်းတွေကို တက်မနင်းနဲ့' ဟုအော်ပြောသည်။ ရန်သူစစ်သားသည် သူ့အား လှုံ့ဖြင့် အသေထိုးသတ်ခဲ့သည်။

အာခီမီးဒီး
အီစီ-၂၈၇ (?) အီစီ-၂၁၂
ဂရိ





လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ
၁၄၅၂-၁၅၁၉
အီတလီ

လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ

လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ သည် ငယ်စဉ်ကပင် သင်္ချာ၊ ဂီတ၊ ပန်းချီနှင့် အခြား ဘာသာရပ်များတွင် ထူးချွန်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်သူသည် ပန်းချီပညာကိုနှစ်သက်လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့သည်။ သူသည် ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီဆရာနှင့် ပန်းပုပညာရှင် တစ်ယောက် အဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သူသည် ထူးချွန်သော ဗိသုကာ ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကြီးကျယ် ထင်

ရှားသော ဗိသုကာ လက်ရာကောင်းများစွာကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သူသည် ဂျီဩမေတြီကို လေ့လာခဲ့သည်။ ပန်းချီရေးဆွဲရာတွင်ပန်းချီကား၏အဓိကအပိုင်းများ မှန်းဆထားသော တြိဂံ တစ်ခုပေါ်တွင် ကျရောက်အောင် ပြုလုပ်နည်းကို အသုံးပြုခဲ့လေသည်။ ဤနည်းကို ပီရမစ်ပုံစံ ဖွဲ့စည်းခြင်းဟု ခေါ်သည်။ ထို့ပြင်သူသည် ပတ္တမြားချပ်ပေါ်တွင် ထုပ်တစ်ခုကို ရေးဆွဲ

ရာ၌အနီးအဝေးသဘောကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤရေးဆွဲနည်းတွင် အားလုံးသော ရေညီမျှခြင်းမျိုးသည် အမှတ်သေတစ်ခုတွင် ဆုံတွေ့ဟန် ပေါ်လာသည်။ ဤနည်းကိုသူသည် 'နောက်ဆုံးညီစာ' အမည်ရှိ နာမည်ကျော် ပန်းချီကားရေးဆွဲရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အထက်ပါပုံတွင်လည်း အနီးအဝေးသဘောကို တွေ့ရသည်။

နတ်ကိုလတ် ကော့ပါးနိုကတ်

ကော့ပါးနိုကတ်သည် နက္ခတ္တဗေဒ၊ သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ ဥပဒေနှင့် ဆေးပညာရပ်များကို လေ့လာခဲ့သည်။ သူ၏ ခေတ်အခါက ကမ္ဘာသည် ယူနီဗာဆယ်၏ ဗဟိုချက်၌ရှိပြီး နေ၊ လနှင့် ကြယ်များက ကမ္ဘာကိုလှည့်ပတ်နေသည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ထားကြသည်။ သို့သော် သူ၏ အတွေးအခေါ်မှာ ရှိရင်းစွဲ

အတွေးအခေါ်များနှင့် ဆန့်ကျင်လျက် နေသည် ယူနီဗာဆယ်၏ ဗဟိုချက်၌ရှိပြီး ကမ္ဘာကသာ နေအား လှည့်ပတ်နေသည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့သည်။


သူ၏ကျော်ကြားလှသောသီအိုရီကို 'အာကာသ ဝတ္ထုပစ္စည်းများ၏လှည့်ပတ်ခြင်း' ဟုသော စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ သူ၏ သီအိုရီကို ရိုက်နှိပ်

ထုတ်ဝေခဲ့ပါက သူ့အား ဘုရားကျောင်းက အပြစ်ပေးမည်ကိုစိုးရွံခဲ့သည်။ သူ၏ မိတ်ဆွေများက တိုက်တွန်းဖန် များသောကြောင့် သူ၏ သီအိုရီတစ်ခုလုံးကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန် သဘောတူခဲ့သည်။ ထိုစာအုပ်မှာ ကော့ပါးနိုကတ် ကွယ်လွန်ချိန်တွင်မှ စက်တင်ပုံနှိပ်ဖြစ်သည်။



ကော့ပါးနိုကတ်
၁၄၇၃-၁၅၄၃
ပိုလန်





ဂယ်လီလီယို
၁၅၆၄-၁၆၄၂
အီတလီ



ဂယ်လီလီယို

ဂယ်လီလီယိုသည် သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒနှင့် နက္ခတ္တဗေဒ ပညာရပ်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ သူ့ ခေတ်မတိုင်မီက အောက်သို့ကျသော ဝတ္ထု၏ အလျင်သည် ၎င်း၏ အလေးချိန်ပေါ်တွင် တည်နေသည်။ လေးသော ဝတ္ထုသည် ပေါ့သော ဝတ္ထုထက် ပို၍ လျင်မြန်စွာ ကျလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဂယ်လီလီယိုကမူ အောက်သို့ကျသော ဝတ္ထုတစ်ခု၏အလျင်သည် ၎င်း၏အလေးချိန်ပေါ်တွင် မတည်ဟုယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည် ဤအချက်ကို စောင်းနေသော

ပီဇာမျှော်စင်ထိပ်ပျားမှ အလေးချိန်မတူသောသတ္တုစက်လုံး နှစ်ခုကို ပစ်ချပြခြင်းဖြင့် သက်သေထူခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိသည်။ ဂယ်လီလီယို မှန်ကြောင်း ယနေ့လူတိုင်း သိသော်လည်း သူ့ခေတ်အခါကမူ သူ၏အယူအဆနှင့် သက်သေပြချက်သည် အံ့ဩတုန်လှုပ်စရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ တချိန်တွင်လည်း သူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတစ်ခုရှိ ခေါင်းလောင်းကြီးတစ်ခု လွှဲနေသည်ကို စောင့်ကြည့်ယင်းမှ ခေါင်းလောင်းသည် ဘေးဘက်သို့ မည်မျှ

အကွာအဝေးမဆို လွှဲသည်ဖြစ်စေ လွှဲချိန်မှာ အတူသဖြင့် အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း သတိမူမိ ခဲ့သည်။ နောင်တွင် အထက်ပါယူဆချက်သည် ယေဘုယျဥပဒေသ အဖြစ် မှန်ကန်ကြောင်း သူတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းဥပဒေသကို ချိန်သီး၏အချိန်တူမှုဟု ခေါ်ခဲ့သည်။ နောင်တွင် နေကိုကမ္ဘာက လှည့်ပတ်နေသည်ဟု သော ကော့ပါးနီကတ်၏ အယူအဆကို ထောက်ခံခဲ့သဖြင့် သူ့အား ဘုရားကျောင်းက အပြစ်ပေးခဲ့သည်။


ဒေးကတ်


ပြင်ညီ သို့မဟုတ် ဟင်းလင်းပြင်ထဲရှိ အမှတ်များကို ကိုယ်စားပြုရန် (A,B) ကိန်း နှစ်ခုတွဲ သို့မဟုတ် (A,B,C) ကိန်းသုံးလုံးတွဲများစနစ်ကို ကိုသြဒီနိတ်များအဖြစ် စတင် အသုံးပြုခဲ့သူမှာ ရေနေဒေးကတ် ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ယူကလစ်ဂျီသြမေတြီမှ ပုံသဏ္ဌာန်များနှင့် ပတ်သက်နေသည့် အဆိုများကို

ကိန်းများပါဝင်နေသည့် အဆိုများအဖြစ် ပြောင်းလဲယူနိုင်သည်။ ဒေးကတ်သည် အိပ်ရာထဲ၌ အနားယူနေစဉ် ဤအတွေးကိုရခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ထိုသို့အနားယူနေစဉ် ပင့်ကူတစ်ကောင်သည် မျက်နှာကြက်ပေါ်တွင် သွားနေရာမှ ပင့်ကူပျင်တစ်ခုဖြင့် အောက်သို့ ကျလာသည်ကို မြင်ခဲ့သည်။

ဤသို့ဖြင့်ဟင်းလင်းပြင်ထဲမှအမှတ်များကို (A,B,C) ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန် သူ၏အတွေးကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူသည် a, b, c, x, y, z ကဲ့သို့သောအက္ခရာစာလုံးများကို ဂဏန်းကိန်းများကိုယ်စား စတင်အသုံးပြုခဲ့သူ၊ အနုတ်ကိန်းများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း လေ့လာဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။

ရေနေဒေးကတ်
၁၅၉၆-၁၆၅၀
ပြင်ဆစ်





ဗလေပါစကယ်
၁၆၂၃-၁၆၆၂
ပြင်သစ်

ပါစကယ်

ပါစကယ်သည် သင်္ချာ၊ ရူပဗေဒ၊ စာပေပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ၆ နှစ်သား၊ ၇ နှစ်သား အရွယ် က စတင်၍ ဂျီဩမေတြီဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စား ခဲ့သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူက ခက်ခဲနက်နဲသည့်ဘာသာရပ် ကို ကလေးတစ်ယောက် လေ့လာရန်မသင့်တော်ဟု ယူဆပြီး သင်္ချာစာအုပ်များကို သိမ်းထားခဲ့သည်။ သို့သော် ပါစကယ်က လျှို့ဝှက်စွာဆက်လက်လေ့လာ

ဆည်းပူးခဲ့သည်။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင် သူသည် တြိဂံတစ်ခု၏ အတွင်းထောင့်များ အားလုံးပေါင်း သည် ၁၈၀° ရှိကြောင်းစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ မှန်ကန်ချက်ကို ဖခင်အား ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့သည်။ ထိုအခါမှစ၍ ဖခင်က သားဖြစ်သူ ပါစကယ်အား သင်္ချာပညာရပ်များကို လွတ်လပ်စွာ လေ့လာခွင့်ပြု ခဲ့သည်။ ၁၉ နှစ်အရွယ်၌ ပါစကယ်သည် ခွေးသွားစိပ်


ဘီးများ ပါဝင်သည့် ဂဏန်းတွက်စက်ကို တီထွင် ခဲ့သည်။ သူသည် အရည်၏ ဖိအားနိယာမ တစ်ခုကို မော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထိုနိယာမကို ပါစကယ်၏ နိယာမ ဟု ခေါ်သည်။ ပါစကယ်က လူသည် စွမ်းအားငယ် သော်လည်း စဉ်းစား ဉာဏ်ကြီးသူ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။

ဆေကီ

ဆေကီသည်နယူတန်၊လိုက်ဗနစ်တို့နှင့်ခေတ်ပြိုင်ဂျပန် သင်္ချာပညာရှင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်သော ထုပ်များ၏ ထုထည်ရှာနည်းများ၊ မျဉ်းကွေးများဖြင့်ဘောင်ခတ် ထားသောပုံများ၏ ဧရိယာရှာနည်းများကို တီထွင်ခဲ့ သည်။ ထိုအချိန်ကဂျပန်လူမျိုးတို့သည်ယနေ့ခေတ်သုံး အာရေဗျ ကိန်းဂဏန်းများထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးခက်

ခဲသည့် တရုတ်ကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြ သည်။ ထို့ပြင်ဂျပန်လူမျိုးတို့သည် ရှေးခေတ် တရုတ် ပြည်တွင် စတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့်ဆန်ဂီခေါ်ကိရိယာ တစ်မျိုးကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ ကြသည်။ ရှေးခေတ် ဂျပန်လူမျိုးတို့၏သင်္ချာပညာကိုဝါဆန်ဟုခေါ်သည်။ အနောက်တိုင်းသင်္ချာပညာရပ်များ ဂျပန်ပြည်တွင်း

သို့ စတင်ဝင်ရောက်ပျံ့နှံ့လာသည့် ၁၉ ရာစုကုန်ဆုံး ချိန်တိုင်အောင် ဝါဆန်ပညာရပ်သည် ထင်ရှား ခဲ့သည်။ ဆေကီသည် ထင်ရှား ကျော်ကြား သည့် ဂျပန် သင်္ချာ ပညာရှင်ကြီးများ အနက် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။



ဆေကီတာကာကာဇု
၁၆၄၂-၁၇၀၈
ဂျပန်





အိုက်ဇက်နယူတန်
၁၆၄၂-၁၇၂၇
အင်္ဂလန်



နယူတန်

သင်္ချာပညာရှင်နယူတန်သည် ရူပဗေဒပညာကိုလည်း လေ့လာခဲ့သည်။ ပန်းသီးပင်မှ ပန်းသီးတစ်လုံး ကြွေသည်ကို မြင်ရာမှ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားကို နယူတန် စတင် တွေ့ခဲ့သည်။ ထိုပုံပြင်သည် ထင်ရှား ကျော်ကြားသော သော်လည်း ယုတ်မားစကားဖြစ်ဖွယ် ရှိသည်။ အရာ

ဝတ္ထုနှစ်ခု အပြန်အလှန် ဆွဲငင်သည့်အားကို ဆွဲငင်အား ဟု ခေါ်သည်။ ဝတ္ထုနှစ်ခုသည် တခုနှင့်တခု ဝေးလေလေ ၎င်းတို့ကြားရှိ ဆွဲငင်အားသည် နည်းလေလေ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကို လကပတ်သည့် ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနိယာမကို အသုံးပြု

လျက် ရှင်းလင်းနိုင်သည်။ နယူတန်သည် ဒိုင်နမစ် ပညာ၏ အခြေခံဖြစ်သော ရွေ့လျားမှုနိယာမကိုလည်း စတင်တွေ့ခဲ့သည်။ သူသည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရပ်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး သူ၏အမည်တွင်သော အလင်းပြန့်အဝေးကြည့်မှန်ပြောင်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။

လိုက်ဗနစ်

လိုက်ဗနစ်၏ ဖခင်သည် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ၆ နှစ်သားအရွယ်တွင် ဖခင်သေဆုံးသွားသည်မှစ၍ မိခင်က ပညာသင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ပင်ကိုဉာဏ်ဖြင့် ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး လေ့လာ ဆည်းပူးခဲ့ရသဖြင့် ရှေးရိုးစဉ်လာ စဉ်းစားဆင်ခြင် နည်းများမှ လွတ်ကင်းခဲ့သည်။ လိုက်ဗနစ်နှင့်

နယူတန်တို့ နှစ်ဦးစလုံးပင် ကဲကုလသင်္ချာ၏ အခြေခံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးကပင် ထိုအတွေးအခေါ်ကို “မိမိသာလျှင် ပထမဆုံး စဉ်းစား တွေးခေါ်ခဲ့သည်” ဟု ကြေငြာခဲ့ကြသည်။ မည်သူတီထွင်သည်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ရန် ကဲကုလဆိုင်ရာ ပုစ္ဆာများဖြင့် အချင်းချင်း ဉာဏ်စမ်းခဲ့ကြ

သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကို လိုက်ဗနစ်နှင့် နယူတန်တို့ အကြားဖြစ်ပွားသော သင်္ချာပညာစစ်ပွဲတစ်ပွဲဟု တင်စားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပင် တစ်ဦး၏ စိတ်ကူးကို တစ်ဦးမယူခဲ့ကြောင်း သဘောပေါက်ကာ စစ်ပြေငြိမ်းခဲ့သည်။ လိုက်ဗနစ်သည် ဂဏန်းတွက်စက်တစ်မျိုးကို တီထွင်ခဲ့သေးသည်။

ဂေါ့ဖရိလိုက်ဗနစ်
၁၆၄၆-၁၇၁၆
ဂျာမနီ





အိနိုတာဒါတာကာ

၁၇၄၅-၁၈၁၈
ဂျပန်

အိနို

အိနိုသည် ဇာတ်နိဗ္ဗိလယ်သမားတစ်ဦး၏ သားဖြစ်သည်။ ကျောင်းပညာကို မသင်ခဲ့ရ။ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစား လေ့လာခဲ့သည်။ ၁၈ နှစ်တွင် သူ့ကို ကုန်သည်ကြီး တစ်ယောက်က မွေးစားသည်။ အလုပ် လုပ်ရသဖြင့် ပညာဆည်းပူးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ၄၉ နှစ်တွင် အိမ်ထောင်မှု တာဝန်ကို သားအား

လွှဲခဲ့ပြီး နည်းပြဆရာတစ်ယောက်၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် နက္ခတ် ပညာ၊ သင်္ချာ ပညာ၊ သမိုင်းနှင့် မြေတိုင်းပညာရပ်များကို အချိန်ပြည့် လေ့လာခဲ့သည်။ ၅၅ နှစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကို လေ့လာတိုင်းတာရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ခွင့်ပြုခံရခဲ့သည်။ အိနိုသည် ဂျပန် တနိုင်ငံလုံး၏ မြေပုံကို ရေးဆွဲနိုင်ရန်

အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းကို သေဆုံးသည့် အချိန်ထိ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉ ရာစု ကုန်ဆုံးသည့် အချိန်အထိ သူ့မြေပုံများကို ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တရားဝင် မြေပုံများအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။

ဂေါက်

ဂေါက်သည် ဂဏန်းသင်္ချာပါရမီရှင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူ ၉ နှစ်သား တွင် ဆရာက သူ၏ တပည့်များ အား ကိန်းစဉ်တန်း ၁ + ၂ + ၃ + + ၄၀ ကို ပေါင်းခိုင်းသည်။ ဂေါက်က စိတ်တွက်ဖြင့် ပေါင်းလဒ် ၂၀ ကို ချက်ချင်း ရခဲ့သည်။ ဂေါက်သည် ထိုကိန်းစဉ်တန်းကို (၁ + ၄၀) + (၂ + ၃၉) + + (၂၀ + ၂၁)

= ၄၁ + ၄၁ + + ၄၁ = ၄၁ × ၂၀ = ၈၂၀ အဖြစ် စဉ်းစား ရှုမြင် ဆင်ခြင်ကာ တွက်ချက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ ပန်းရန်ဆရာဖြစ်သဖြင့် ဂေါက်ကို တက္ကသိုလ် ပညာသင် မပေးနိုင်။ သို့ရာတွင် သူ၏ ပါရမီအစွမ်းကို ကြားလျှင် ဘုရင်က ပညာသင် ဝရိတ် ထောက်ပံ့ခဲ့

သည်။ နောင်တွင် ဂေါက်သည် ကမ္ဘာကျော် သင်္ချာပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ သူသည် နက္ခတ္တဗေဒ၊ မြေတိုင်းပညာ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် ဓာတ်တို့နှင့် ပတ်သက်သော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို လည်း ပြုစုမှတ်တမ်း တင်ခဲ့သည်။



ယိုဟန်ဂေါက်

၁၇၇၇-၁၈၅၅
ဂျာမနီ



ယူနစ်ဇယား

အလျား	ထူထည်	အလေးချိန်
1 km = 1000 m	1 m ³ = 1000 l	1 t = 1000 kg
1 m = 100 cm	1 l = 10 dl	1 kg = 1000 g
1 cm = 10 mm	1 dl = 100 cc	ထောင့်
ဧရိယာ	1 cc = 1 cm ³	1° = 60'
1 km ² = 100 ha	အချိန်	1' = 60"
1 ha = 100 a	၁ ရက် = ၂၄ နာရီ	
1 a = 100 m ²	၁ နာရီ = ၆၀ မိနစ်	စက်ဝိုင်းဆိုင်ရာကိန်းသေ
1 m ² = 10,000 cm ²	၁ မိနစ် = ၆၀ စက္ကန့်	$\pi = 3.14$

ဧရိယာနှင့် ထူထည်ဆိုင်ရာပုံသေနည်းများ

ပြင်ညီပုံများ၏ဧရိယာများ	
စတုရန်း = (အနားတစ်ဘက်) ²	ပရစ်မမ် = 2 × အခြေဧရိယာ + ဘေးဘက်ဧရိယာများ
ထောင့်မှန်စတုရန်း = အလျား × အနံ	ဆလင်ဒါ = 2 × အခြေဧရိယာ + 2 × π × အချင်းဝက် × အမြင့်
အနားပြိုင်စတုရန်း = အခြေ × အမြင့်	ပိရမစ် = အခြေဧရိယာ + ဘေးဘက်ဧရိယာများ
ရွှမ်းပတ် = အခြေ × အမြင့် = ½ × ထောင့်ဖြတ်နှစ်ကြောင်းမြောက်လမ်း	လုံးချွန် = အခြေဧရိယာ + အယိုင်မြင့် × အချင်းဝက် × π
တြာပီဇီယမ် = ½ × အနားပြိုင်နှစ်ခုပေါင်းလမ်း × အမြင့်	စက်လုံး = 4 × (အချင်းဝက်) ² × π
တြိဂံ = ½ × အခြေ × အမြင့်	ထူပုံတို့၏ထူထည်များ
စက်ဝိုင်းစိတ် = စက်ဝိုင်း၏ဧရိယာ × $\frac{\text{ဗဟိုရှိထောင့်}}{360^\circ}$	ကုဗတုံး = (အနားတစ်ဘက်) ³
ဗဟို = $\frac{\text{တြိဂံများဖြစ်အောင် စိတ်ပိုင်းဖြီး}}{\text{ထိုတြိဂံများ၏ဧရိယာများပေါင်းလမ်း}}$	ထောင့်မှန်ထူပုံ = အလျား × အနံ × အမြင့်
စက်ဝိုင်း = (အချင်းဝက်) ² × π	ပရစ်မမ်ဆလင်ဒါ = အခြေဧရိယာ × အမြင့်
ထူပုံတို့၏မျက်နှာပြင်ဧရိယာများ	
ကုဗတုံး = 6 × (အနားတစ်ဘက်) ²	ပိရမစ်လုံးချွန် = ½ × အခြေဧရိယာ × အမြင့်
ထောင့်မှန်ထူပုံ = 2 × ထောင့်မှန်စတုရန်းပုံမျက်နှာသုံးမျိုး၏ဧရိယာများပေါင်းလမ်း	စက်လုံး = $\frac{4}{3} \times (\text{အချင်းဝက်})^3 \times \pi$

“စမ်းကြည့်ကြစို့” ကဏ္ဍအတွက် အဖြေများ

* စာမျက်နှာ ၂၃ 868,402,1066 ၉၈ + ၂၇ = ၁၂၅ လုံး	* စာမျက်နှာ ၃၃ (၁) 12,43,12,19,21 နှင့် အကြွင်း 3 14 နှင့် အကြွင်း 29 ၇ ÷ ၃ = ၂ နှင့် အကြွင်း ၁ ၆ ÷ ၃ = ၂. တစ်ဦးစီသည့်ချောက်လက်စူး ပြည့် ၂ ဗူးနှင့် ဗူးလွတ် ၂ တုံးစီရသည်။	* စာမျက်နှာ ၄၃ (၁) စာအုပ်တစ်အုပ်ချွေးနှုန်း X-အဖြေ X < ၅၀ ရမည်။ (၂) ရက်ပေါင်းကို X ဟုထားလျှင် ၃၀၀ - (X × ၄၀) = ၂၀ မှ X = ၇ ရက်ကို ရသည်။
* စာမျက်နှာ ၂၅ (၁) 53,117,268,99 (၂) ၄၃၈ - ၇၅ = ၃၆၃ ယောက် (၃) ၃၄၅ - ၇၀ = ၂၇၅	* စာမျက်နှာ ၃၈ (၁) $3\frac{3}{4} = \frac{15}{4} = 2\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$, $\frac{16}{3} = 5\frac{1}{3}$, $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ (၂) $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$, $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$, $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$, $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$ (၃) $(\frac{4}{12}, \frac{3}{12})$, $(\frac{9}{12}, \frac{2}{12})$	* စာမျက်နှာ ၉၁ (၁) ၈ ÷ ၂၈ = ၂၈၅၇, ယူမ်းမျှထိချက် ၂၈၆ (၂) ပိုက်ဆံများ အရေအတွက် စုစုပေါင်းသည် ၆၈ + ၂၄ + ၁၂ = ၁၀၄ ဖြစ်သည်။ ၁ ဆင့်စေ့ရာနှုန်းသည် $\frac{၆၈}{၁၀၄} \times ၁၀၀ = ၆၅\%$ နှင့် ဖြစ်သည်။ ၁၀ ဆင့်စေ့ ရာနှုန်းသည် ၂၃ ဖြစ်၏။ ၂၅ ဆင့်စေ့ ရာနှုန်းသည် ၁၂ ရမည်။

ဝေါဟာရစာရင်း

ကတိနရီ
ကီလိုဂရမ်
ကီလိုမီတာ
ကုဗတုံး
ကဲကုလသင်္ချာ
ကော့ပါးနီကတ်၊ နစ်ကိုလတ်
ကိုဩဒိနိတ်
ကိန်းရောဒသမ
ကိန်းသင်္ကေတ (ဂဏန်းခြေ)
ကျင်တူယ်
ကွပ်ပူ
ကွန်ပါ
ကွန်ပျူတာ

ခေါက်ချိုးညီခြင်း
ခြားနားခြင်း
ခြောက်ဆယ်လီစနစ်

ဂဏန်းတွက်စက်
ဂရပ်စက္ကူ
ဂေါ်လီ
ဂေါက်၊ ယိုဟန်
ဂယ်လီလီယို
ဂျီဩမေတြီ

ငါးလီစနစ်

စတုဂံ
စတုရန်း
စပရင်ချိန်ခွင်
စာရင်းအင်းသင်္ချာ
စက်လုံး
စက်ဝိုင်း
စက်ဝန်း
စည်းသတ်တန်ဖိုး

ဆခွဲကိန်း
ဆတိုးကိန်း
ဆေကီ တာကာကာဇု
ဆိုက်ကလိုက်
ဆယ်လီစနစ် (ဒသမစနစ်)
ဆယ်နှစ်လီစနစ်

တူညီသည်
တြာပီဇီယမ်
တြာပီဇိုက်

ထရန်စစ် ခေါ် မြေတိုင်းကိရိယာ
ထက်ကြီးသည်
ထောင်တိုင်းကိရိယာ
ထောင့်ဖြောင့်
ထောင့်မတ်ကျမျဉ်းများ
ထောင့်မှန်စတုဂံ
ထပ်တူညီမျှခြင်း

Catenary
Kilogramme
Kilometre
Cube
Calculus
Copernicus, Nicholas
Co-ordinate
Mixed decimal
Numeral
Set-Square
Quipu
Compasses
Computer

Symmetry
Difference
Sexagesimal system

Calculator
Graph paper
Marble
Gauss, Johann
Galileo
Geometry

Quinary system

Quadrilateral
Square
Spring balance
Statistics
Sphere
Circle
Circumference
Limit

Factor
Multiple
Seki Takakazu
Cycloid
Decimal system
Duodecimal system

Equal to
Trapezium
Trapezoid

Transit
Larger than
Protractor
Straight angle
Perpendicular lines
Rectangle
Congruence

ဒသမ
ဒေးကတ်၊ ရေနု
ဒိုင်
ဒိုင်နမစ်ပညာ
ဒသနိက

နယူတန်၊ အိုက်ဇက်
နက္ခတ္တဗေဒ
နက်ဂတစ် (ဓာတ်ပုံ)
နော့ခြင်း
နှိုင်းရသုဒ္ဓကိန်း
နှစ်လီစနစ်

ပရာဗလာ
ပရစ်ဇမ်
ပလက်တီနမ်
ပါစကယ်၊ ဗလေ့
ပီရမစ်
ပေသီး
ပေသီးခုံ
ပိုက်သာဂိုရု
ပိုက်သာဂိုရုသီအိုရမ်
ပေါင်းခြင်း (အပေါင်း)
ပေါင်းလဒ်
ပုံလှည့်ခြင်း

ဖလှယ်နည်းဥပဒေသ
ဖက်စပ်နည်းဥပဒေသ
ဖြစ်တန်စွမ်း
ဖြည့်မက်အစု
ဖြတ်ခြင်း
ဖြန့်ဝေနည်းဥပဒေသ

ဗလာအစု
ဗေ့စဘော

ဘားဂရပ်
ဘုံဆခွဲကိန်း
ဘုံဆခွဲကိန်းအကြီးဆုံး
ဘုံဆတိုးကိန်း
ဘုံဆတိုးကိန်းအငယ်ဆုံး

မညီချက်
မီတာ
မက်ထရီနုမ်း
မက်ထရစ်စနစ်
မျဉ်းစွေမျဉ်းစောင်း
မျဉ်းပြိုင်များ
မျဉ်းပြတ်
မျဉ်းဖြောင့်ပြီးပုံ

Decimal
Descartes, Rene
Dealer
Dynamics
Philosophy

Newton, Isaac
Astronomy
Negative
Union
Mutually prime
Binary system

Parabola
Prism
Platinum
Pascal, Blaise
Pyramid
Bead
Abacus
Pythagoras
Pythagoras' Theorem
Addition
Sum
Rotation of figure

Commutative law
Associative law
Probability
Complement of sets
Intersection
Distributive law


Empty set
Baseball

Bar graph
Common factor
Highest common factor
Common multiple
Lowest common multiple

Inequality
Metre
Mactronome
Metric system
Twisted or skewed line
Parallel lines
Segment
Rectilinear shape

ယူကလစ်	Euclid	ဟိုက်ပါဗလာ	Hyperbola
ယူနီဗာဆ်	Universe	ဟင်းလင်းပြင်	Space
ရူပဗေဒ	Physics	အကန့်အသတ်ရှိ	Limited
ရုပ်ပြဂရပ်	Pictograph	အကွာအဝေး	Distance
ရွမ်းဗတ်	Rhombus	အစု	Set
ရွှေအချိုး	Golden mean	အစုတစ်ခု၏အစုဝင်	Element of a set
		အစုပိုင်း	Subset
လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ	Leonardo da Vinci	အစီအစဉ်ပြကိန်း	Permutation number
လူမှုရေးသိပ္ပံ	Social Sciences	အစုဝင်	Element
လော်ဂရစ်သမ်	Logarithms	အဆိုများ (သစ္စာကထာများ)	Axioms
လိုက်ဗနစ်ဂေါ့ဖရစ်ဟန်	Leibniz, Gottfried Wilhelm	အတိုင်းအတာပမာဏများ	Quantities
		အတိမ်အနက်	Depth
လုံးချွန် (ကတော့ပုံ)	Cone	အတွဲပြကိန်း	Combination number
လုံးရှည် (ဆလင်ဒါ)	Cylinder	အပိုင်းကိန်းစစ်	Proper fraction
လျှော့ခွ	Slide callipers	အပိုင်းကိန်းတူ	Improper fraction
လျှော့တွက်တံ	Slide rule	အမြင့်	Height
		အလိုက်ပြောင်းနှုန်းရှာခြင်း	Differentiation
ဝက်အူခွ	Micrometre	အာခိုမီးဒီး	Archimedes
		အီနို တာဒါတာကာ	Ino Tadataka
သဘာဝသိပ္ပံ	Natural science	အီရီဒီယမ်	Irridium
သမ္မဟုပြုခြင်း	Integration	အီလစ်	Ellipse
သီအိုရမ်	Theorem	အောက်ငယ်သည်	Smaller than
သေးလိ	Thales	အင်ဗိုလု	Involute
သင်္ချာ	Mathematics	ဥသည့်ဆဋ္ဌဂံ	Regular hexagon
သဏ္ဌာန်တူခြင်း	Similarity	ဥသည့်ပဉ္စဂံ	Regular pentagon
သုဒ္ဓကိန်း	Prime number	ဥသည့်ဗဟုဂံ	Regular polygon
သိပ်သည်းခြင်း	Density	ဥသည့်အဋ္ဌဂံ	Regular octagon
		အိုင်လော့ လီယိုနတ်	Euler, Leonhard

ဂရိတ်ပုံ အမည် ဂရိတ်ပုံ အမည်



အင်ဗိုလ်
 အင်ဗိုလ်

ဟိုက်ပါမလာ
 ဟိုက်ပါမလာ

စက်ဝိုင်း
 စက်ဝိုင်း

ဆိုက်ကလို့က်
 ဆိုက်ကလို့က်

ပရာဗလာ
 ပရာဗလာ

အဋ္ဌဂံ
 အဋ္ဌဂံ

ဆယ်နှစ်နားပုံ
 ဆယ်နှစ်နားပုံ

အိလစ်
 အိလစ်

ဝိုင်ပုံ
 ဝိုင်ပုံ

ဆဋ္ဌဂံ
 ဆဋ္ဌဂံ

မြားခေါင်းပုံ
 မြားခေါင်းပုံ

ပဉ္စဂံ
 ပဉ္စဂံ

စတုရန်း
 စတုရန်း

ရှမ်းဗတ်
 ရှမ်းဗတ်

စတုရန်း
 စတုရန်း

ထောင်မှန်စတုရန်း
 ထောင်မှန်စတုရန်း

အနားပြိုင်စတုရန်း
 အနားပြိုင်စတုရန်း

နှစ်နားညီ
 ကြာပီဇိယမ်

ကြာပီဇိယမ်
 ကြာပီဇိယမ်

ကြာပီဇိယမ်
 ကြာပီဇိယမ်




နှစ်နားညီ
 ထောင်မှန်တြိဂံ

ထောင်မှန်တြိဂံ
 ထောင်မှန်တြိဂံ

သုံးနားညီတြိဂံ
 သုံးနားညီတြိဂံ

နှစ်နားညီတြိဂံ
 နှစ်နားညီတြိဂံ

အနားမညီတြိဂံ
 အနားမညီတြိဂံ



လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၃၀၀ က ရေးခဲ့သော ယူကလစ်၏ အခြေခံများသည် ဂျီဩမေတြီတွင် အရေးအကြီးဆုံးသော လုပ်ဆောင်ချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။

Read more Shwe Thway Journals at



↓ Click below link ↓

<https://www.facebook.com/shwethwayjournal/>