

ကလေး သူငယ်များ အတွက်

သုတရတနာသိုက်

အပင်များ





လာဂေါတင် ဂလော်ကာ



ရွှေရောင်တောင်စလပ်



ဒိုင်ဆင်ထရာပင်ပု



တောင်ပေါ်အဝါရောင်မိုင်အိုလက်



တောင်ပေါ်ဇော်မွှား



ဂျင်ရှင်



ဂျပန်တောင်ပေါ်သစ်ခွ



ခေါင်းလောင်းပွင့်



တောင်ပေါ်အေဗင်



နေနှင်းပန်း



အောက်ဆိထရော့ပစ်



ကျောက်ပန်း



ဟာကူဆာနာ ပရင်မြူလာ



နာစစ်ဆတ်ပွင့်ကဲ့သို့သော အင်နိုမိုနို



လောက်စဝပ်



ကိုလမ်ဗိုင်းပင်ပု



အာနိုကာ



ထင်းရှူးပင်ပု

ကလေး သူငယ်များ အတွက်

သုတရတနာသိုက်

အပင်များ

ကိုဒန်းရှား၏
ကလေးသူငယ်များအတွက်
ရောင်စုံစွယ်စုံကျမ်း မူရင်းကိုမှီး၍
အက်ဖ်အီးပီ အင်တာနေရှင်နယ် ပီတီအီးလီမိတက်က
တည်းဖြတ်သည့် မူကို
အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့်
တိုင်း-လိုက်ဖ် စာအုပ်တိုက်တို့က
မြန်မာပြန်ဆိုထုတ်ဝေသည်။

ပထမပုံနှိပ်ခြင်း အုပ်စု ၅၀၀၀၀

၁၉၈၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ

အမ္ဘာစာ

ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ ကလေးသူငယ်များ ဗဟုသုတ တိုးတက်ပွားများစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကလေးသူငယ်များအတွက် သုတရတနာသိုက် ဟူသောအမည်ဖြင့် ဤကျမ်းကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်ထုတ်ဝေလိုက်ပါသည်။

အဆိုပါကျမ်း၏မူရင်းမှာ Kodansha ကုမ္ပဏီမှ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော ရောင်စုံစွယ်စုံကျမ်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုစွယ်စုံကျမ်းကိုမိုး၍ Far East Publication International Pte Limited မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသော The Children's Treasury of Knowledge ကျမ်းကို အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနနှင့် Time-Life စာအုပ်ကုမ္ပဏီတို့ပူးတွဲ၍ မြန်မာပြန် ကျမ်း တစ်စောင်အဖြစ် ရောက်အောင် ကြိုးပမ်းကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဤသို့စီစဉ်ထုတ်ဝေရာ၌ နိုင်ငံတော်၏ပညာရေးကို ကမ္ဘာ့ပညာရေးအဆင့်မီစေရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်အားလျော်စွာ မြန်မာကလေးသူငယ်များသည် ကျောင်းပြဋ္ဌာန်းစာများအပြင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကိုလည်း အလွယ်တကူ ရယူဆည်းပူးနိုင်ကြပါစေဟူသော အာသိသထားရှိပါသည်။

ဤ သုတရတနာသိုက် တွင်-

- ၁။ ယူနီဗာဆစ်နှင့် ရာသီဥတု
- ၂။ အပင်များ
- ၃။ ကမ္ဘာဦးသက်ရှိများ
- ၄။ ရေအောက်သက်ရှိများ
- ၅။ အင်းဆက်ပိုးများ
- ၆။ တိရစ္ဆာန်များ
- ၇။ သင်္ချာ
- ၈။ အီလက်ထရွန်နစ်နှင့် စွမ်းအင်
- ၉။ ပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များ
- ၁၀။ ဝါသနာပါရာ အပန်းဖြေစရာ

ဟူ၍ ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံအသိပညာ အတတ်ပညာ စသည့် သုတရတနာများ ပါဝင်ကြပါသည်။ ထိုသုတရတနာများ သိုမှီးရာဖြစ်သောကြောင့် ကျမ်း၏အမည်ကို သုတရတနာသိုက် ဟူ၍ မှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဤကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှ မြန်မာဘာသာသို့ မွန်မြတ်သောစေတနာဖြင့် ပြန်ဆိုကြသော ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ ပညာရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည် စေ့စပ်သေချာစွာ ပြန်ဆို စိစစ်ကြပါသည်။ သို့သော် ဘာသာတစ်ခုမှ အခြားဘာသာတစ်ခုသို့ တိတိကျကျ ပြန်ဆိုရန်မှာ မလွယ်ကူလှသော ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဘာသာနှင့် တစ်ဘာသာမှာ အနက်အဓိပ္ပာယ် အကျယ်အကျဉ်း အနက်အတိမ် စသည့် ခြားနားမှုများရှိမြဲဖြစ်ရာ မူရင်းအဓိပ္ပာယ် တိကျစေရန် အချို့အချို့သော မူရင်းဘာသာစကားလုံးများကို မြန်မာဘာသာသို့ မပြန်ဆိုပဲ

အသံမျှသာ ဖလှယ်ထားပါသည်။ ဤသို့ အသံဖလှယ်ထားခြင်းကြောင့် မူရင်းဘာသာစကားနှင့် ရင်းနှီးမှု အကျိုးကိုလည်း ကလေးသူငယ်များ ရရှိနိုင်ပါသည်။

ပညာရှင်များ ယခုသုံးထားသော စကားလုံးများနှင့် အဓိပ္ပာယ်များထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သင့်မြတ်သည့် စကားလုံးများ အဓိပ္ပာယ်များကို ဤကျမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုသူများက အကြံပေးစေလိုပါသည်။ ထိုသို့ အကြံပေးချက်များကို လေးလေးစားစား လေ့လာပြီး ဆီလျော်သည့်အချက်အလက်နှင့် စကားလုံးများကို အစားထိုးပြောင်းလဲရန် အသင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဤကျမ်းတွင် ပါဝင်သည့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကို လိုသလိုရွေးနုတ်၍ ဆည်းပူးနိုင်ကြပါသည်။ ကလေးသူငယ်များအတွက်ဟု ဆိုသော်လည်း ဤကျမ်းကို ဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းဖြင့် ကလေးလူကြီးမရွေး ဗဟုသုတပွားများ၍ အသိဉာဏ်များ ပိုမိုအားကောင်းလာကြမည်။ ထို့ထက် တစ်ဆင့်တက်၍ သိလိုစိတ် စူးစမ်းရှာဖွေလိုစိတ်နှင့် သုတပွားလိုစိတ်များ ဆက်ကာဆက်ကာ ဖြစ်ပေါ်လာကြပါက ဤကျမ်းထုတ်ဝေရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သည်ဟု မှတ်ယူရပေမည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

မာတိကာ

	စာမျက်နှာ
အပင်များ	၇
အပင်လောက	၈
ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်များ	၁၀
ဆဲလ်	၁၂
လိုက်လျောညီညွတ်ခြင်း	၁၄
ရှေးဦးအပင်များ	၁၈
မျိုးစေ့မရှိသောအပင်များ	၂၀
ပင်လယ်ရေမွှေ့များ	၂၀
မှိုများ	၂၂
လိုင်ကင်များ	၂၄
ရေညှိနှင့်လစ်ဗာဝပ်များ	၂၅
ဖန်းပင်နှင့် ဖန်းနွယ်ဝင်အပင်များ	၂၆
မျိုးစေ့ပေါ် အပင်များ	၃၀
ကိုနီဗာပင်များ	၃၁
အပွင့်ဆောင်ပင်များ	၃၄
ကြီးထွားခြင်း	၃၅
မျိုးပွားခြင်း	၃၆
စေ့ရွက်စုံမျိုးရင်းများ	၃၈
နှင်းဆီမျိုးရင်း	၅၀
ပဲမျိုးရင်း	၅၂
ရာဘာမျိုးရင်း	၅၈
အာလူးမျိုးရင်း	၇၃
ပင်စိမ်းမျိုးရင်း	၈၀
ကော်ဖီမျိုးရင်း	၈၂
ဗူးမျိုးရင်း	၈၃
စေ့ရွက်ထီးမျိုးရင်းများ	၈၆
မြက်မျိုးရင်း	၈၈
နှင်းပန်းမျိုးရင်း	၉၄
သဘာဝ၏ ဟန်ချက်ညီခြင်း	၁၀၀
ဝေါဟာရစာရင်း	၁၁၁

မပြန်နာပုံ

အရှေ့တောင်အာရှအပူပိုင်းဒေသရှိ သစ်တောသည်
ဤစာအုပ်တွင် ဗဟိုရပ်မည့် အပင်များစွာတို့ ပေါက်
ရောက်သည့် နေရာဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသစ်တော
အကြောင်းကို သိနားလည်ရန် ခက်ခဲတော့မည်
မဟုတ်ပေ။

အပင်များ

ကျွန်ုပ်တို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အပင်တို့ကို တွေ့မြင်နေကျဖြစ်သောကြောင့် အထူးတလည် သတိမပြုမိတတ်ကြပေ။ သက်ရှိအားလုံးတို့မိမိရာမှာ အပင်များ ဖြစ်သည်။ လူ့အသုံးအဆောင်များကို အပင်များမှရသည်။ တိရစ္ဆာန်များ လည်း အပင်များကိုမှီခိုရသည်။ အသားမစားတိရစ္ဆာန်က အပင်ကိုစားသည်။ အသားစားတိရစ္ဆာန်က အပင်စားတိရစ္ဆာန်ကို စားသည်။ အပင်တို့ကမူ နေရောင်ခြည်မှ စွမ်းအင်ကိုရယူပြီး 'ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်' နှင့် ရေတို့ကို ပေါင်းစပ်ကာ မိမိတို့အတွက်အစာကို မိမိတို့ဘာသာ ပြုလုပ်နိုင်သည်။



ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားသော ပုဒ္ဓမ္မာကြာသည် အပြစ်ကင်းစင်သည့် အထိမ်းအမှတ်ကို ဆောင်သည်။

ဤမြေပုံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပင်များ ပျံ့နှံ့ပုံကို ပြသည်။ လေ၊ မိုးနှင့် အပူချိန်တို့အလိုက် တောအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုတောများကို ပေါက်ရောက်နေသော အပင်အမျိုးအစားအလိုက် အမည်မှည့်ခေါ်သည်။ ဒေသတစ်ခုတွင် မည်သည့်အပင်မျိုးပေါက်နိုင်၊ မပေါက်နိုင် ဆိုသည်မှာ မြေဆီလွှာအခြေအနေ၊ ရာသီဥတု၊ ရေရရှိမှု အစရှိသော ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ အားလုံးအပေါ်တွင် မူတည်သည်။


အပင်တို့သည် ၎င်းတို့နှင့် လိုက်လျောညီညွတ်သော တောတွင်သာ ပေါက်နိုင်သည်။ ပင်လယ်၊ တောင်၊ မြစ် အစရှိသည့် အဆီးအတားများအပြင် ရာသီဥတုကလည်း ဒေသတစ်ခုလုံး၏ သက်ရှိလောကနှင့် အသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ ကမ်းခြေရှိ တောင်တန်းများသည် အပေါ်မှ ဖြတ်သွားသော လေကို မိုးရွာစေသောကြောင့် တောင်၏တဘက်ခြမ်းတွင် အပင်များထူထပ်စွာ ပေါက်နိုင်သည်။ ကျန်တဘက်ခြမ်းတွင်မူ ရေမရှိသောကြောင့် သဲကန္တာရပေါက်အပင်

မျိုးများသာ ပေါက်နိုင်သည်။ ပို၍အေးသောဒေသတို့တွင် 'ကိနီဗာ' (ထင်းရှူးစသည့်) အပင်မျိုးများသာ ပေါက်နိုင်သည်။ ထိုသို့ပေါက်သောကြောင့် ၎င်းတောများကို ကိနီဗာသစ်တောဟု ခေါ်သည်။

သက်ရှိများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း

သိမြင်ပူးသော အပင်များစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့အားလုံးကို မှတ်မိနိုင်ရန် မလွယ်ပေ။ အပွင့်ဆောင်ပင် (အပွင့်ပွင့်သောအပင်) အမျိုးမျိုးကပင် အရေအတွက်နှစ်သိန်းခွဲခန့်ရှိသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြရန် စာမျက်နှာ ငါးသိန်းခန့် လိုအပ်မည်။ ထို့ကြောင့် အပင်များကို သဘာဝကျကျ လေ့လာလိုသောအခါ ပထမဦးစွာ ချဉ်းကပ်ပုံ သတ်မှတ်ရသည်။

မျိုးခွဲပညာရှင်တို့က လက္ခဏာတူသော အပင်များကို အုပ်စုများ ဖွဲ့ထားသည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် 'အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း' ဖြစ်သည်။



အပင်များပျံ့နှံ့နေပုံပြ လမ်းညွှန်

အာရှအရှေ့ပိုင်းနှင့် ဥရောပအလယ်ပိုင်းရှိ သစ်တောများတွင် ဆောင်းဦး၌ အရွက်ကြွေသော ဝက်သစ်ချသည့် အပင်များနှင့် အမြဲစိမ်းသော ထင်းရှူးစသည့် အပင်များ ရောနှောပေါက်သည်။

မြောက်ပိုင်း အာတိတ်နီးဒေသတွင် အပင်အရွက်ရှိ ရွက်ကြွေပင်များ ပေါက်သည်။ ၎င်းတို့အနက် အစိမ်းရောင် ပိရမစ်ပုံရှိသော 'လတ်ချီ'ပင်များ အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဆောင်းဦးတွင် အရွက်ကြွေသည်။

အစွန်းအကျဆုံး မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် အပင်အရွက်ရှိ အမြဲစိမ်းပင်များ ပေါက်သည်။ ၎င်းတို့အနက် ထင်းရှူးပင်၊ 'မား'ပင် နှင့် 'စပရူး'ပင်များ အများဆုံးဖြစ်သည်။

အပူပိုင်းဒေသရှိ ပူနွေးစွတ်စိုသော သစ်တောကြီးများတွင် သစ်ပင်ကြီးများ အထပ်ထပ်ရှိသည့်အပြင် ၎င်းတို့အပေါ်တွင် နွယ်ပင်များလည်းရှိသည်။

၁၈ ရာစုနှစ်များတွင် ထင်ရှားခဲ့သော ရုက္ခဗေဒပညာရှင် ကားလဗွန်လင်နေ က အပင်များကို အမည်နှစ်လုံးတွဲဖြင့် မှည့်ခေါ်သည်။ ရှေ့အမည်သည် မျိုးစု ဖြစ်ပြီး နောက်အမည်မှာ မျိုးစိတ်ဖြစ်သည်။ လက္ခဏာတူ မျိုးစိတ်တစ်ခုကို မျိုးစုဟု ခေါ်သည်။

နီးစပ်သောမျိုးစုများကိုစု၍ မြက်၊ အုန်း၊ နှင်းပန်းမျိုးရင်းများ စသည်ဖြင့် မျိုးရင်းဖွဲ့သည်။ မျိုးရင်းအချို့တွင်မူ မျိုးစုတမျိုးတည်းသာ ပါဝင်သည်။


သတ္တဝါများကိုလည်း မျိုးစိတ်၊ မျိုးစု၊ မျိုးရင်း စသည်ဖြင့် အလားတူ ခွဲခြားနိုင်၏။ အသေးစိတ်လက္ခဏာ ခြားနားသော်လည်း ယေဘုယျလက္ခဏာ တူညီသော အပင်များကို မျိုးစုတမျိုးတည်းအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ အားဖြင့် သင်္ဘောပင်အမျိုး ၅၀ ခန့်ရှိသည်။ တမျိုးနှင့်တမျိုး မတူသော်လည်း မျိုးစုတမျိုးထဲတွင် အားလုံးပါဝင်သည်။

သင်္ဘောသီးအနီမျိုး၊ အဝါမျိုးကို မျိုးပြားဟု ခေါ်သည်။ စိုက်ပျိုး၍

ရသော အထူးမျိုးပြားကို မျိုးယဉ်ဟု ခေါ်သည်။

မျိုးစိတ်များ သတ်မှတ်ရန် ကမ္ဘာသုံး စည်းမျဉ်းအနည်းငယ်သာ ရှိသည်။ အပင်တို့၏ မျိုးဆက်ခံသည့် လက္ခဏာများအရ ၎င်းတို့၏ မျိုးစိတ်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။ မျိုးစိတ်တူ အပင် အချင်းချင်း သာ သန္ဓေအောင် ပြီး အပင်သစ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လက္ခဏာမတူသည့် မျိုးရင်းတူ အပင်နှစ်ပင် ပေါင်းစပ်ပြီး ဖြစ်လာသောအပင်ကို မျိုးစပ်ပင်ဟု ခေါ်သည်။

အပင်၏သိပ္ပံအမည်သည် နားလည်ရန်ခက်ခဲမည်။ အများသုံးသော စာလုံး များကိုပင် ရုက္ခဗေဒပညာရှင်တို့က အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော်လည်း သာမန် အဓိပ္ပာယ်ထက် ပို၍လေးနက်သော အဓိပ္ပာယ်ကိုဆောင်တတ်သည်။ ဤစာအုပ် တွင် ၎င်းတို့သုံးသည့် အခေါ်အဝေါ်များဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ ရုက္ခဗေဒ ပညာရှင်မဟုတ်စေကာမူ နားလည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။



- | | |
|--|--|
| <p> ဝင်ရိုးစွန်းရေခဲပြင်၊ ကမ္ဘာ့အလယ်ပိုင်းသဲကန္တာရများနှင့် ရေခဲသည့် မြောက်ပိုင်း တန်ဖရာဒေသများတွင် အပင် အလွန်ရှားပါးသည်။ 'လိုင်ကင်'၊ မှို၊ ရေညှိနှင့် ချုံပင်ငယ်အချို့သာ ပေါက်နိုင်သည်။</p> <p> အပူပိုင်းရှိ ကန္တာရဆန်သောဒေသတွင် ချုံပင်များ ပေါက်သည်။ သစ်မာပင် ကဲ့သို့ သစ်သားရှိသည်။ ပင်စည်မ မရှိပဲ ပင်စည်ငယ်များ မြေပြင်မှ ပြိုင် ထွက်သည်။</p> | <p> လူတို့ ခုတ်ထွင်ခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်များ၏ စားကျက်ဖြစ်သွားခြင်းတို့ကြောင့် အပင်များ ကင်းမဲ့သွားသော ဒေသတို့တွင် မြက်ခင်းများ ဖြစ်ပေါ်သည်။ မိုးအသင့်အတင့်ရွာပြီး မိုးခေါင်ကာလကြာမြင့်သည်။</p> <p> ရာသီဥတုမျှတသော သမပိုင်းတွင် အရွက်ကြီးသော ရွက်ကြွေပင်များ ပေါက် သည်။ ဝက်သစ်ချနှင့် အခြားအပင်တို့သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် လိုက်လျောညီညွတ်စွာ ပေါက်နိုင်သည်။</p> |
|--|--|

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်များ

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောစေရန် သက်ရှိတို့ တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာသည့်အခါ အသွင်နှင့် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိသော အပင်အမျိုးပေါင်း မရေမတွက်နိုင်အောင် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။

သက်ရှိအားလုံးတို့သည် ပင်လယ်မှ အစပြုသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အပင်များသည် မမှန်းဆနိုင်လောက်သော အချိန်ကာလအတွင်း တိရစ္ဆာန် များကဲ့သို့ ပင်လယ်ကိစ္စနဲ့ခွာ၍ ကုန်းပေါ်တွင် ပေါက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ဤရုပ်ပုံ ကားချပ်သည် အပင်လောက၏ မိသားစုမျိုးစဉ်ကို ပြသည်။ နှစ်ပေါင်း သန်းနှစ်ထောင်ခန့်အတွင်း အဆင့်ခုနစ်ဆင့်ဖြင့် ပြောင်းလဲလာပုံကို ကျောက် ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။

အပင်နှင့် သတ္တဝါတို့၏ လက္ခဏာနှစ်မျိုးစလုံးကိုဆောင်သည့် ရှေးအကျ ဆုံးသော သက်ရှိတို့မှာ အသေးဆုံးဖြစ်သည့် 'ဗိုင်းရတ်' များ ဖြစ်သည်။ သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်သော 'ဗက်တီးရီးယား' တို့သည် ဗိုင်းရတ်များထက် ပိုကြီးပြီး ယခုခေတ် အပင်များနှင့် ပိုနီးစပ်သည်။ ဒေသမရွေးပေါက်နိုင်သော 'အယ်လဂျီကိုလိုနီ' များကိုလည်း 'မိုက်ခရိုစကုပ်'ဖြင့် ကြည့်မှ မြင်နိုင်သည်။ အကျိုးပြုနိုင်သောမူနှင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသောမူတို့သည်လည်း ရှေးကျသော အပင်များ ဖြစ်သည်။

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် နောက်တဆင့်မှာ 'ဖန်း'ပင်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် အရွက်ကဲ့သို့သော 'ပရွန်း' များနှင့် အမြစ်များရှိသည်။ ၁၀ မီလီမီတာမှ မီတာ ၂၀ အထိ မြင့်သည်။ အစေ့မရှိပဲ 'စပိုး'ဖြင့် မျိုးပွားသည်။

ရှေးကျသော အပင်အုပ်စု နောက်တမျိုးမှာ မျိုးစေ့ဖော်အပင်များ ဖြစ် သည်။ ၎င်းတို့သည် အစေ့ဖြင့်မျိုးပွားသော နည်းသစ်ကို ပထမဆုံးဆောင် ရွက်သည့် အပင်များ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်လာသည်။ များပြားပြီး ထင်ရှား သော မျိုးစေ့ဖော်အပင် အုပ်စုတမျိုးမှာ ထင်းရှူးမျိုးပင်များ ဖြစ်သည်။

အဆင့် အမြင့်ဆုံးသော အပင်ဆောင်ပင်များသည် မျိုးစေ့ဝှက်အပင်များ ဖြစ်သည်။ အပင်ဆောင်ပင်များကို အစေ့ရွက်ပါဝင်ပုံအရ စေ့ရွက်ထီးပင်များ နှင့် စေ့ရွက်စုံပင်များဟူ၍ အုပ်စုနှစ်ခု ထပ်မံခွဲထားသည်။

သက်ရှိအားလုံး၏ အခြေခံယူနစ်ဖြစ်သော 'ဆဲလ်' အကြောင်းကို နားလည် ထားပြီးနောက် အရိုးဆုံး အရှင်းလင်းဆုံးမှ တဆင့်ပြီးတဆင့် တက်ကာ အဆင့်အမြင့်ဆုံး မျိုးစေ့ဝှက်အပင်များအထိ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို လေ့လာ သွားကြမည်။



ပထမဆုံးအပွင့်များ




ပထမဆုံးအစေ့အစစ်များ




ပထမဆုံးအရွက်အစစ်များ



ပထမဆုံးပင်စည်အစစ်များ



ပထမဆုံးကလိုရိုပလတ်များ



ပထမဆုံးသက်ရှိများ



ပထမဆုံးအောက်ဆီဂျင်ထုတ်လွှတ်သောအပင်များ



စေ့ရွက်ထီးပင်များ

မျိုးစေ့ဝှက်အပင်များ

စေ့ရွက်စုံပင်များ

ကိုနီဖာပင်များ

မျိုးစေ့ဖော်အပင်များ

မုန်တိုင်ပင်များ

ပန်းပင်များ

မြင်းမြီးပင်များ

တယ်ရီဒိုဖိုက်တာ

တင်းပုတ်ရေညှိပင်များ

ဆိုက်လိုဖိုက်များ

လစ်ဗာဝပ်များ

ဗရိုင်ယိုဖိုက်တာ

ရေညှိများ

ရွှေရောင်အယ်လဂျီများ

အညိုရောင်အယ်လဂျီများ

မုှုများ

ယူဂလီနိုက်များ

ဒိုင်နိုဖလက်ကျယ်လိတ်များ

အဝိမ်းရောင်အယ်လဂျီများ

ကလိုရိုဖိုက်တာ

အနီရောင်အယ်လဂျီများ

ဝိမ်းပြာအယ်လဂျီများ


ရှေးဦးအပင်များ

စတက်၊ဗက်ဆီလိုင် အစရှိသည်များ

ပိုတိုဗက်တီးရီးယားများ

ဗက်တီးရီးယားများ

ဒီမိုဗက်တီးရီးယားများ



ဤပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း စံပြ 'ဆဲလ်' တစ်ခုတွင် 'နယူကလိယ' တစ်ခုနှင့် ၎င်းကိုဝန်းရံနေသော 'ဆိုက်တိုပလာဇမ်' ပါဝင်သည်။ ဆိုက်တိုပလာဇမ်သည် ဆဲလ်နံရံအတွင်းရှိ ပျော်ဝင်ခြင်း၊ အနည်ထိုင်ခြင်းပဖြစ်သော အရာဝတ္ထုများ ပါဝင်သည့် 'ပရိုတိုပလာဇမ်' အရည် ဖြစ်သည်။

ဆဲလ်တစ်ခုအကြောင်း

သက်ရှိအားလုံးအကြောင်းအတွက် ‘ဆဲလ်’ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်နိုင်သည်။ သက်ရှိအားလုံးကို ဆဲလ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရှေးအကျဆုံးအပင်တို့တွင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သော ဆဲလ်တစ်ခုတည်း ပါဝင်သည်။

ဆဲလ်ကို မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့် ကြည့်မှ မြင်နိုင်ပြီး ၎င်းတွင် ဆဲလ်နံရံရှိသည်။ “ဌာနချုပ်” သဘောရှိသည့် ‘နယူကလိယ’ တစ်ခု ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် ထွေပြားသည့် ဓာတ်ခြပ်ပေါင်းများ ဖြစ်သော ‘ဒီအင်အေ’ (DNA) နှင့် ‘အာအင်အေ’ (RNA) တို့ ရှိသည်။

‘ဆိုက်တိုပလာဇမ်’အရည်တွင် နယူကလိယနှင့် အခြားပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့က ဆဲလ်ကို လုပ်ငန်းများအားလုံး လုပ်နိုင်စေသည်။

ကုန်းနေအပင်တို့တွင် ဆဲလ်အချို့က အမြစ်မှရေကို အရွက်များအထိ ပို့ပေးသည်။ အမြစ်ဆဲလ်များက မြေမှ ရေကိုစုပ်ပြီး တပင်လုံးသို့ပို့သည်။ နီးကပ်စွာ တည်ရှိသော ဆဲလ်တို့တွင်ပင် တခုနှင့်တခု ခြားနားသော အဆောက်အအုံနှင့် လုပ်ငန်းများ ရှိသည်။ အရွက်အတွင်းရှိ အပေါ်မျက်နှာပြင်ဆဲလ်တို့သည် ရေလုံစေရန် ‘ကျူတီကယ်’ခေါ် ဖယောင်းလွှာ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းဆဲလ်တို့နှင့် ခပ်ခပ်နီးသော ဝေးသောနေရာရှိ ဆဲလ်တခုက ၎င်း၏နံရံကို လွယ်ကူစွာ ရေဖြတ်သန်းသွားစေနိုင်သည်။

ဆဲလ်တစ်ခု၏ နယူကလိယထဲတွင် နှောင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် တပင်လုံးအတွက် “ဗီဇ”များ ပါရှိသည်။ ပဲစေ့တစေ့က မည်သည့် အခါမျှ နေကြာပင် သို့မဟုတ် ဂေါ်ဖီထုပ်ပင် ပေါက်လာခြင်းမရှိချေ။ ပဲပင်သာပေါက်မည်။ အပင်

တပင်မှ ဖြတ်ယူလိုက်သော အပိုင်းတိုင်းကို အာဟာရပေးလျှင် အပင်တပင် ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အပင်တပင်အတွင်းရှိ ဆဲလ်တစ်ခုတွင် လုပ်ငန်း တခုသာ ရှိသော်လည်း ဆဲလ်တိုင်းတွင် တပင်လုံးအတွက် ဗီဇများပါရှိသည်။

ဆဲလ်တစ်ခုသည် တပင်လုံးကဲ့သို့ပင် အခြေခံလုပ်ငန်းများကို လုပ်နိုင်ရမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပြောင်းအလဲရှိသည့်အခါ ဆဲလ်သည် အခြေအနေသစ်များနှင့် လိုက်လျောအောင်ညှိပြီး သက်ရှိ၏လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်။ သို့မဟုတ် သေမည်။ ဆဲလ်တို့သည် မျိုးဆက် တဆက်ပြီးတဆက် အသွင်နှင့်အပြုအမူ ပြောင်းလဲလာသည်။ အပင်အသက်ရှင်စေရေးအတွက် ကုပ်တွယ်ရန်နှင့် ရေစုပ်ယူရန် အမြစ်ဆဲလ်များ၊ အပင်အတွက် အစာဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အရွက်ဆဲလ်များ၊ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရန် လိင်ဆဲလ်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ထိုသို့ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ‘ကွဲပြားရင့်မာခြင်း’ဟု ခေါ်သည်။

အပင်တို့တွင် ဆဲလ်အရေအတွက် များပြားလာသည်နှင့်အမျှ ဆဲလ်များ စုပေါင်းပြီး ‘ကိုလိုနီ’၊ ကိုလိုနီများ စုပေါင်းပြီး ‘တစ်ရှူး’၊ တစ်ရှူးများ စုပေါင်းပြီး အင်္ဂါများဖြစ်လာသည်။ အမြစ်၊ အရွက်၊ အပွင့် စသော အင်္ဂါများက အပင်၏ လုပ်ငန်းများကို ကဏ္ဍအလိုက် ခွဲဝေဆောင်ရွက်သည်။ ပြောင်းလဲနေသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီညွတ်စွာ ပေါက်နိုင်ရန် အပင်တို့ကို ဆဲလ်ကွဲပြားရင့်မာခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတို့က ကူညီသည်။

နယူကလိယ

နယူကလိယတွင် အရေးပါသော ဓာတ်မော်လီကျူးတစ်ခု ဖြစ်သည့် ဒီအင်အေနှင့်အာအင်အေ ပါဝင်သည်။ ဒီအင်အေတွင် အပင်အတွက် “ဗီဇ”များ ပါရှိသည်။ ၎င်းမှ သတင်းပို့ခြင်းကို အာအင်အေက ဆိုက်တိုပလာဇမ်သို့ ပို့သည်။ ဆဲလ် လုပ်သင့်သည့် အလုပ်များကို အသိပေးရန် ဖြစ်သည်။



မိုက်တိုခွန်ဒရီးယား

‘ပရိုတိုပလာဇမ်’ အသစ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် စွမ်းအင် လိုအပ်သည်။ ၎င်းစွမ်းအင်ကို ‘မိုက်တိုခွန်ဒရီးယား’ ၏အမြှေးပါးများပေါ်တွင် အစာကို ဓာတ်တိုးခြင်းဖြင့် ထွက်ပေါ်စေသည်။



ကလိုရိုပလတ်များ

‘ကလိုရိုပလတ်’ များ၌ရှိသော အစိမ်း ‘ပစ်ဂမင့်’က နေရောင်ခြည်မှစွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီး ‘ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်’နှင့် ရေကို ပေါင်းစပ်ကာ သကြားပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည် နှစ်ခုကွဲခြင်းဖြင့် ပွားနိုင်သည်။

ကယ်စီတင်းခရိုမိုပလတ်

မုန်လာဥဝါ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ရှောက်မျိုးဝင် အသီးများနှင့် များစွာသောအပွင့်တို့၏ ပွင့်ချပ်များသည် ‘ကယ်စီတင်းခရိုမိုပလတ်’ မှ အရောင်ရရှိသည်။ ၎င်း၏ အရောင်မှာ အဝါမှ အနီအထိ ဖြစ်သည်။




ကစီအဆန်များ

ကစီအဆန်များတွင် ပိုလျှံသောအစာကို သိုလှောင်သည်။ စွမ်းအင်လိုအပ်သော အခါ အဆန်မှ ကစီကို သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းရန် မိုက်တိုခွန်ဒရီးယားသို့ ပို့သည်။

ဆဲလ်နံရံ

ဆဲလ်နံရံသည် ပါးလွှာပြီး အလွှာ များစွာ ပါဝင်သည်။ ၎င်းတွင် အခြားဆဲလ်များနှင့် ပစ္စည်းအလဲအလှယ်ပြုလုပ်ရန် အပေါက်များ ပါသည်။ အပင်နုစဉ်တွင် ပျော့ပျောင်းပြီး အပင် ရင့်လာသည်အခါ ထူထဲမာကျောလာသည်။



ဂေါ်လဂီကိရိယာ

‘ဂေါ်လဂီကိရိယာ’ သည် အဆီနှင့် ပရိုတင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ပြွန်ငယ်အစည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဓာတ်ပစ္စည်းများ သိုလှောင်သည် ဟု ထင်ကြသည်။ ‘အင်ဇိုင်း’များနှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စုဆောင်းသည်။




အင်ဒိုပလတ်စမစ်

ရက်တီကူလမ်

‘အင်ဒိုပလတ်စမစ် ရက်တီကူလမ်’သည် ဆဲလ်လိုအပ်သည့် ဓာတ်ပစ္စည်းများ ဖြတ်သွားသော ပိုက်ကွန်သဖွယ် လမ်းကြောင်းများ ဖြစ်သည်။ အနီရောင်အပြောက်များတွင် အာအင်အေ နှင့် ပရိုတင်းများ ပါဝင်သည်။

လိုက်လျောညီညွတ်ခြင်း

အထူးဖြစ်ပေါ်လာသော ‘ဆဲလ်’ များစုပေါင်းပြီး ‘တစ်ရှူး’နှင့် အင်္ဂါများ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့ဖြင့် အပင်တစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အပင်၏ အင်္ဂါတို့အနက် အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အရွက်များသည် သိမြင်လွယ်သည်။ အချို့ အင်္ဂါများမှာ သိမြင်ရန် ခက်သည်။ အချို့ဆိုလျှင် အထင်မှားနိုင်စရာပင် ရှိသည်။ ဥပမာ-ဘဲစာပင်၏ အောက်မျက်နှာပြင်ရှိ အမျှင်များသည် အမြစ် အစစ်များ မဟုတ်ကြပေ။ သို့သော် အမြစ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင် သည်။



ဘဲစာပင်သည် ကန်လန်ဖြတ် ၁ မီလီမီတာခန့်သာရှိသဖြင့် သေးငယ်သည်။ ၎င်းသည် ထူးကဲသောပင်စည်ဖြစ်ပြီး အမျှင်များက အမြစ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။




အရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ရှိ အမြှေးရောင် အမျှင်များသည် မှိုမျှင်များဖြစ်သည်။ မှိုတို့သည် သက်မဲ့ပစ္စည်းမှ အာဟာရနှင့် ရေကို ယူသည်။

အမြစ်များ

အမြစ်များက အပင်ကို မြေဆီလွှာတွင် ခိုင်မြဲစေပြီး အပင်အာဟာရ ရရှိမှု အတွက်လည်း ဆောင်ရွက်သည်။ အမြစ်မေးက မြေဆီလွှာမှ ရေနှင့်ဓာတ်ဆား များကို စုပ်ယူပြီး တပင်လုံးသို့ ပို့ပေးသည်။

မူလမြစ်ဆိုသည်မှာ အပင်ပေါက်၏ အောက်ဘက်သို့ ဦးဆုံးထွက်လာသော အမြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းမှထပ်ဆင့်မြစ်များ ဘေးအောက်ဘက်သို့ ပြွတ်ထွက်သည်။ ရေသောက်မြစ်သည် မူလမြစ်ဖြစ်ပြီး အခြားအမြစ်အားလုံးထက် ကြီးသည်။ ဝေရွက်ထိပ်ပင်တို့တွင် ပင်စည်၏အခြေမှ တိုက်ရိုက်ထွက်နေသော မူခြားမြစ် ခေါ် ရွယ်တူအမြစ် များစွာရှိသည်။


အဆင့်နိမ့်ပင်တို့တွင် အမြစ်မရှိချေ။ အမြစ်ကဲ့သို့သော အင်္ဂါများက အမြစ်လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်သည်။ အပင်တို့၏ တမူထူးခြားသော ၎င်း အင်္ဂါများကို အမြစ်ဟု လည်း မဆိုနိုင်။ အမြစ်၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာ ရှေးမျိုးဆက်များလည်း မဟုတ်ပေ။ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သီးသန့်လိုအပ် ချက်များကို ဖြည့်စွမ်းရန် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။



ဒေလီယာဥသည် အစာကို ကစီ အသွင်ဖြင့် သိုလှောင်သည်။

လမုပင်၏ မြစ်ပျဉ်း များသည် အထောက် သဖွယ် ဖြစ်စေသည်။

မူခြားမြစ်တို့သည် မြင်းခွာပင်၏ လက္ခဏာ ဖြစ်သည်။




အမြစ်မေးများသည် ရေနှင့် ပျော်ဝင်အာဟာရတို့ကို စုပ်ယူသည်။ ၎င်းအာဟာရ တို့သည် အပင်၏ ကျန်နေရာများသို့ ပျံ့နှံ့စေခြင်း၊ တဘက်စီမံခြင်း အစရှိသည့် ဖြစ်စဉ်များဖြင့် ရောက်ရှိသည်။



‘အေဗီစင်နီယာ မာရီနာ’ သည် ဆားငန်သော ပင်လယ်ကမ်းစပ်၌ညွှန်ရှိ လမုတောထဲ တွင် ပေါက်သည်။ ၎င်း၏ အပေါ်ယံရှိ အလျားလိုက် အမြစ်များမှ လေရှူမြစ်များ ချွံညှန်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ထွက်သည်။



သစ်ကပ်ပိန်းမျိုးပင်၏ တွယ်မြစ်များသည် မြေမျက်နှာပြင်အထက် တွင်ရှိပြီး အစိုဓာတ်ကို မိုးရေမှရယူသည်။



စုထရော်ဗယ်ရီပင်၏ တွားသွားပင်စည်အဆစ်များမှ အောက်ဘက်သို့ အမြစ်များ ထွက်သည်။ ဆင်ကဲမြစ်စဉ်သည် ပင်စည်၏လုပ်ငန်းများကို အပေါ်ပုံအတိုင်း ပြောင်းလဲစေသည်။

ပင်စည်များ

အပွင့်ဆောင်ပင် မျိုးစိတ်များကို ပင်စည်အမျိုးအစားအလိုက် သစ်မာပင်၊ ချုံပင်နှင့် သစ်ပျော့ပင်ဟူ၍ ခွဲခြားသည်။

သစ်မာပင်နှင့် ချုံပင်တို့တွင် သက်တမ်းတလျှောက်လုံးခံသော မာကျောသည့် ပင်စည်များရှိသည်။ သစ်ပျော့ပင်တို့မှာ အသားပျော့သည်။ ရာသီဆိုးချိန်တွင် အပင်၏ မြေပေါ်ပင်စည်ပိုင်းများ ကျသွားပြီး ရာသီကောင်းချိန်တွင် အစိုပြန်ထွက်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအပင်တို့၏ ‘ကွမ်’အတက်၊ ‘ဗပ်’အတက်တို့သည် ထူးကဲသော ပင်စည်များသာ ဖြစ်သည်။

ရစ်ပတ်နွယ်ပင်၊ တွားသွားပင်နှင့် နွယ်ပင်တို့တွင် သေးသွယ်ပျော့ပျောင်းသော ပင်စည်များရှိသည်။ ရစ်ပတ်နွယ်ပင်ဖြစ်သော ပန်းကန်စွန်းနွယ်ပင်သည် အခြားအပင်၏ပင်စည်ကို တင်းကျပ်စွာရစ်ခွေသည်။ နွယ်ပင်ဖြစ်သော တိုက်ကပ်ပင်သည် တွယ်မြစ်များဖြင့် တွယ်တက်သည်။ တွားသွားပင်စည်တို့သည် အမြစ်များဖြင့် ကုပ်တွယ်လျက် တွားသွားသည်။



သစ်ခွပင်၏အမြစ်များသည် အောက်မျက်နှာပြင်ရှိ ဆဲလ်များဖြင့် သစ်ပင်မျက်နှာပြင်ကို ခိုင်မြဲစွာတွယ်ကပ်၏။ သို့သော် သစ်ပင်ကို မထိခိုက်နိုင်ပေ။



ပဲပင်၏ပင်စည်သည် နေရောင်ရှိရာသို့ နွယ်ပတ်ပြီး တက်သည်။



ဗူး၊ ဖရုံပင်စည်တို့၏ နှာမောင်းများက အပင်ကို မှီခိုစရာပေါ်၌ ခိုင်မြဲစွာ ရှိစေသည်။



သစ်မာနွယ်ပင်၏ပင်စည်သည် အခြားပင်စည်ကြီးကို လျော့လျှော့ ရစ်ပတ်သည်။

အရွက်များ

အရွက်သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိကအောင်မြင်မှုများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းက အပင်အတွက် အစာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြင့် အပင်ကို အစာဖြည့်စွမ်းပေးသည်။

အပင်တို့သည် အလင်းရောင်ထဲတွင် 'ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်'ကို ယူပြီး 'အောက်ဆီဂျင်'ကို ထုတ်ရန်အတွက် 'ကလိုရိုဖီး' နှင့် နေရောင်ခြည်မှရယူသော စွမ်းအင်ကို သုံးသည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်ကို အစာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်စဉ်ဟု ခေါ်သည်။


ကလိုရိုဖီးက နေရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူသည်။ ရေသည် 'ဟိုက်ဒရိုဂျင်'နှင့် အောက်ဆီဂျင်အဖြစ် ကွဲသွားသည်။ အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်ပြီး 'အေတပ်' ဖြစ်ပေါ်သည်။

အရွက်သည် လေထဲမှ ရယူသော ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို အစာဖြစ်သော 'ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်' ဖြစ်ပေါင်းများ ဖြစ်စေသည်။ အပင်များသည် အစာဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် တနှစ်လျှင် သကြားတန်ချိန် သန်းတစ်သိန်းငါးသောင်းခန့်

ပြုလုပ်ပြီး ၎င်းပမာဏ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိသော အောက်ဆီဂျင်ကိုလေတွင် ပြန်ပြည့်စေ၏။

သကြားကို အပင်အတွင်း၌ သိုလှောင်ထားသည်။ အပင်ကို စားသုံးသော အခါတွင်လည်းကောင်း၊ လောင်ကျွမ်းစေသော အခါတွင်လည်းကောင်း စွမ်းအင်ကို ရရှိသည်။ အပင်သည် မြေကြီးအောက်တွင် ကျောက်မီးသွေးနှင့် ရေနံအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသောအခါတွင်လည်း သိုလှောင်စွမ်းအင် ရှိသည်။

အရွက်၏ အရေးပါသော အခြားလုပ်ငန်း တခုမှာ ပင်ရေပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းဖြစ်စဉ်က အပင်တွင်းရှိ ရေပမာဏကို ချုပ်ကိုင်သည်။ အရွက်၏ မျက်နှာပြင်တွင် 'စတိုမာ'ခေါ် အပေါက်ငယ် များစွာရှိသည်။ ရေကို အပင်အတွင်းသို့ အမြင်မှေးများက ဆွဲယူသည်။ ရေသည် ပင်စည်တလျှောက် အပေါ်သို့တက်ပြီး အရွက်များအတွင်းသို့ ရောက်သည်။ အစာဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်စဉ်ဖြင့် တပတ်လည်သွားရမည့်အစား ဆဲလ်ကြားကွက်များထဲသို့ အငွေ့ပြန်ဝင်ပြီး



အပင်အတွက် အစာဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် အရွက်ကို တည်ဆောက်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ရွက်ကြောများက အရွက်ကို ပြန့်ကားစေပြီး နေရောင်ရစေသည်။ အရွက်၏အပေါ်ဆုံး အလွှာတွင် 'ကလိုရိုပလတ်' များ ရှိသော 'ပယ်လီဆိတ်' ဆဲလ်များ ပါဝင်သည်။ အရွက်အောက် မျက်နှာပြင်ရှိ စတိုမာများကိုဖြတ်၍ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဝင်လာပြီး အစာဖွဲ့စည်းရန် အလယ်ပိုင်းရှိ ဆဲလ်များမှတစ်ဆင့် ပယ်လီဆိတ်အလွှာသို့ ရောက်ရှိသည်။ ခြောက်သွေ့တော့မည့် အရွက်တွင် ကလိုရိုဖီးများ ပျက်စီးသောကြောင့် အဝါနှင့်အနီ 'ပစ်ဂမင့်' များ ပေါ်လာသည်။



ပင်ပိုင်းမျိုးပွားနိုင်သော 'အာဖရိက ဗိုင်အိုလက်' ပင်၏ အရွက်တွင် တပင်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မီဇေမိုဂျီယမြင့် ခူးချထားလိုက်လျှင် အမြစ်များ ထွက်ပြီး အပင်သစ် ပေါက်နိုင်သည်။




အရွက်များ၏ အရောင်သည် အစိမ်းရောင် တမျိုးတည်းသာ မဟုတ်ကြောင်း ဤ နှင်းဆီရွက် ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။

စတိုမာကိုဖြတ်၍ လေထုထဲသို့ ထွက်သွားသည်။ ခြောက်သွေ့ချိန်တွင် စတိုမာများပိတ်ပြီး အပင်အတွင်းရှိ ရေပမာဏကို လိုအပ်သလိုထိန်းပေးသောကြောင့် အပင်များရှင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင် ‘စတိုမာ’တို့သည် အပင်အတွက် အစာမွှေစည်းရာတွင် အသုံးပြုရန် လေထဲမှ ‘ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်’ ကို စုပ်ယူပေးသည်။

အရွက်ပုံသဏ္ဌာန် အမျိုးမျိုးရှိသည်။ အရွက်တရွက်တွင် ကျယ်ပြန့်သော ရွက်ပြားနှင့် သေးသွယ်သော ရိုးတံရှိသည်။ ရွက်ပြားတချပ်တည်းဖြစ်လျှင် ရွက်ထီး၊ ရွက်မြွှာများအဖြစ် ကွဲနေလျှင် ရွက်ပေါင်း၊ ရွက်မြွှာများ ငှက်မွေးပုံတည်ရှိလျှင် ငှက်မွေးရွက်ပေါင်း၊ လက်ချောင်းပြာသကဲ့သို့တည်ရှိလျှင် လက်ဝါးရွက်ပေါင်းဟု ခေါ်သည်။

အရွက်များတည်ရှိပုံ အနေအထား အမျိုးမျိုးရှိသည်။ တရွက်ချင်းတည်ရှိလျှင် ရွက်လွှဲ၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်လျှင် ရွက်ဆိုင်၊ ပင်စည်တနေရာ၌ ဘေးပတ်လည် ဝိုင်းထွက်နေလျှင် စက်ဝိုင်းပတ်ဟုခေါ်သည်။



ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် အရွက်၏လုပ်ငန်းအချို့ကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ အစာသိုလှောင်သည့်ကြက်သွန်နီ ရွက်ဖတ်၊ နွယ်တက်သည့် ပဲပင်နှာမောင်း၊ ကာကွယ်သည့် ရှားစောင်းဆူး၊ အစာဖမ်းပူမောင်းရွက်နှင့် ရေတကောင်းရွက်တို့ ဖြစ်သည်။




အရွက်တည်ပုံသုံးမျိုး။ စက်ဝိုင်းပတ် (ဝဲ)၊ ရွက်ဆိုင် (အလယ်)၊ ရွက်လွှဲ (ယာ)



‘ပန်း’ပင် ၏ ‘ပရွန်း’ အောက်မျက်နှာပြင်တွင် မျိုးပွားသော ‘စပိုး’ များရှိသည်။




၇၀×၁ မီလီမီတာသာရှိသော အပွင့်ထင်းရှူးရွက်သည်လည်း အခြားအရွက်များကဲ့သို့ပင် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။



အရွက်တို့တွင် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အရွယ် အမျိုးမျိုးရှိသည်။

ဈေးဦးအပင်များ

ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများအနက် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပြီး အသွင်ထူးခြားသော ‘အာချီဗက်တီးရီးယား’ များကို မကြာမီကမှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ‘အောက်ဆီဂျင်’ မရှိမီကပင် တည်ရှိခဲ့သဖြင့် အောက်ဆီဂျင်နှင့်တွေ့ထိလျှင် သေသည်။ သဲလွန်စများမှာ မကြာမီက တွေ့ရှိခဲ့သော အဏုကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း သန်းသုံးထောင်ငါးရာက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးစိမ်းပြာ ‘အယ်လဂျီ’ တို့၏အောက်ဆီဂျင်ထုတ်လွှတ်သော ရှေးမျိုးဆက်များဟု ယုံကြည်ကြသည်။



တုတ်ချောင်းပုံ မေးခိုင်ရောဂါ ‘ဗက်တီးရီးယား’ များသည် အောက်ဆီဂျင်မရှိသောနေရာ၌သာ ရှင်သန်နိုင်သည်။ အောက်ဆီဂျင်ရှိသောအခါ အကာအကွယ်ဖြစ်စေရန် ဘင်တီးသောတုတ်ပုံ ‘စပိုး’ များ ဖြစ်လာသည်။ အနာအတွင်းသို့ ၎င်းတို့ ဝင်ရောက်လျှင် မေးခိုင်ရောဂါ ဖြစ်တတ်သည်။


ဗက်တီးရီးယားများ

အလွန်သေးငယ်ပြီး အများအားဖြင့် ၁/၁၀၀၀ မီလီမီတာခန့်သာ အရွယ်ရှိသောဗက်တီးရီးယားများသည် အပင်ဖြစ်သည်။ ဗက်တီးရီးယားတွင် ‘ဆဲလ်’ တစ်ခုသာပါဝင်ပြီး ထက်ခြမ်းကွဲခြင်းဖြင့် မျိုးပွားသည်။ ဆဲလ်တစ်ခုသည် နာရီဝက်တကြိမ် ပွားနိုင်သည်။ တိဘီရောဂါ၊ တိုက်ဖွိုက်အများရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရမ်းနာနှင့် မေးခိုင်ရောဂါများသည် ဗက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများတွင် ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း အကျိုးပြုသောဗက်တီးရီးယားလည်း ရှိသည်။ သေသော ‘တစ်ရှူး’ များကို ဖြိုခွဲပြီး အခြားသက်ရှိများအသုံးပြုရန် အာဟာရအဖြစ် ထုတ်လွှတ်ပေးသည်။ နိုက်ထရိုဂျင်တိုး ဗက်တီးရီးယားများသည် လေထုထဲရှိ ‘နိုက်ထရိုဂျင်’ ကို နိုက်ထရိုဂျင်ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် ပြောင်းနိုင်သည်။




ဗိုင်းရပ်များ

‘ဗိုင်းရပ်’ များသည် ပရိုတင်းဖုံးအုပ်လျက်ရှိသော ‘နယူကလီအစ်အက်ဆစ်’ အနှစ်များ ဖြစ်သည်။ ‘အိုလက်ထရွန်မိုက်ခရိုစကုပ်’ ဖြင့် ကြည့်မှသာ မြင်နိုင်သည်။ သက်ရှိလက္ခဏာများရှိပြီး အသက်ရှင်သော ဆဲလ်အတွင်း၌သာ ပွားနိုင်သည်။ ‘အင်းဆက်’ ပိုးများဖြင့် ပျံ့နှံ့သည်။ ဗိုင်းရပ်များသည် ဗက်တီးရီးယား၊ အပင်ကြီး၊ လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကို ရောဂါဖြစ်စေပြီး သေစေသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အချိန်ကြာသောအခါ အပင်များတွင် ဗိုင်းရပ်ရောဂါများကိုကာကွယ်ရန် မျိုးရိုးလိုက်သော ခံနိုင်ရည်များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။




‘တီ-၂ ဗက်တီရီယိုဖေ့’ သည် ဗက်တီးရီးယားကို ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားစေသော ဗိုင်းရပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အပျဉ်းပျဉ်းပုံ နယူကလီအစ်အက်ဆစ်ဖြစ်ပြီး ဖားလောင်းပုံ ပရိုတင်းဖုံး အုပ်လျက်ရှိသည်။ ဤပုံများသည် ကူးစက်ပြန့်ပွားပုံအဆင့်ဆင့်ကို ပြသည်။



လက်ဝဲဘက်ရှိ ကျောက်ကျောခွက်တွင် သွေးနီဥများ ပါဝင်သည်။ ဗက်တီးရီးယား တပင်မှ သန်းပေါင်းများစွာ ပွားပြီး ဝိုင်းစက်သည့် အမြွေပျော့ရောင် ‘ကိုလိုနီ’ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ကိုလိုနီပတ်လည်ရှိ အရောင်ပျော့သော နေရာများသည် ဗက်တီးရီးယားများက ဖျက်ဆီးထားခြင်းကို ဖော်ပြသည်။ အထက်ပါ စမ်းသပ်နည်းဖြင့် လည်ချောင်းနာနှင့် အနာယဉ်းခြင်းကို ဖြစ်စေသည့် ရောဂါပိုးဖြစ်သော ‘စထရက်ပတိုကော့ကတ် ဟေမိုလိုက်တီကတ်’ ကို ခွဲခြားသိနိုင်၏။

လက်ယာဘက်ရှိ ကျောက်ကျောခွက်ထဲတွင် အနာ စိမ်း ပေါက်စေသော ‘စတက်ဖိုလိုကော့ကတ်’ ကိုလိုနီများ ရှိသည်။ ကျောက်ကျောပေါ်ရှိ စက္ကူဖြတ်စ အဝိုင်းတခုစီပေါ်တွင် ပဋိဇီဝဆေး တမျိုးစီ တင်ထားသည်။ အပေါ်ဘက်စက္ကူဖြတ်စပေါ်ရှိဆေးသည် ဗက်တီးရီးယားကို မပွားအောင် တားနိုင်သဖြင့်ရင်း၏ဘေးပတ်လည်တွင် ကြည်လင်နေသည်။ အခြားဆေးကမူမတားနိုင်ပေ။ ဤစမ်းသပ်ချက်ဖြင့် ရောဂါအတွက်သုံးရမည့်ဆေးကို သိနိုင်သည်။

သံဗက်တီးရီးယားသည် ရေထဲတွင် နီညိုရောင်အကျါအချို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းတို့သည် ‘ဖဲရတ်’ သံဓာတ်ဆားများကို ဓာတ်တိုးစေခြင်းဖြင့် ဓွမ်းအင်ရသည်။




စိမ်းပြာအယ်လဂျီနှင့် ရွှေရောင်အယ်လဂျီ

စိမ်းပြာအယ်လဂျီများသည် အရိုးဆုံးအရှင်းဆုံးဖြစ်ပြီး သေးငယ်သည်။ အမျှင်တန်း၊ ဆဲလ်တခုတည်း သို့မဟုတ် 'ကိုလိုနီ' ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် ရေချိုတွင် တွေ့နိုင်ပြီး ရေငန်၊ ရေပူစမ်း၊ သစ်ခေါက်နှင့် စိုစွတ်သော ကျောက်ဆောင်တို့တွင်လည်း တွေ့နိုင်သည်။ ကလိုရိုဖီးဖြင့် အစာဖွဲ့စည်းသော ပထမဦးဆုံး အပင်များတွင် ပါဝင်သည်။

ကလိုရိုဖီး နှင့် အပြာပစ်ဂမဉ်ကြောင့် ထင်ရှားသော အရောင်များရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ စိမ်းပြာအယ်လဂျီများသည် လေထဲရှိ 'နိုက်ထရိုဂျင်' ကို အပင်အတွက် အစာအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးသော လယ်ကွင်းများကို မြေဩဇာကောင်းစေသည်။ အချို့မျိုးစိတ်များသည် အောက်ဆီဂျင်နည်းသော ရေထဲတွင် စုပေါက်သဖြင့် ရေကန်များနှင့် ပေါ်တွင် အစိမ်းရင့်ရောင် အမြှုပ်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရေထုညစ်ညမ်းခြင်းကို သိနိုင်သည်။


ရွှေရောင်အယ်လဂျီသည် ရွှေညိုရောင်ဖြစ်ပြီး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး အချို့မှာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် အခြားအပင်များထက် အဆင့်မြင့်သည်ဟု ထင်ရသည်။



ဒိုင်အာတမ်များနှင့် ဒိုင်နိုဖလက်ဂျယ်လိတ်များ

သေးငယ်သော 'ဒိုင်အာတမ်' များသည် ဆဲလ်တခုတည်းဖြစ်ပြီး ရေချို၊ ရေငန်နှင့် စိုစွတ်သောမြေတွင် ပေါက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သဘာဝအစာကွင်းဆက်ဖြစ်ပေါ်ပုံကို ပြ၏။ ရေပေါ်တွင် မျောနေသော ရေမျောသက်ရှိများ၏ အဓိကအုပ်စု ဖြစ်သည်။ ဝေလငါးနှင့် 'ဟဲရင်း' ငါးများ၏ အစာဖြစ်သည်။ ဒိုင်အာတမ်အခွံ နှစ်ခြမ်းသည် ကွမ်းအင်အဖုံးနှင့် ကိုယ်ထည်ကဲ့သို့ အဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းတို့၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် ဒိုင်အာတမ်မြေ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းမြေကို ရေစစ်ကဲ့သို့ စစ်သည့်အရာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယမ်းဘိလူးပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း သုံးသည်။

'ဒိုင်နိုဖလက်ဂျယ်လိတ်' များသည် ပင်လယ်ပြင်တွင် မီးစုန်းရောင်တောက်စေသည့်အပြင် အဆိပ်ထုတ်လွှတ်သော "ဒီရေနီ" ကို ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် ငါးများ၊ ကမာများနှင့် ပင်လယ်တွင်းရှိ သက်ရှိများကို ပျက်စီးစေသည်။ ဒိုင်နိုဖလက်ဂျယ်လိတ်များသည် အများအားဖြင့် ဆဲလ်တခုတည်းဖြစ်ပြီး အညို 'ပစ်ဂမဉ်' နှင့် 'ကလိုရိုဖီး' ပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အပင်များဖြစ်သော်လည်း အလင်းရောင်ကို တုံ့ပြန်နိုင်သောမျက်လုံးရာပါနိုင်ပြီး ကျာပွတ်မွေး၏ လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ရေတွင် သွားလာနိုင်သည်။



မိုးစွဲမရှိသောအပင်များ

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း သန်းသုံးထောင်အတွင်းက ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သော အပင်မျိုးစိတ်အရေအတွက်သည် မျက်မှောက်ခေတ်ရှိ အပင်မျိုးစိတ်အရေအတွက်ထက် ပိုများသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများနှင့် ယခုထက်တိုင်ရှိသော အပင်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အကြောင်း သိရှိရသည်။ အချို့အပင်များမှာ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ မပြောင်းလဲပဲရှိသည်။

ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ပြီး အပွင့်မပွင့်သော အပင်များကို မျိုးစေ့မရှိသောအပင်များဟုခေါ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် 'ဗက်တီးရီးယား'၊ မှို၊ 'အယ်လဂျီ'၊ ရေညှိနှင့် 'မန်း' ပင်တို့ပါဝင်သည်။

ပင်လယ်ရေမျှော်ဖျား

အယ်လဂျီ

အယ်လဂျီများသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် ပင်လယ်မှ ကုန်းပေါ်သို့တက်လာသော ရှေးအကျဆုံး သက်ရှိများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် 'မိုက်ခရိုဓကုပ်' ဖြင့် ကြည့်မှ မြင်နိုင်သည့် အလွန်သေးငယ်သော အယ်လဂျီမှ မီတာ ၂၀၀ အထိ ရှည်သော ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်ကြီးအထိ အရွယ်အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်သည်။

၎င်းတို့တွင် အမြစ်၊ ပင်စည်၊ အရွက်မရှိချေ။ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် မျိုးပွားသည်။ အယ်လဂျီအားလုံး တူညီသည့်အချက်မှာ ‘ကလိရိုပီး’ ပါရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မွေးမြူနိုင်သောအလင်းရောင်သာရှိသည့် ပင်လယ်အောက်တွင် အပင်အတွက် အစာပွဲစည်းနိုင်သည်။ အစိမ်းရောင်အယ်လဂျီအပြင် အနီ၊ အညို၊ စိမ်းပြာအယ်လဂျီများလည်း ရှိသည်။ အခြား ‘ပစ်ကမင့်’ များ၏ အောက်တွင် အစိမ်းရောင်ကလိရိုပီး ရှိသည်။

ပင်လယ်ရေမျှော်မျှား

၎င်းတို့သည် အကြီးဆုံးအယ်လဂျီများဖြစ်သည်။ အမြစ်မရှိသော်လည်းခြေကုပ်
ခေါ် အင်္ဂါများဖြင့် ကုပ်တွယ်နိုင်သည်။ သမပိုင်းဒေသရှိရေထဲတွင် အများဆုံး
ပေါက်ပြီး ဒီရေအမြင့်ဆုံးအမှတ်အထိတက်သည့် ရေမျက်နှာပြင်မှ လုံလောက်
သော အလင်းရောင် ရရှိနိုင်သည့် ရေမျက်နှာပြင်အောက်အထိ ပေါက်နိုင်သည်။
မျိုးစိတ်တမျိုးစီသည် သတ်မှတ်ထားသော ရေအတိမ်အနက်တွင် သီးသန့်
ပေါက်သည်။


ပင်လယ်ရေမျှော်မှ ‘အိုင်အိဒင်’နှင့် ကျောက်ကျောရရှိသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ၎င်းတို့ကို ဟင်းရွက်ကဲ့သို့ပင် စားသည်။

အယ်လဂျီအသုံးဝင်ပုံ

အယ်လဂျီများသည် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တို့၏ အစားအစာဖြစ်သည်။ အနီရောင် အယ်လဂျီမှ ရရှိသော ကျောက်ကျောကို ဘီယာ သန့်စင်စေရန် ပစ္စည်းနှင့် ဝမ်းပျော့ဆေးအဖြစ်သုံးသည်။ အညိုရောင်ပင်လယ်ရေမှော်မှ ထုတ်ယူသော ‘အယ်လဂျီနစ်အက်ဆစ်’ကို ရာဘာပြုပြင်ရာတွင်သာမက ရေခဲမုန့်ပြုလုပ်ရာတွင် လည်း သုံးသည်။ ထို့ကြောင့် အယ်လဂျီများသည် အမျိုးမျိုး အသုံးဝင်သည်။



အနီရောင်အယ်လဂျီ ရှိမိနိယာ ပေါ်လီနီတာ၊ ‘ခွန်ဒရတ် ခရစ်စပတ်’နှင့် အညိုရောင် အယ်လဂျီ ‘ဗလတ်ဒါရက်’၊ ပြာထွက်နေသော ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်ကြီးတို့ ဖြစ်သည်။



အယ်လဂျီမပျိုးပွားခြင်း

အယ်လဂျီများပွားပုံ အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သေးငယ်ပြီး ‘ဆဲလ်’ တခုတည်းရှိသော စိမ်းပြာအယ်လဂျီများသည် နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းဖြင့် မျိုးပွားသည်။ မျိုးဆက်နှစ်ဆက် ရှိသောဖြစ်စဉ်ကို အညှီရောင်အယ်လဂျီမျိုးစိတ် များစွာထိတိုင် တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ‘စပိုး’ များဖြင့် မျိုးပွားသည်။ စပိုးသည် အကာ တစ်ရှူးဖြင့် ဝန်းရံ လျက်ရှိသော ဆဲလ်ငယ်ဖြစ်သည်။

အစိမ်းရောင်အယ်လဂျီ

အစိမ်းရောင်အယ်လဂျီများ၌ ကလိုရိုဖီးရိုသည့် အစိမ်းရောင်‘ကလိုရိုပလတ်’ပါရှိသည်။ အများစုသည် ရေချိုတွင်ပေါက်သည်။ အစိုဓာတ်နှင့် နေရောင်ခြည်ရနိုင်သော နေရာတိုင်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။ အယ်လဂျီမျိုးစိတ် အများစုသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ်ပြီး ဆဲလ်တခုတည်းဖြစ်သော်လည်း အချို့မျိုးစိတ်များသည် ဆဲလ်အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။



‘လူသေလက်ချောင်းများ’ ခေါ်
အစိမ်းရောင်ပင်လယ်ရေမွှေ့များ (ဝဲ) ၊ ‘အင်ထရိုမော့မာ ကွန်ပရက်ဆာ’ (အလယ်) ၊
စားကောင်းသော ‘ပင်လယ်ဆလတ်’ (ယာ)



‘ရေသူမ ဝိုင်ဖန်ခွက်’ ခေါ် ပင်လယ်ရေမှော်သည် ကမ်းခြေရှိ ကျောက်တုံးများပေါ်၌ ပေါက်သည်။

အနီရောင်အယ်လဂျီ

အနီရောင် 'အယ်လဂျီ' များသည် အဆင့်မြင့်ဆုံးပင်လယ်ရေမှော် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဖဲပြားပုံ သို့မဟုတ် ပန်းကန်ပြားပုံရှိပြီး အညိုရောင်ပင်လယ်ရေမှော် များပေါက်သောနေရာထက် ရေပိုနက်ပြီး ပို၍ပူနွေးသော ပင်လယ်ပြင်တွင် ပေါက်သည်။ အများစုသည် ဆဲလ်အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး တနေရာ တည်းတွင် ကုပ်တွယ်၍ပေါက်လေ့ရှိသည်။ မျိုးစိတ်အများစုမှကျောက်ကျော ရရှိသည်။



ဒီ ရေ ရှိသော ဖြစ် ဝ များ တွင် တွေ့ ရသည့် အညိုရောင် နှင့် အနက်ရောင် ရှိသော 'ဗင်ဂျီယာ အာထရိုပါယူရီယာ' (ဝဲ)၊ ကျောက်ကျောရသည့် 'ဂျီလီဒီယမ် ကာတီလေဂျီနီယမ်' (ယာ)




အာရှအရှေ့ပိုင်း ကျောက်ဆောင်များတွင် ပေါက်သည့် 'ခွန် ခရတ် အော်စီလေးတတ်' (ဝဲ) ကို ကော်ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည်။ 'ပေါ်ဖီရာ တီနီရာ ကီဂျယ်လမ်' (ယာ) သည် ကျောက်တုံးများပေါ်တွင် အချပ်လိုက် ပေါက်သည်။



ကျောက်ကျောရသည့် 'ယူချီယူမာ ဂရာစီလစ်' ကို အင်ဒို-ပစိဖိတ်ဒေသရှိ သန္တာပင်လယ်များ၏ ရေတိမ်ပိုင်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။

အညိုရောင်အယ်လဂျီ

အညိုရောင်အယ်လဂျီသည် အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေတိုင်း လိုလိုတွင်တွေ့နိုင်ပြီး အေး၍ တိမ်သောရေတွင် ပို၍ပေါများသည်။ ဆဲလ် အများအပြားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပေါလောပျောနေသည်ထက် အများ အားဖြင့် တခုခုကို ကုပ်တွယ်၍နေသည်။ ၎င်းအရည်အချင်းသည် ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသော ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။ အယ်လဂျီများသည် တနေရာ တည်းတွင် ကုပ်တွယ် ပေါက်နေခြင်းဖြင့် တည်ငြိမ်သော ပတ်ဝန်းကျင်၌ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။



အညိုရောင်အယ်လဂျီ 'ဖျူးကတ် အီဗင်နေစင်' (ဝဲ) သည် ကျောက်တုံးများ ပေါ်တွင် ပေါက်သည်။ 'ရေသူမယပ်တောင်' ခေါ် အညိုရောင် ရေမှော် (ယာ) သည် နွေးသောပင်လယ်တို့၏ ရေတိမ်ပိုင်းတွင် ပေါက်သည်။



စားကောင်းသော 'လာမီနေးရီးယား ဂျပ္ပန်နီကာ' (ဝဲ) သည် လေးမီတာ အထိရှည်သည်။ 'လွန်းပုံအိတ်အရွက်' (အလယ်) နှင့် 'ပင်လယ်ကွေ့ပေါင်းပင်' (ယာ) ဖြစ်သည်။



စပျစ်သီးနှင့်တူသည့် စားကောင်းသော အိမ်ရောင်အယ်လဂျီ 'ကော်လာပါ ရေစိမ့်ဆာ' သည် သန္တာကျောက်တန်းများပေါ်၌ ပေါက်သည်။

မှိုများ

ပေါင်မုန့်ကို ကြာကြာထားလျှင် မီးခိုးရောင်မှိုနုများ ပေါက်လာမည်။ ထိုမှိုသည် ‘ဖန်းဂတ်’ခေါ် အပင်ဖြစ်ပြီး တောတွင်း၌ ပေါက်သော အဆိပ်ရှိမှိုနှင့် တမျိုးတစားတည်း ဖြစ်သည်။

မှိုမျိုးစိတ်ပေါင်း ၃၅၀၀၀ ရှိရာ ပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည့် တဆေးပင်မှ အစ ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည့် မှိုပွင့်ကြီးများအထိ ပါဝင်သည်။ မှိုများတွင် အပင်အတွက် အစာ ဖွဲ့စည်းသည့် ‘ကလိုရိုဖီး’ မပါရှိချေ။ ထို့ကြောင့် အပင် သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်များပေါ်တွင် ကပ်ပါးပင် အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဆွေးမြည့်သော သက်မဲ့ အရာဝတ္ထုအပေါ်တွင် အဆွေးစားပင် အဖြစ်သော်လည်းကောင်း ပေါက်ပြီးလျှင် အာဟာရများကို ရယူသည်။

မှိုများသည် ဆံချည်မျှင်ကဲ့သို့သော မှိုမျှင်စုဖြစ်သည်။ မှိုမျှင်သည် မှိုပင်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး မြေတွင်း၌ ရှိသည်။ မှိုပွင့်မှာ မျိုးပွားသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။ မှိုများသည် အာဟာရ ရယူရန်အတွက် သက်ရှိအတွင်းသို့ အသေးငယ်ဆုံးသော အပေါက်မှပင် ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မှိုတို့သည် ရောဂါကိုဖြစ်စေသည်။


မှိုများသည် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ပြုလုပ်သည်။ သက်မဲ့အော်ဂဲနစ် ဒြပ်များကို အခြားအပင်များ သုံးစွဲနိုင်သော ဓာတုပစ္စည်းများအဖြစ် ပြုခွဲရန် ကူညီသည်။ အချို့မှိုမျိုးမှ ‘ပင်နီဆီလင်’ နှင့် ‘အော်ရီယိုမိုင်ဆင်’ ကဲ့သို့သော ပဋိဇီဝဆေး များ၊ ‘ဆစ်ထရစ်အက်ဆစ်’ နှင့် ဗီတာမင်များ ရရှိသည်။ တဆေးပင်များသည် အမျိုးမျိုးအသုံးဝင်သည်။




အဆစ်ကဲ့သို့စပိုးအိတ်ရှိသော အဆင့်နိမ့်မှိုမျိုးပြား တမျိုးဖြစ်သည့် ပေါင်မုန့်မှိုနက် (ဝ) ဖြစ်သည်။ ‘ဆက်ပရိုလက်ဂနီယာ မိုနိုက်ကာ’ (ယာ) သည် အလှမွေးငါးများကို ရောဂါဖြစ်စေသည်။

အဆင့်နိမ့်မှိုများ

အဆင့်နိမ့်မှိုများသည် မှိုများအနက် ရှေးအကျဆုံးဖြစ်ပြီး သာမန်မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ချေ။ သိုးနေသော ကစီအစာတွင် ပေါက်သည့် ပေါင်မုန့်မှိုနက်များပါ ဝင်သည်။ အဆင့်နိမ့်မှိုများသည် ရေ သို့မဟုတ် ခြောက်သွေ့သော ကုန်းပေါ်တွင် ပေါက်သည်။ ရေနေမျိုးစိတ်တို့တွင် ရွှေ့လျားနိုင်သော အဖိုစပမ်းရှိသည်။ ကုန်းနေမျိုးစိတ်တို့သည် ‘ကွန်ဂျူဂေးရှင်း’ ခေါ် ဖြစ်စဉ်ဖြင့် မျိုးပွားသည်။




အရွှေ့တောင်အာရှရှိ ‘အင်ဒိုဒါမိုဖိုက်တွန် ကွန်ဆင်ထရီကမ်’မှိုသည် လူ၏ အရေပြားပေါ်တွင် ပွေးကွက်များဖြစ်စေသည်။



တဆေးဆဲလ်တွင် ‘နယူကလီယ’ ကဲ့သို့ နောက် အပိုနယူကလီယသည် အဖူးတွင်းသို့ ရွှေ့သွားသည်။ ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ပြတ်ထွက်သွားသည်။

အိတ်မှိုများ

မှိုအမျိုးမျိုးနှင့် တဆေးပင်များသည် အများအားဖြင့် ကုန်းပေါ်တွင် ပေါက်သည်။ ဆဲလ်တခုတည်းဖြစ်သော တဆေးပင်တွင် ပရိုတင်းနှင့် ဗီတာမင်များပါ ဝင်သည်။ ‘အောက်ဆီဂျင်’ မရှိသောအခါတွင် ၎င်းသည် သကြားကို ‘အယ်လ်ကိုဟော’ နှင့် ‘ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်’ အဖြစ်သို့ ပြိုခွဲပေးသည်။ မုန့်ညက်ကို ပွစေသည်။ အိတ်မှိုအများစုသည် ဆဲလ်များစွာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ‘စပိုး’ဖြင့် မျိုးပွားသည်။



‘အက်စပါဂျီလတ် အိုရိုင်ဇေ’ ခေါ် အိတ်မှိုတမျိုးကို တရုတ်ဝိုင်အရက်နှင့် ပဲငုပ်၊ ပဲငံပြာရည် ပြုလုပ်ရာတွင် သုံး၏။

အရသာထူးသည် ‘မော်ရယ်မှို’ (ဝ)၊ ‘ပင်နီဆီလီယမ်’ စပိုးအိတ် (ယာ)

ပင်နီဆီလီယမ်သည် ပေါင်မုန့် အစိပေါ်တွင် ပေါက်သည်။ ၎င်းကို ၁၉၂၉ ခုတွင် စတင်တွေ့ရှိပြီး ၁၉၄၁ ခုမှစ၍ အသုံးပြုသော ပင်နီဆီလင်ဆေးရရှိသည့် ပင်ရင်းဖြစ်သည်။




ခွက်ပုံ ‘အက်စကိုကပ်’ ပါရှိသော ‘ပဇိုက်ဇာ’ မျိုးစုတွင် မျိုးစိတ် ၅၀ ခန့် ပါဝင်သည်။ နွေရာသီတွင် သစ်ဆွေးပေါ်၌ ပေါက်သည်။

တင်းပုတ်မှိုနှင့် အဆိပ်ရှိမှို

တင်းပုတ်မှိုအုပ်စုတွင် အလေ့ကျပေါက်မှို၊ စားသုံးမှိုနှင့် အဆိပ်ရှိမှိုများ ပါဝင်သည်။ ‘ဗက်ဆီဒီယိုစပိုး’ များဖြင့် မျိုးပွားသည်။ စားသုံးမှိုနှင့်အဆိပ်ရှိမှိုတို့သည် ‘ဗက်ဆီဒီယိုကပ်’ များဖြစ်သည်။ ချောမွတ်၍ ထိပ်ပိုင်း၏အောက်ဘက်တွင် ပါးဟက်ခေါ် အမြွေးပါး များစွာရှိသည်။ ပါးဟက်များပေါ်တွင် ‘ဗက်ဆီဒီယမ်’ များ ဖြစ်ပေါ်သည်။ တင်းပုတ်မှိုများသည် အစာစုပ်ယူနိုင်သော မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် ဆွေးမြည့်သော အပင်၊ အရွက်နှင့် ပင်စည်များပေါ်တွင် ပေါက်သည်။

အလေ့ကျပေါက်သော မှိုပွင့်အများစုမှာ အရသာအလွန်ထူးသည်။ သို့သော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများသာ အဆိပ်ရှိ မရှိ သိနိုင်သည်။ အဆိပ်ရှိမှိုများသည် အဆိပ်ပြင်းလွန်းသဖြင့် သေစေနိုင်သည်။


‘အားဂေါ့’ မှိုစွဲကပ်နေသော ကောက် မျိုး များကို စားမိ သည့် အခါ တွင် ဖြစ်သော “စိန့်အန်သိုနီဇမ်” ရောဂါသည် လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုသေစေသည်။ ယခုအခါတွင် အစိုးတန်သောဆေးကို အားဂေါ့မှိုမှ ထုတ်ယူသည်။



ထင်းရှူးတောတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသော ‘အာမီလေးရီးယား အီဒီဒန်’ ၌မှိုပွင့်ငယ်စဉ် အပြင်ကဖုံးအုပ်ထားသော အမြွေးဖုံးသည် စုတ်ပြွတ်သွား၍ မှိုပွင့် ကြီးလာသောအခါ အောက်ပိုင်းထက်ဝက်သည် မှိုအောက်ခြေခွက်အဖြစ်ကျန်ခဲ့ပြီး အပေါ်ပိုင်းထက်ဝက်သည် ပါးဟက်များကို ဖုံးလျက်ရှိသည်။ မှိုပွင့် ရင့်လာသောအခါ ပါးဟက်ဖုံးအမြွေးပါးစုတ်ပြီး ခြေချင်း ဖြစ်လာသည်။



မြောက်သမပိုင်းသစ်တောရှိ အရသာရှိသော ‘ဗိုလီတတ် အီဒူလစ်’ ဖြစ်သည်။



ပါးဟက်များမှ ‘စပိုး’ များ လွတ်ထွက်သောအခါ ပင်ကူအိမ်ကဲ့သို့ မှိုမျှင် စုဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းမှိုမျှင်စုများမှ မျိုးပွားနိုင်သည့် စပိုးများပါရှိသော မှိုပွင့်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာသည်။

မှိုပွင့်ဇီဝစက်

မှိုပွင့်သည် စပိုးဖြင့် မျိုးပွားသည်။ စပိုးနှစ်မျိုးသည် ဆင်တူဖြစ်နေသောကြောင့် အဖိုနှင့် အမကျွဲ မခွဲခြားနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် အပေါင်း-စပိုးနှင့် အနုတ်-စပိုး ဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတို့ မြေကြီးထဲတွင် တသီးတခြားစီ ပေါက်လာသော အခါ ဆဲလ်များစွာပါဝင်သော မှိုမျှင်များဖြစ်ပေါ်သည်။

၎င်းတို့ရှည်ထွက်လာသောအခါ အပေါင်း-စပိုး၏မှိုမျှင်သည် အနုတ်-စပိုး၏ မှိုမျှင်နှင့် ထိတွေ့ပူးပေါင်းပြီး အပေါင်း-အနုတ်မှိုမျှင်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းမှိုမျှင်မှ စပိုးဆောင်သော မှိုပွင့်၏ရိုးတံနှင့် ထိရောက်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ထိုအချိန်၌ပင် စပိုးအသစ်နှစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်လာပြန်သည်။ ပေါ့ပါးသောစပိုးများသည် ပါးဟက်မှ လွတ်ထွက်သောအခါ နေရာအနှံ့အပြားတွင် ကျရောက်သည်။ သင့်လျော်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဇီဝစက် တဖန်စ၍ လည်ပြန်သည်။



လက်ဝဲဘက်တွင် အရွှေအာရှရှိ သစ်တုံးမှ နုတ်ယူထားသော ‘ကော်တီနယ်လတ်’ ရှိအိုင်တာကေ’သည် အလွန်အရသာထူးသည်။ တရုတ်လူမျိုးများ စားသုံးသည်။ လက်ယာဘက်ရှိ ‘မရုဏဦးထုပ်’ မှိုသည် အလွန်အဆိပ်ပြင်းသည်။ စားကောင်းသော မှိုနှင့် မှားတတ်သောကြောင့် ရိုးတံခြေရှိ ခွက်ဖြင့် ခွဲခြားသိနိုင်သည်။



‘ဆယ်လီယိုတာ ကင်ပက်စထရစ်’ သည် မြက်ခင်းများပေါ်တွင် အကွင်းလိုက် အလေ့ကျပေါက်သည်။ စိုက်ပျိုးယူ၍လည်း ရနိုင်သည်။



‘ယင်ကောင်မို့’သည်အေးသည့်မြောက်ပိုင်းသစ်တောအတွင်းပေါက်သော အရောင် တောက်ပသည့် မို့မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါရှိသော ‘မတ်စကာရင်’ အဆိပ်သည် စိတ်ချောက်ချားစေရုံသာမက သေစေနိုင်သည်။

လိုင်ကင်များ


အေးလွန်းသဖြင့် အခြားအပင်များမပေါက်နိုင်သော တောင်ထိပ်များနှင့် ရေခဲ ပြင် ဖုံးလျက်ရှိသည့် အန္တာတိတ်ဒေသတို့တွင် ‘လိုင်ကင်’ များပေါက်နိုင်သည်။ အခြေအနေဆိုးရွားသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်လျောညီညွတ်စွာ ရှင်သန် နိုင်သည့် အရည်အချင်းကိပြသော ထင်ရှားသည့် နမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။

သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိသော လိုင်ကင်တို့သည် အကြမ်းခံနိုင်ဆုံး အပင်များဖြစ်ပြီး အန္တာတိတ်ဒေသ တခုတည်း၌ပင် မျိုးစိတ် ၄၀၀ ခန့် ရှိ၏။ မျိုးစိတ်စုစုပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။ လိုင်ကင်သည် ‘အယ်လဂျီ’ နှင့် မှိုတို့ နှစ်မျိုးပေါင်း၍ တပင်တည်းကဲ့သို့ ပြုမူနေခြင်းဖြစ်သည်။ ‘ကလိုရိုဖီး’ ပါဝင်သော အယ်လဂျီများက အပင်နှင့်မျိုးစလုံးအတွက် အစာ ဖွဲ့စည်းပေးသည်။ ရေ၊ ဓာတ်ဆားနှင့် အကာအကွယ်ကို မှိုက ပေးသည်။

ဤကဲ့သို့ အပင်တို့မက်စပ်တည်ရှိခြင်းကို ‘အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသဘော’ ဟုခေါ်သည်။ အပင်နှင့်မျိုးသည် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရန် တာဝန်ကိုပူးတွဲထမ်းဆောင်သည်။ တပင်ပေါ်၌ အခြားတပင်က တဘက်သတ် မှီခိုနေထိုင်သည့် ‘ကပ်ပါးသဘော’ နှင့် ခြားနားသည်။



‘ပတ်ဖဘော’ နှင့်မျိုးနွယ်သော ‘မြေပြင်ကြယ်ပွင့်မို့’ သည် သစ်တောမြေများ တွင် ပေါက်၏။ အပြင်လွှာကွဲပြီး စပိုးများ မြေပေါ်ကျခြင်းဖြင့် မျိုးပွား၏။



မှိုနှင့်ရေညှိတိုဝန်းရံလျက်ရှိသော လိုင်ကင်သည် မလေးရှားတောင်ထိပ်၌ ကောင်းစွာ ဖြစ်ထွန်းသည်။



‘သန္တာမှို’ သည် မခုတ်ဖူးသေးသော သစ်တောတွင်ပေါက်သည်။




စား ကောင်းသော ‘အိုက်စလန် ရေညှိ’ သည် အိုက်စလန်နိုင်ငံ တွင် ပေါက်၏။



အပင်တွင် တွယ်ကပ် ပေါက်နေ သည့် ‘ပါမီလီယာ’ ပင်၏ ခွက်ပုံ အပိုင်းမှ ‘စပိုး’များထွက်လာပြီး လေနှင့်အတူ ပျံ့နှံ့ ၏။



‘ပါမီလီယာ တူဗူလိုဆာ’



‘ဖရတ်တီကို လိုင်ကင်’

ရေညှိနှင့် လစ်ဗာဝပ်များ

ရေညှိနှင့် ‘လစ်ဗာဝပ်’များသည် မြေပေါ်ပေါက်သည့် အစိမ်းရောင်အရွယ်ကြီး အဆင့်နိမ့်ပင်များ ဖြစ်သည်။ အစေ့ဖြင့်မျိုးပွားပဲ ‘စပိုး’ဖြင့် မျိုးပွားခြင်းကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ အပွင့်ဆောင်ပင်များထက် အဆင့်နိမ့်သည်။

ရေညှိနှင့် လစ်ဗာဝပ်များတွင် ပင်စည်၏ အပျားပိုင်း၌ အရွက်ငယ်များ ပါရှိခြင်းကြောင့် ကတ္တီပါသားကဲ့သို့ နူးညံ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် အမြစ်မရှိပေ။ စိုစွတ်သော ဒေသများ၌ ပေါက်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ် ကျွန်ုပ်တို့မြင်နေရသော ရေညှိပင်များသည် အပင်ငယ်လေးများစွာ စုပုံ၍ပေါက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။


ရေညှိများ

ရေညှိများတွင် မျိုးစိတ် ၁၄၅၀၀ ခန့် ရှိသည်။ လစ်ဗာဝပ်များထက် ဖွဲ့စည်းမှုအဆင့်မြင့်ပြီး အရေအတွက်လည်း ပိုသည်။ ၎င်းတို့တွင် ခရုပတ်ပုံ အနေအထားရှိသည့် အပင်အတွက် အစာဖွဲ့စည်းနိုင်သော အရွက်ငယ်များ၊ ရေနှင့် ဓာတ်ဆားများကို စုပ်ယူပေးနိုင်သည့် အမြစ်ယောင်များ ရှိသည်။

ရေညှိများသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အပင်လောကအတွက် အရေးပါသည်။ ဥပမာ ရှိညွှန်အတွင်း ပေါက်သည့် ‘စပက် ဂနမ်’ ပင်များ သေသောအခါ ဆွေးမြည့်သွားခြင်းမရှိပဲ အထပ်ထပ်စုပုံပြီး ‘အော်ဂဲနစ်’ သစ်ပုပ်မြေဆွေး ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းကို အချို့နိုင်ငံတွင် လောင်စာအဖြစ်လည်းကောင်း၊ စကော့ဝီစကို အရက်ချက်ရာတွင်လည်းကောင်း သုံးသည်။ ရေကန်အတွင်း၌ ရေညှိအသေများ စုပုံ၍ အလွှာထူလာလျှင် ရေကန်မှာ တိမ်ကောပြီး အပင်များပေါက်ရန် သင့်လျော်သော မြေပြင်သစ် ဖြစ်လာနိုင်သည်။




စပက်ဂနမ်ပင်များတွင် ဆဲလ်သေများ ပါရှိသဖြင့် စုပ်ယူနိုင်အားရှိပြီး အက်ဆစ်များသောကြောင့် ပိုးသတ်နိုင်စွမ်းရှိသဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင် သုံးသည်။



‘ကလိုင်မာစီယမ် အမေရိကန်နမ်’ (ဝဲ) နှင့် ‘နီယမ် ကတ်စပီဒေတမ်’ (ယာ) တို့ သည် မြောက်သမပိုင်း ဒေသများတွင် ပေါက်သည်။


‘ပေါ်လီထရပ်ကမ် ဂျူနီပါရီနမ်’ သည် နှစ်ဆင့်တိမိတာ အထိ မြင့်နိုင်သည်။ အဖိုပင် (ဝဲ)၊ အမပင် (ယာ)



အဖိုဂမိဆောင်ပင်မှ ‘စပမ်း’ သည် ရေလွှာပါးအတိုင်း ကူးခပ်ပြီး အမပင်သို့ ရောက်ရှိသည်။

ဗရိုင်ယိုပိုက်၏ ဇီဝစက်

‘ဗရိုင်ယိုပိုက်’များသည် မျိုးပွားရန်အတွက် ရေလိုအပ်သဖြင့် စိုစွတ်ပြီး မိုးများသည့်ဒေသများတွင် အတွေ့ရများသည်။ တပင်စီပေါ်တွင်ရှိသော (ဓာတ်ရံတပင်တည်းပေါ်တွင်ရှိသော) အဖိုအင်္ဂါနှင့် အမအင်္ဂါတို့ဖြင့် မျိုးပွားသည်။ အဖိုစပမ်းများသည် အမ မျိုးဥရှိရာ သို့ ရေအတွင်းမှကူးခပ်သွားပြီး သန္ဓေအောင်စေသဖြင့် ဂမိဆောင်ပင်ပေါ်တွင် မှီခိုသော စပိုးဆောင်ပင် ဖြစ်လာသည်။ စပိုးဆောင်ပင်၏ စပိုးအိတ်အတွင်း၌ စပိုးများဖြစ်ပေါ်၍ စပိုးအိတ်အတွင်းမှ ထွက်ပြီးနောက် ၎င်းစပိုးမှတစ်ဆင့် ဂမိဆောင်ပင် ပြန်ဖြစ်လာသည်။ ရေညှိနှင့် လစ်ဗာဝပ်မျိုးစိတ်တိုင်း၌ ဂမိဆောင်ပင်နှင့် စပိုးဆောင်ပင် ဟူ၍ အပင်နှစ်မျိုးရှိပြီး အပင်နှစ်မျိုးဖြင့် မျိုးပွားခြင်းကို မျိုးဆက်တလှည့်စီ ဖြစ်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။



ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ကျိုတိုမြို့ ဆိုင်ဟိုဘုရားကျောင်းရှိဥယျာဉ်အတွင်း၌ ရေညှိမျိုးစိတ် ၈၀ ကျော်ခန့် ရှိသည်။




အရှေ့တောင်အာရှရှိ ‘ပိုဂိုနော့စ် မက်ကရိုဖီလမ်’

လစ်ဗာဝပ်များ

‘လစ်ဗာဝပ်’များတွင် သစ်သား‘တစ်ရှူး’များမပါရှိ၊ ဆင်တိမိတာ အနည်းငယ်သာမြင့်သည်။ ၎င်းတို့တွင် အရွက်နှင့်သဏ္ဌာန်တူပြီး ပြားချပ်သည့် ‘သယ်လတ်’နှင့် အာဟာရ စုဆောင်းနိုင်သည့် အမြစ်ယောင်များရှိသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့မျိုးစိတ် ၈၅၀၀ ခန့်ရှိပြီး အများစုသည် အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။



‘မာကင်ရှာ ပေါ်လီမော်ဖာ’၏အမဂမိဆောင်ပင်သည် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး ပြားချပ်သည်။



ဖန်းပင်နှင့် ဖန်းနွယ်ဝင်အပင်များ


‘ဖန်း’ပင်များသည် အပင်လောက၏ ရှေ့ပြေးအပင်များ ဖြစ်သည်။ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာက ‘စပိုး’ ပေါက်နှုန်းညံ့သည့် စပိုးဖြင့် မျိုးပွားရာမှ အစေ့ဖြင့် မျိုးပွားခဲ့သည်။ ထိုသို့အစေ့ဖြင့် မျိုးပွားခြင်းသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ တိုးတက်သော လက္ခဏာတရပ်ဖြစ်သည်။

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်

ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများအရ ပထမဆုံးသောဖန်းပင်များသည် နှစ်သန်းပေါင်း ၄၂၀ ခန့်က ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဥပမာ ‘ဝှစ်ဖန်း’ပင်သည် အဆင့်နိမ့် ‘တယ်ရီဒိုဖိုက်’ဖြစ်ပြီး ယနေ့တွေ့ရသော ဖန်းပင်ကဲ့သို့ အမြစ်စစ်နှင့် အရွက်စစ်များ မပါရှိပေ။ (ဖန်းပင်များသည် အရွက်ဆောင်သော ရှေးဦးအပင်များ ဖြစ်သည်။) ၎င်းအဆင့်နိမ့် ဖန်းပင်များ ပေါ်ထွန်းပြီးနောက် နှစ်သန်းပေါင်း ၉၀ ခန့်အကြာတွင် အစာရေကြောရှိပြီး ကုန်းပေါ်၌ပေါက်သောအပင်တို့ဖြင့် ဝဉ်ပင်စပြုသည်။ ၎င်းအပင်များတွင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အရ ရေသယ်ပို့မည့် စနစ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။

ပထမဆုံး အစေ့ဆောင်ပင်များ

တယ်ရီဒိုဖိုက်များ၏ မျိုးဆက်များ၌ အမြစ်စစ်၊ ပင်စည်စစ်နှင့် အရွက်စစ်များ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ၎င်းတို့သည် ယနေ့တွေ့နေရသော အဆင့်မြင့်ပင်များ၏ ရှေ့ပြေးများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအပင်များသည် စပိုးဖြင့်မျိုးပွားရာ၌ ရေအစဉ်လိုအပ်ခြင်း၊ စပိုးတခုမှ အပင်တပင် အဆင်ပြေပြေဖြစ်လာနိုင်ရန် သန်းပေါင်းများစွာသော စပိုးများထုတ်လုပ်ရခြင်း စသည့် လိုအပ်ချက်များ ရှိသည်။



‘နဂါးလျာဖန်း’ပင်မျိုးသည် သစ်ကပ်ပင်ငယ် တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အရွက်မြုံနှင့် စပိုးဆောင်အရွက်နှစ်မျိုးစလုံး ရှိသည်။ အပူပိုင်း အရှေ့အာရှတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။



လက်ဝဲအစွန်တွင် ‘လုံမပျိုကေသာဖန်း’ပင် ဖြစ်သည်။ ရွက်မြှာပေါ်ရှိ စပိုးအိတ်ကို အဖတ်ငယ်များဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ ဆံချည်မျှင်နှင့် တူသည့် အနက်ရောင်ပင်စည်ရှိသော အိုးဝိုက်ပင်များ ဖြစ်သည်။
လက်ဝဲဘက်ရှိ ‘ဗရက်ကင်’ခေါ် ဖန်းပင်သည် အခြားအပင်များမပေါက်နိုင်စေရန် လောင်းရိပ်ထိုး၍ ထားသည်။ အညွန့်ကို စားနိုင်သည်။

မုၼ်းစိတ်တစ်ခု၊ အပင်နှစ်ပင်


‘စပိုး’ဆိုသည်ကား အဘယ်နည်း။ စပိုးဆိုသည်မှာ သေးငယ်ပြီး ခြောက်သွေ့ဒဏ်ခံနိုင်သည့် နံရံထူများပါရှိ၍ အစေ့များနှင့် ဆောင်ရွက်ပုံ ဆင်ဆင်တူသော ဆဲလ် ဖြစ်သည်။ ‘ဖန်း’ပင်များ၏ ဇီဝစက်တွင် မုၼ်းဆက် တလှည့်စီဖြစ်နိုင်သည်။ ဖန်းပင် ၏ အရွက် ကျောဘက်တွင် စပိုးများရှိသည့် စပိုးအိတ်များကို ရွက်ကြောတလျှောက် တွေ့နိုင်သည်။ စပိုးအိတ်များ ရင့်မှည့်ချိန်၌ ပေါက်ကွဲပြီး စပိုးများ လေနှင့်အတူပျံလွင့်လျက် သင့်တင့်သောအပူချိန်၊ အစိုဓာတ်နှင့်အရိပ် ရရှိသည့်ဒေသတို့တွင် စပိုးမှ အပင်သစ်ပေါက်လာသည်။ ၎င်းသည် အလွန်သေးငယ်သော ဂမိဆောင်ပင်ဖြစ်ပြီး ‘စပမ်း’နှင့် မ မုၼ်းဥများကို တပြိုင်တည်းထုတ်

လုပ်သည်။စပမ်းသည် မမုၼ်းဥထံသို့ ရေကူး၍ ရောက်ရှိမှသာ သန္ဓေအောင်သဖြင့် ‘တယ်ရီဒိုဖိုက်’ အုပ်စုဝင် အပင်များသည် ရေကိုမိုခိုရပြန်သည်။ သန္ဓေအောင် မုၼ်းဥမှ စပိုးအိတ်ဆောင်သည့် စပိုးဆောင်ပင် ဖြစ်လာသည်။ ဤတွင် ဇီဝစက် တပတ်ပြီး၏။ ရေညှိပင်များ၌မူ အနည်းငယ်ခြားနားသည်။ စပိုးဆောင်ပင်က ငယ်ပြီး ဂမိဆောင်ပင်၌ တွယ်ကပ်၍ပေါက်သည်။

တယ်ရီဒိုဖိုက်အုပ်စုသည် သစ်ကပ်ပင်အဖြစ် ပေါက်သော်လည်း မှီအုပ်စုဝင် အပင်များကဲ့သို့ ကပ်ပါးပင်များမဟုတ်ပဲ လက်ခံပင်ကို အမှီသဘောမုၼ်းအဖြစ် သာ အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်တိုင် အစာဖွဲ့စည်းသည်။



‘အော်စမန်ဒါ ဂျပွန်နီကာ’သည် စိုစွတ်သောနေရာများတွင် ပေါက်သည်။ အရွက်ဖျားပိုင်းများသည် လိပ်နေပြီး အပင်ကြီး ထွားစဉ် အလိပ်ပြေသည်။



ဖန်းပင်၏ ဇီဝစက်ကို စပိုးပျံလွင့်ပုံ၊ ပေါက်ပုံနှင့် အပင်သစ်ဖြစ်လာပုံအထိ ပြထားသည်။



‘မြေလျှာဖန်း’ပင်



အပူပိုင်းဒေသရှိ ‘ဂလိုင်ကီနိုယာဖန်း’ပင်



၁၂ မိတာခန့်မြင့်သော ‘ဆိုင်အာသီယာဖန်း’ပင်ကြီး



မျိုးအောင်နိုင်သော
အရွက်



အရွက်ကျောဘက်ရှိ
စပိုးအိတ်များ



‘စိရာတော့တယ်ရစ် သယ်လစ်ထရွိုက်ဒီ’ ၏
မျိုးအောင်နိုင်သော အရွက်သည် ရေပေါ်
တွင် ပေါ်နေပြီး မြူသောအရွက်သည် ရေ
အောက်တွင် မြုပ်နေသည်။


‘တယ်ရစ် မာလတီဖီဒါ’ကို ဂျပန်ရှိ ကျောက်
ကမ်းပါးယံများတွင် တွေ့ရ၏။မျိုးအောင်နိုင်
သော အရွက်များသည် မြူသောအရွက်မျှ
ထက်သေးသွယ်သည်။



ရွှံ့ညွန့်ပေါရာဒေသရှိ မှိုနားတိုပင်တွင် တွား
သွားနိုင်သော ‘ရိုင်ဇုမီး’နှင့် လုံးဝန်းသည့်
စပိုးအိတ်ရှိသည်။



အရှေ့တောင်အာရှရှိ ‘ဒရယ်ဖိုချီဖန်း’ပင် တမျိုး၏အရွက်တမျိုးသည် ထောင်
မတ်ပြီး ကျန်တမျိုးမှာ ငိုက်ကျလျက် ‘စပိုး’ များကို ဆောင်သည်။



‘ဖန်း’ပင် အမျိုးမျိုး ရှိသည်။ အပူပိုင်းဒေသများ၌
ပေါက်သည့် အရွယ်ကြီးသော ‘နီဖရိုလစ်ပစ် ကော်ဒီဖို
လီယာ’ (ယာ)၊ အရွယ်ငယ်သည့် ‘ဆယ်လဗီနီယာ’
(အထက်)၊ အမြစ်မရှိပဲ ပေါလောမျောနိုင်သော
‘အေဇိုလာ’ (ဝဲဗဟို)


ဖန်းပင်၏မျိုးနွယ်များ

‘တယ်ရီဒိုဖိုက်’ အုပ်စုသည် တချိန်က ကမ္ဘာကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သော်လည်း ယခု အခါတွင် မျိုးစိတ်အနည်းငယ်သာလျှင် ကျန်ရစ်သည်။ ၎င်းတို့အနက် အချို့ကို ထုတ်နုတ်တင်ပြပါမည်။

‘မြင်းမြီး’ပင်၌ ရှည်လျားသော အခေါင်းပွပင်စည်ရှိသည်။ ဆဲလ်နီရိုတွင် ‘ဆီလီကာ’ပါရှိသဖြင့် ကြပ်ဆတ်သည်။ အရွက်များသည် အဆစ်၏အခုံးပေါ်တွင် ဝိုင်းပတ်၍ထွက်သည်။ နှစ်သန်းပေါင်း ၄၀၀ ခန့်က ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါက်ခဲ့သည်။ အချို့သည် ၁၀ မီတာမှ ၁၅ မီတာအထိ မြင့်သည်။

‘ငှက်တောင်မင်တ’ ပင်များတွင် အရည်ရွှမ်းသောပင်စည်တို့ ရှည်လျားပြီး အခေါင်းပါသော ငှက်တောင်နှင့်တူသည့်အရွက်၊ စပိုးအဖိုနှင့် အမတို့ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အက်ဆစ်များသော ရွှံ့ညွန့်တွင် ပေါက်သည်။

‘တင်းပုတ်ရေညှိ’ပင်တွင် အရွက်ငယ်များသည် ပင်စည်၌ ခရုပတ်ပုံစံလျက် ထူထဲစွာ ရှိသည်။ အဖျားပိုင်း၌ စပိုးအိတ်များ ရှိသည်။




ရွှံ့ညွန့်တွင်ပေါက်သော ငှက်တောင်မင်တ ပင်၏ ပင်စည်တို့ပေါ်တွင် မြက်ရွက်နှင့် တူသည့် အရွက်ရှည်များ ရှိသည်။

အရှေ့တောင်အာရှနှင့် ဩစတြေးလျရှိ ‘ဆိုင်လိုတမ် နယူဒမ်’ တွင် စပိုးဆောင်အိတ် သုံးမြွှာ ရှိသည်။



‘ဆယ်လာဂျီနယ်လာ ဝီလဒီနိုဗီအိုင်’ သည် အံ့ဆိုင်ရဲစွာတောသော အရှေ့တောင်အာရှသစ်တောများတွင် ပေါက်သည်။



တင်းပုတ်ရေညှိပင်သည် မြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင် ပေါက်သည်။

မျိုးစေ့ဖော်အပင်များ

‘မုန်း’ပင်နှင့်တူသည့် အပင်များမှ အစေ့ဆောင်ပင် (မျိုးစေ့ရှိသောအပင်) များအသွင်သို့ ကူးပြောင်းရန် နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ ကြာခဲ့သည်။

‘ကိုနီဖာ’ပင်များသည် မျိုးစေ့ဖော်အပင်အုပ်စုဝင် ဖြစ်သည်။ အစေ့များသည် အကာအကွယ်မဲ့သောအပိုင်း၌ ဖြစ်ထွန်းပြီး လေနှင့်တိုက်ခိုက် ထိတွေ့သည်။ ဥပမာ ထင်းရှူးပင်များတွင် အစေ့များသည် ‘ကုန်း’၏ရွက်ဖတ်များအတွင်း၌ရှိသော်လည်း မြင်တွေ့နိုင်သည်။ အပွင့်ဆောင်ပင်များတွင်မူ အစေ့များသည် အသီးအတွင်း၌ ဖုံးကွယ်လျက်ရှိသည်။

မုန်တိုင်ပင်များ

မုန်တိုင်ပင်သည် မျိုးစေ့ဖော်အပင်များအနက် အဆင့်အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်ပင်၏ပင်စည်သည် ကြိုးထွားနှုန်းနွေးသော်လည်း အရွယ်ရင့်လာသည်နှင့်အမျှ တုတ်ခိုင်လာသည်။ အဖိုအင်္ဂါနှင့် အမအင်္ဂါတို့သည်တပင်စီ၌ သီးခြားရှိသည်။

အဖိုပင်ပေါ်ရှိ ဝတ်မှုန်တခုစီမှ အမျှင်ပွားရှိသည့် ရွှေ့လျားနိုင်သော စပမ်းနှစ်ခုစီ ဖြစ်လာပြီး အမပင်ပေါ်ရှိ အမဆဲလ်ရှိရာသို့ ကူးစပ်သွားသည်။ အပူပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ဒေသရှိ မျိုးစိတ်တခု၏အစေ့မှ စားသုံးဖွယ်အမှုန်ကို ရရှိသည်။



မျိုးအောင်နိုင်သည့် အမမုန်တိုင်အရွက် (ဝ)၊ အဖိုရွက်ဖတ် (ယာ)

ဂင်ကိုပင်များ

‘ဂင်ကိုအေလီ’အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ‘ဂင်ကို’ ပင်များသည် အရွက်လှပမှုကြောင့် လူသိများသည်။ ကျောက်မြစ်ရပ်ကြွင်းများအဖြစ်တွေ့ရသည့် အဆင့်မြင့်ပင်များအနက် ရှေးအကျဆုံးသော အပင်ဖြစ်သည်။ တချိန်က မျိုးစိတ်များစွာရှိသော်လည်း ယခုမျိုးစိတ်တခုသာလျှင် ကျန်ရှိတော့သည်။ သက်တမ်းနှစ်တစ်ထောင် ရှိသော ဂင်ကိုပင်များကို တရုတ်ဘုရားကျောင်းဝင်းများအတွင်း၌ ယနေ့တိုင်တွေ့နိုင်သည်။ ပြန့်ကားသည့်အရွက်စိမ်းများရှိပြီး နှစ်စဉ်အရွက်ကြွေလေ့ရှိသည်။ ဂင်ကိုပင်တွင် အပွင့်ဆောင်ပင်များကဲ့သို့ ဝတ်ဆံဖို၌ ဝတ်မှုန်များ ရှိသည်။ ဂင်ကိုသီးကို ဂျပန်အစာအချိုတွင် အသုံးပြုသည်။



ဝတ်ဆံဖိုအစေ့များ (ယာ)
ဝတ်မှုန်အိတ်တစ်ခု (ဝ)



အစေ့များ
အမကိုင်းရှိ အစေ့လောင်းတစ်ခု



အစေ့လောင်း
အစေ့ဆောင်ကိုင်း



ဂင်ကိုစေ့ဖြတ်ပိုင်း



မုန်တိုင်ပင်၏ဒေသရင်းမှာ ပစိဖိတ်ပင်လယ်ကမ်းစပ်ဒေသ ဖြစ်သည်။ မျိုးအောင်နိုင်သည့် အရွက်နှင့် အစေ့လောင်းများကို ပုံ၌ ပြထား၏။



ကုန်းအဖိုများ



အင်္ဂလန်၊ ‘ကျူဂါဒင်’ရှိ နှစ် ၂၀၀ ကျော် ဂင်ကိုပင်ကြီး

ကိနီဗာပင်များ

အမြဲစိမ်း ‘ကိနီဗာ’ ပင်များမှ သစ်သား၊ စက္ကူပျော့ဖတ်၊ ထင်း၊ အဆီနှင့် သစ်စေးများရသည်။ ၎င်းပစ္စည်းများကို ပလတ်စတစ်၊ သုတ်ဆေး၊ ဆေးဝါး နှင့် ပုံနှိပ်မင်များ ဖော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

လူတို့အတွက် အသုံးဝင်လှသကဲ့သို့ ရုက္ခဗေဒအတွက်လည်း အရေးပါလှသော အပင်ဖြစ်သည်။ အပင်တို့ဆင့်ကဲ ဖြစ်ပေါ်မှုတွင် အပင်ကြီးအဖြစ်သို့ ကြီးထွားနိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းမှုမျိုးကို ထင်းရှူးအပါအဝင် မျိုးစေ့ဖော် အပင်များ၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ရှိ ‘စီကွိုင်ယာ’ ပင်ကြီးမှာ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး သက်ရှိအပင်ဖြစ်သည်။ ဤစီကွိုင်ယာပင်မျိုးသည် အစေ့မှ မျိုးပွားသော အပင်များ၌ မှန်တိုင်ပင်မှအပ ရှေးအကျဆုံးအပင် ဖြစ်သည်။ ကိနီဗာပင်ကြီးများသည် ပြင်းထန်သော ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်သည်။ မျိုးစိတ်အချို့ကို ဤစာမျက်နှာမှ စတင်ဖော်ပြပါမည်။

သစ်မင်းပင်များ

သစ်မင်းပင်မှ အဖိုးတန်သစ်ရရှိသည်။ အမြဲစိမ်းသော အရွက်များမှာ ပြားချပ်သည်။ ကုန်းအဖိုတွင် ဝတ်မှုန်အိတ် နှစ်အိတ်ပါသော ရွက်ဖတ်များရှိသည်။ အမပင်တွင် အစေ့လောင်းများရှိသည်။ ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းနှင့်အာရှအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် တွေ့ရသည်။



အရှေ့အာရှ တောင်စောင်းများပေါ်ရှိ အမြဲစိမ်းသစ်မင်းပင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။

ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အမြဲစိမ်းသစ်မင်းပင်၏ အစေ့လောင်းများပါဝင်သော အကိုင်းတစ်ကိုင်း ဖြစ်သည်။


ထင်းရှူးပင်နှင့် ဖားပင်များ

ထင်းရှူးပင်များနှင့် ‘ဖား’ ပင်များကို ရာသီဥတုအေးမြသော ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသများတွင် တွေ့ရသည်။ အဖိုးတန်သစ်သားရသည်။ ခရစ်ယာန်တို့က ဖားပင်ကို ခရစ္စမတ်ပွဲတော်၌ သုံးသည်။ ဂျပန်လူမျိုးတို့က ဤအပင်အကြောင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ကဗျာဖွဲ့ခဲ့သည်။ ဤအပင်များသည် အစေ့ဖြင့် မျိုးပွားသောကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌ လမ်းကြောင်းသစ်တခု ထွင်ခဲ့သည့် အလားရှိသည်။ စပိန်အပင်မျိုးပွားခြင်းကိုလည်း ၎င်းတို့၌ နောက်ဆုံး

ယူးပင်များ

‘တက်စေးစီး’ မျိုးရင်းဝင် ‘ယူး’ ပင်များ၏ ပြားချပ်၍ ရွက်လွှဲအနေအထားရှိသော အရွက်များ၌ အဆိပ်ပါ၏။ သစ်သားကို လေးကိုင်းနှင့် ဗီဂျီအကောင်းစား ပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ယူးပင်များသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှည်သဖြင့် အနောက်တိုင်းသား အချို့က ထာဝရသဘောဆောင်သော သင်္ကေတအဖြစ်သုံးသည်။

အမအင်္ဂါကို ကုန်းအနေဖြင့်မတွေ့ရပဲ အစေ့ကိုဝန်းရံထားသည့် ခွက်ပုံရှိ အရည်ရွှမ်းသော အစိမ်းရောင် အသွာပါးအစေ့ဖုံးအဖြစ် တွေ့ရသည်။ ရင့်မှည့်လျှင် ထူထဲ၍ အရည်ရွှမ်းပြီး အနီရောင်သို့ပြောင်းသည်။ ယူးပင်နှင့် မျိုးနွယ်သောအပင်မှာ ‘မက်မန်းယူး’ ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မျိုးစိတ်ခြောက်ခုရှိပြီး အဖိုနှင့်အမပင် သီးခြားရှိသည်။ အရွက်အောက်ဘက်ရှိ အမြှူစင်းကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။



တွေ့ရသည်။ အစေ့များသည် လေ၏အကူအညီဖြင့် ပျံလွင့်သည်။ မျိုးပွားအင်္ဂါများကို ကုန်းဟုခေါ်ပြီး ကုန်းအမသည်ကြီး၍ ကုန်းအဖိုမှာငယ်၏။ ကုန်းနှစ်မျိုးစလုံး၌ ဖားသော ရွက်ဖတ်များ ခရုပတ်ပုံစံလျက် သိပ်သည်းစွာ ရှိသည်။ အရွက်သည် အပ်ချောင်းပုံ ဖြစ်သည်။ အခြားအရွက်များကဲ့သို့ပင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ရွက်ကြောရှိ ‘ဆဲလ်’ များသည် အပင်အတွက်လိုအပ်သောရေနှင့်သကြားကို သယ်ပို့ပေးနိုင်သည်။



ထင်းရှူးကိုင်းများတွင် အရွက်နှစ်ရွက်စီပါသော ကိုင်းတိုများရှိသည်။ လက်ယာဘက်တွင် ကုန်းအဖိုနှင့်အမ ဖြစ်သည်။



ရွက်ဖတ်နှင့် အတောင်ပါ အစေ့တစ်စုံ
အာရှသမပိုင်းကမ်းခြေ၌ တွေ့ရသည့် ထင်းရှူးမျိုးတွင် ကုန်းပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ပင်စည်ပုံသဏ္ဌာန် ထူးခြားသည်။


လေကိုအသုံးချခြင်း

ထင်းရှူးပင်နှင့် ‘ဖား’ ပင်များတွင် ကုန်းအဖို၌ ဝတ်မှုန်များရှိသည်။ ကုန်းအမ၌ ရွက်ဖတ်များပါရှိသော စပိုးအမတစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုရှိသည်။ မျိုးအောင်ချိန်တွင် ကုန်းအဖိုမှ ရွှေရောင်ဝတ်မှုန်များသည် လေနှင့်အတူ ပျံလွင့်သည်။ ကုန်းအမရှိရာသို့ ဝတ်မှုန်ရောက်ရှိမှုသေချာစေရန် ဝတ်မှုန်အများအပြား ပျံလွင့်သဖြင့် ထင်းရှူးတောရှိရေကန်များသည် ထိုအချိန်မျိုးတွင် ရွှေရောင်တောက်နေတတ်သည်။


လေဖြင့်ပါလာသော ဝတ်မှုန်သည် ကုန်းအမ၏ ဝေ့နေသောရွက်ဖတ်ကြား အတွင်းသို့ရောက်ပြီး စပိုးအမကို သန္ဓေအောင်စေလျက် အစေ့ဖြစ်လာစေသည်။ ကုန်းအမသည် ခြောက်ပြီးကြပ်ဆတ်လာချိန်၌ ရွက်ဖတ်များပွင့်အာလာပြီး ငှက်များ၊ ရှဉ့်များ ဖျက်ဆီးခြင်းဘေးမှ ကင်းလွတ်သောအစေ့များသည် ထွက်ကျလာသည်။ ၎င်းအစေ့များမှ အပင်သစ်များပေါက်လာသည်။



လက်ဝဲဘက်တွင် ‘စပရ’ပင်၏ အကိုင်းမှ တွဲလဲကျနေသော ရင်မည့်သည့် ကုန်းများ ဖြစ်၏။ လက်ယာဘက်တွင် အရွက်တိုများနှင့် ထီးကိုင်းများ အသွင်ပြာနေသည့် အရွက်ရှည်များရှိသော ဂျပန် ထင်းရှူးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။



စပရပင်နှင့် ဖားပင်များသည် ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်ရှိ မီတာ ၃၀၀၀ ခန့် မြင့်သော ရော့ကီးတောင်တန်းများပေါ်၌ ပေါက်သည်။ အပင်အစိတ်အပိုင်း အချို့သည် လေဖက်နှင့် အအေးဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးလေ့ရှိသည်။



ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၊ ‘ယိုဆင်မီတီ’ အမျိုးသားဥယျာဉ် အတွင်းရှိ ‘စီကျိုင်ယာ’ပင်ကြီး၏ ပင်စည်အောက်ခြေရှိ အခေါင်းသည် လိုဏ်ခေါင်းသဖွယ်ဖြစ်နေပြီး ၎င်းကို ဖြတ်၍ ကားလမ်းဖောက်ထားသည်။



ဟိမဝန္တာ စီဒါပင်၏ လှပသော ကုန်းများ

စီဒါပင်များ

ကိုနီဗာမျိုးများအနက် ထင်ရှားသော မျိုးစိတ်တစ်ခုမှာ ‘လက်ဘနွန်စီဒါ’မျိုး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း ၂၄၀၀၀ နှစ်က ဆော်လမွန်ဘုရင် လက်ထက်တွင် ဂျေရုဆလင်မြို့၌ ဘုရားကျောင်းဆောက်လုပ်ရန် ‘စီဒါ’ပင်များကို လူအင်အားတစ်သိန်းဖြင့် နှစ် ၂၀ ကြာ ခုတ်လှဲခဲ့ကြ၏။ စီဒါပင်များတွင် ပျော့ပျောင်း၍ မွှေးကြိုင်သော သစ်သားရှိသည်။ ကြာရှည်ခံသည့်အပြင် ပိုးမစားနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် အဝတ်အစားထည်ရန် သေတ္တာ၊ ဗီရိုပြုလုပ်ရန် အသုံးဝင်၏။

စီကျိုင်ယာပင်များ

စီကျိုင်ယာပင်ကြီးများသည် ကမ္ဘာပေါ်၌ ထုထည်အကြီးမားဆုံးသော အပင်များဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏သစ်သားသည် ပေါ့ပါးပြီး ကြာရှည်ခံသည်။ စီကျိုင်ယာတော၏သစ်ထွက်နှုန်းမှာ အခြားသစ်တောများထက် များစွာပိုသည်။

စီကျိုင်ယာပင်များသည် သမိုင်းမတင်မီကပင် ပျံ့နှံ့စွာပေါက်ခဲ့သော်လည်း ယခု ကာလီဖိုးနီးယားပြည်နယ်၌သာ သစ်တောအနည်းငယ်ကို တွေ့ရတော့သည်။ အချို့သည် အချင်း ၉ မီတာနှင့် အမြင့်မီတာ ၈၀ အထိ ရှိသည်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမြို့ မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ ၅၀၀ တွင် ပေါက်နေသောစီကျိုင်ယာပင်ကြီးသည် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးအပင်ဖြစ်ပြီး မီတာ ၁၁၀ မြင့်၍ ၁၃ မီတာ လုံးပတ်ရှိသည်။ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးအပင်မှာ နှစ် ၄၀၀၀ ဖြစ်၏။

စီကျိုင်ယာနှင့် မျိုးနွယ်သောအခြားအပင်မှာ ‘မက်တာစီကျိုင်ယာ’ပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၁ ခုတွင် တရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်း၌ ရှင်နေသည့် အပင်သုံးပင်ကို တွေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ အစေ့များမှ အပင်ပွားယူနိုင်ခဲ့သည်။


ဆိုက်ပရက်ပင်များ

‘ဆိုက်ပရက်’ ပင်နှင့် ၎င်း၏မျိုးနွယ်များသည် ‘ကိုနီဗာ’ မျိုးများတွင် ပါဝင်သည်။ အစိမ်းရောင်ရွက်ဖတ်များ ထပ်လျက်ရှိသည်။ သစ်သားသည် မာကျောပြီး ရေငွေ့ဒဏ်ခံနိုင်သဖြင့် ဝိဇ္ဇာသောနိုင်ငံများ၌ လူကြိုက်များသည်။ ဂျပန်တွင် အရေးပါသော သစ်သားအဖြစ် သုံးသည်။ အပင်၏အမြင့်မှာ အမျိုးမျိုးရှိ၏။ ‘အီတလီဆိုက်ပရက်’ ပင်သည် ၂၅ မီတာခန့်မြင့်ပြီး ခေါင်းတုံးဆိုက်ပရက်ပင်မှာ ၄၅ မီတာအထိမြင့်သည်။ ခေါင်းတုံးဆိုက်ပရက်ပင်တွင် မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ ၁ မီတာအမြင့်အထိ ထိုးထွက်နေသော အမြစ်များမှတစ်ဆင့် လေရနိုင်သဖြင့် ရွှံ့ညွန့်တွင်ပေါက်သည်။ ကုန်းအဖိုနှင့်ကုန်းအမများမှာ သေးငယ်သည်။ ဂျူနီပါပင်၊ သူယာပင်နှင့် သူယော့ပင်စသော ဆိုက်ပရက်ပင်နှင့် မျိုးနွယ်သည်။ ဂျူနီပါပင်၏ကုန်းအမကို ဂျင်အရက်တွင် ရနံ့သင်းစေရန်သုံးသည်။ ဆိုက်ပရက်ပင်၏အကိုင်းကို ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်လည်းတခါတရံအသုံးပြု၏။



အာရှရှိ ဂျူနီပါပင်သည် မွေးကြိုင်သော အမြစ်ပင်ဖြစ်ပြီး ချုံပင်မှ သစ်ပင်ငယ်အထိ ရှိသည်။

သူယော့ပင်ပင်ကို သဘာဝကို မြတ်နိုးသော ဂျပန်များက ဥယျာဉ်များအတွင်း စိုက်ပျိုးသည်။



အနောက်တောင်အာဖရိကရှိ ‘ဝဲလဝစ်ရှီယာ ဗေနီစီအိုင်’ ဖြစ်သည်။

နီတမ်ပင်၊ ဝဲလဝစ်ရှီယာပင်နှင့် အီဖီဒရာပင်များ

‘နီတမ်’ ပင်၊ ‘ဝဲလဝစ်ရှီယာ’ ပင် နှင့် ‘အီဖီဒရာ’ ပင်များသည် ကိုနီဗာမျိုးနှင့် မျိုးနွယ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မျိုးစေ့ဖော်အပင်အုပ်စုများအနက် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် တက်လမ်းအဆုံးသို့ရောက်နေသော အပင်များဖြစ်သည်ဟူ၍ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များက ယူဆခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအပင်၏သစ်သားနှင့် မျိုးပွားအင်္ဂါပိုင်းတို့မှာ အဆင့်မြင့်ပင်များနှင့် ဆင်တူ၏။

နီတမ်စေ့များကို လှော်စားနိုင်သည်။ အီဖီဒရာပင်မှ ထွက်သော ‘အီဖီဒရင်း’ ကို ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ၊ နှာစေးရောဂါကုသရန်နှင့် သွေးကြောကျဉ်းစေရန် အသုံးပြုသည်။ ဝဲလဝစ်ရှီယာပင်သည် အာဖရိက အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ နာမစ်သဲကန္တာရ၌သာပေါက်ပြီး အစိုဓာတ်ကို နှင်းမရယူသည်။ ၎င်းတွင် သက်တမ်းတလျှောက် အပင်ရင်းမှထွက်သော အရွက်နှစ်ရွက်သာရှိသဖြင့် ထူးဆန်းသည်။ ၎င်းအပင်သည် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့် အထိ ရှင်နိုင်သည်။

အသီးပါသောပင်စဉ်



အစေ့




ဆိုက်ပရက်အရွက်အမျိုးမျိုး



ကုန်းအမ

ကုန်းအဖို

‘ခေမီဆိုက်ပရစ် ပီစီဖာရာ’ သည် ဆိုက်ပရက်မျိုး ရင်း ဝင် အပင် ဖြစ်သည်။ အကိုင်းတွင် ရွက်ဖတ်များ ပူးကပ်စွာ တည်ရှိသည်။



မြေထဲပင်လယ်ဒေသရှိ အီဖီဒရာပင်သည် ချုံပင်ဖြစ်ပြီး အစိမ်းရောင်ပင်စဉ်နှင့် ရွက်ဖတ်များ ရှိသည်။ (အထက်) ၊ အရှေ့တောင်အာရှရှိ နီတမ်ပင်မှာ သစ်မာပင်ငယ် ဖြစ်သည်။ (အောက်)



အပွင့်ဆောင်ပင်များ

ပန်းများပွင့်နေသည့် ဥယျာဉ်တခုကို ကြည့်လိုက်လျှင် သဘာဝ၏အလှကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အပင်တို့အတွက် အရေးပါသော မျိုးပွားသည့်ဖြစ်စဉ်ကို လည်း သိနိုင်သည်။ မျိုးစေ့ဝှက်အပင်တို့၏ မျိုးပွားဖြစ်စဉ်တွင် အပွင့်သည် အဓိကဖြစ်သည်။

အပွင့်တို့တွင် တောက်ပသော အရောင်များနှင့် မွှေးကြိုင်သောရနံ့များရှိ သည်။ ဝတ်မှုန်ကူးရန်အတွက် 'အင်းဆက်'ပိုးများကို ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ လေဖြင့်ဝတ်မှုန်ကူးသော မျိုးစေ့ဝှက်အပင်များစွာတို့တွင်မူ အပွင့်ကို အလွယ် တကူ မမြင်နိုင်ပေ။



စေ့ရွက်စုံပွင့်တွင် ပွင့်ချပ်လေးခု သို့မဟုတ် ငါးခုရှိပြီး စေ့ရွက်ထီးပွင့် (ယာ) တွင် ပွင့်ချပ်သုံးခု သို့မဟုတ် ခြောက်ခုရှိသည်။

ရေကြောများဝန်းရံနေသောအခေါင်းပိတ်အူတိုင်ရှိသည့် စေ့ရွက်စုံပင်စည် (ယာ) အစာရေကြော စည်းများမြန် ကျ နေ သော စေ့ရွက်ထီးပင် စည် (ယာအစွန်)

စေ့ရွက်ထီးနှင့် စေ့ရွက်စုံရွက်များ




အုန်းနှင့်ပိန်းကဲ့သို့ စေ့ရွက်ထီးအရွက်တို့တွင် ရွက်ကြောပြိုင်သည်။ ရွက်ထီးဖြစ်ပြီး ရှည်လျားသည်။ 'ဒန်ဒီလိုင်ယန်'၊ 'ဗတ်တာကပ်'၊ 'မေပယ်'၊ 'ဒေါ့' နှင့် 'ဆီရယ်' စသည့်စေ့ရွက်စုံအရွက်တို့၏ရွက်နားတွင်အတက်အချိုင့်ပါပြီးရွက်ကြောမြာသည်။

စေ့ရွက်စုံပင်များ

မျိုးစေ့ဝှက်အပင်တို့၏ အဓိကအုပ်စုနှစ်ခုမှာ စေ့ရွက်စုံပင်များနှင့် စေ့ရွက်ထီး ပင်များ ဖြစ်သည်။

စေ့ရွက်စုံက စေ့ရွက်ထီးထက် မျိုးစိတ်အရေအတွက် လေးဆပိုများပြီး ပိုမို ရှေးကျသည်။ အစေ့ရွက်နှစ်ရွက်ပါသည်။ အစေ့ရွက်သည် အပင်လောင်း၏ အရွက်ငယ် ဖြစ်သည်။

စေ့ရွက်စုံပင်စည်တွင် ပျော့ပျောင်းသော အခေါင်းပိတ်အူတိုင် သို့မဟုတ် ရေကြောများဝန်းရံနေသော အခေါင်းပေါက်အူတိုင် ရှိသည်။ စေ့ရွက်စုံ အရွက်တို့သည် ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးရှိပြီး ရွက်ကြောယှက်သောကြောင့် ပိုမို တောင့်တင်းသည်။ စေ့ရွက်စုံပွင့်တို့တွင် ပွင့်ချပ်လေးခု သို့မဟုတ် ငါးခုရှိသည်။



စေ့ရွက်စုံ

စေ့ရွက်ထီး

စေ့ရွက်ထီးပင်များ

စေ့ရွက်ထီးပင်တို့သည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် ခေတ်အမီဆုံးဖြစ်သည်။ အစေ့ရွက် တရွက်သာပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အစိတ်အပိုင်း အနည်းငယ်သာ ရှိသော ကြောင့် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ထင်ရသည်။ အပင်အားလုံးတို့အနက် ၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အလုံးစုံ လိုက်လျောညီညွတ်သည်။

စေ့ရွက်ထီးအရွက်တို့သည် ရွက်ထီးဖြစ်ပြီး ရွက်ကြောပြိုင်သည်။ ပင်စည် သည် ပျော့ပျောင်းပြီး အစာသယ်ဆောင်သော လမ်းကြောင်းများ ပါရှိ သည်။ အလွန်မွှာသောအမြစ်များ သို့မဟုတ် 'ရိုင်ဖန်း' ရှိနိုင်သည်။ ပွင့်ချပ် အရေအတွက် ၃ ခု၊ ၆ ခု၊ ၉ ခု စသည်ဖြင့် ရှိနိုင်သည်။ သစ်ခွံ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဖြက်ပင်များ၊ နှင်းပန်းမျိုးပင်များနှင့် ပြောင်းစသည့် အပင်အမျိုးမျိုးပါဝင်၏။



စေ့ရွက်စုံခေါင်ရန်း (ဝဲ) နှင့် စေ့ရွက်ထီးစပါး (ယာ)၊ အင်းဆက်ပိုးဖြင့် ဝတ်မှုန် ကူးသော အပင်တို့တွင် အရောင်နှင့် ဝတ်ရည် ရှိသည်။ လေဖြင့်ဝတ်မှုန်ကူးသော အပင်တို့သည် အစုအပြုံလိုက် ပေါက်တတ်ပြီး ဝတ်ဆံပိုများ ထိုးထွက်နေသည်။


ကြီးထွားခြင်း

အပင်များကို သစ်မာပင်၊ ချုံပင်၊ သစ်ပျော့ပင်ဟူ၍ ပင်စည်၏သဘာဝနှင့် အရွယ်အစားအရ ခွဲခြားနိုင်ကြောင်းသိခဲ့ရပြီ။ ထို့အပြင် သစ်ပျော့ပင်များကို သက်တမ်းအလိုက် တနှစ်ခံပင်၊ နှစ်နှစ်ခံပင်နှင့် နှစ်ရှည်ခံပင်ဟူ၍ ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။

တနှစ်ခံပင်သည် တနှစ်အတွင်း ဇီဝစက် တပတ်လည်သည်။ တနှစ်ခံပင်အချို့သည် နှစ်ဝက်သက်တမ်းသာရှိပြီး သဲကန္တာရပေါက် အပင်အချို့သည် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်သာ သက်တမ်းရှည်သည်။ ထိုသက်တမ်း အချိန်အတွင်းမှာပင် အစေ့မှ အပင်ပေါက်သည်။ အပင်တွင် အစေ့များဖြစ်ပေါ်ပြီး အပင်သေသည်။ ခရမ်းချဉ်၊ ပဲနှင့် နေကြာတို့သည် တနှစ်ခံပင်များဖြစ်သည်။

နှစ်နှစ်ခံပင်သည်လည်း သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး သက်တမ်းနှစ်နှစ်ရှိသည်။ သက်တမ်း၏ ပထမရာသီတွင် အရွက်များထွက်ပြီး အမြစ်အတွင်း၌ အစာသိုလှောင်သည်။ ဒုတိယရာသီတွင် အပွင့်ပွင့်၍ အသီးသီးပြီးနောက် အပင်သေသည်။ မုန်လာဥဝါ၊ မုန်လာဥနီပင်တို့မှာ နှစ်နှစ်ခံပင်များ ဖြစ်သည်။


နှစ်ရှည်ခံပင်တို့သည် နှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှည်သည်။ အပင်ရင့်သော အခါ နှစ်စဉ် အပွင့်ပွင့် အသီးသီးသည်။ နှင်းပန်း၊ ဒေလီယာ အစရှိသော မျိုးစိတ်အချို့တွင် နှစ်စဉ် အပင်၏မြေပေါ်ပင်စည်ပိုင်းများ ကျသွားသည်။ သို့သော် ငမြေအောက်အစာသိုလှောင်သည့် အင်္ဂါအနေဖြင့် ဆက်လက်အသက်ရှင်သည်။ အပင်ပေါက်သောရာသီချိန်ရောက်လျှင် ၎င်းအင်္ဂါမှပင်စည်ပိုင်းပြန်ထွက်သည်။



သမပိုင်းဒေသရှိ သစ်မာပင်တို့၏ ထူးကဲအပွားများသည် ဆောင်းရာသီခဏ်ကို ခံနိုင်သည်။ အပွင့်နှင့် ရွက်ပွားတို့ကို ရွက်ပတ်များက ကာကွယ်ထားသည်။



မုတ်သုံရာသီရှိသည့် အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်သော စိန်ပန်းပင်သည် ခြောက်သွေ့သော ရာသီတွင် အရွက်ကြွေသည်။



ကွမ်းအတက်

အပွင့်

နှစ်နှစ်ခံ သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည့် 'တာနစ်' မုန်လာဥပင်၌ ပထမနှစ်တွင် မောင်းကားနေသော အစာသိုလှောင်အမြစ် ဖြစ်ပေါ်သည်။ လာမည့် နှစ်တွင် ပေါက်လာမည့် အပင်အတွက် အစာဖြစ်သည်။

ပိန်းပင်သည် မြင့်သော နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကစီသိုလှောင်သော 'ကျူဗာ' ရှိသည်။

အမြဲစိမ်းသစ်မာပင်နှင့် ရွက်ကြွေသစ်မာပင်များ

နှစ်ရှည်ခံသစ်မာပင်များကို အမြဲစိမ်းနှင့် ရွက်ကြွေဟူ၍ နှစ်မျိုး ထပ်ခွဲသည်။

ထင်းရှူးပင်နှင့် 'ဟား'ပင်တို့သည် အမြဲစိမ်းပင်များဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှကဲ့သို့ ပူနွေးသော ရာသီဥတုရှိသည့် ဒေသတွင် သစ်မာပင်များအားလုံး လောက်ပင် အမြဲစိမ်းသည်။

အမြဲစိမ်းပင်သည် ရွက်ဟောင်းကို ရွက်သစ်ဖြင့် အစားထိုးသောကြောင့် တနှစ်ပတ်လုံးကြွေသည်။


ဆောင်းဦးတွင် ရွက်ကြွေတော၌ အလွန်တောက်ပသော အရောင်များဖြင့် လှပနေသည်။ သစ်မာပင်တို့တွင် ဆောင်းဦး၌ ရွက်ဟောင်းအားလုံး ကြွေကျပြီး နွေဦးတွင် ရွက်သစ်များထွက်သည်။ သမပိုင်းဒေသများရှိ သစ်မာပင်တို့သည် အများအားဖြင့် အရွက်ကြွေသည်။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲသည် ဤသစ်ပင်များအတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သည်။



ကြီးထွားသော ရာသီကုန်ဆုံးချိန်တွင် 'ခိုလေးရီးယား ဗိုဂိုတင်းဆစ်'၏ မြေပေါ်ပိုင်းရှိ အရွက်များ၊ ပင်စည်များ ကျသွားသည်။

မျိုးပွားခြင်း

ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် အပွင့်ဆောင်ပင်တို့သည် ခေတ်အမီဆုံးဖြစ်ပြီး အဓိက အဆင့်တွင် တည်ရှိသည်။ မျိုးစေ့ဝှက်အပင်တို့၌ အဆင့်မြင့်၍ ဆန်းကြယ်သော မျိုးပွားနည်း ရှိသည်။ 'ဗက်တီးရီးယား'တို့သည် 'ဆဲလ်'နှစ်ခြမ်းကွဲခြင်းဖြင့် မျိုးပွားပြီး 'ဖန်း'ပင်တို့က 'စပိုး'ဖြင့် မျိုးပွားသည်။ 'ကိုနီဗာ'ပင်တို့သည် အပင်လောင်းငယ်နှင့် အစာပါဝင်သော အစေ့ဖြင့် မျိုးပွားသည်။ မျိုးစေ့ဝှက် အပင် တို့တွင် မူ အစေ့တိုသည် အသီးခေါ် အစိတ်အပိုင်းအတွင်း၌ တည်ရှိသည်။



အထက်ပါ 'တရုတ်ခေါင်းလောင်းပန်း' အပွင့်၏ အလျားလိုက်ဖြတ်ပိုင်းပုံတွင် အပိုနှင့်အမ အင်္ဂါနှစ်မျိုးစလုံးကို တွေ့နိုင်သည်။ သန္ဓေအောင်ပြီးနောက် အစေ့အိမ်သည် အသီး (ယာ) ဖြစ်လာသည်။

အပွင့်တို့၏ခန္ဓာဗေဒ

မျိုးစေ့ဝှက်အပင်တို့သည် ဘဲစာပျော်ပင်ငယ်မှသည် အလွန်မြင့်သော ကျွန်းပင်ကြီးများအထိ အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ မြေပေါ်၊ ရေပေါ်နှင့် အခြားအပင်များပေါ်တွင် ပေါက်သည်။ သို့သော် အားလုံးပင် အပွင့်ဖြင့် မျိုးပွားသည်။

အပွင့်တိုင်းတွင် အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ အပင်အလိုက် ကွဲပြားသည်။ ပွင့်ဖူးကိုအစိမ်းရောင်ရှိသော ပွင့်ဖတ်များပါဝင်သည့် ပွင့်ဖတ်အုံက ကာရံထားသည်။ အပွင့်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော ပွင့်ချပ်တို့သည် တောက်ပသော အရောင် ရှိတတ်၏။ ဝတ်မှုန်အိတ်တွင် ဝတ်မှုန်အိတ်ရှိပြီး ၎င်းတွင် သန္ဓေအောင်မည့် အပိုဆဲလ်များထုတ်သော ဝတ်မှုန်များပါသည်။


မအင်္ဂါအုံ၏ ပြွန်သဏ္ဌာန်အပိုင်းထိပ်တွင် ဝတ်မှုန်များဖမ်းယူရန် စေးကပ်သော ဝတ်မှုန်ခံ ရှိသည်။ မျိုးပွားခြင်းဖြစ်စဉ်တွင် အပိုဆဲလ်များသည် ဝတ်မှုန်ခံမှ ဝတ်မှုန်ခံတိုင်တလျှောက် အစေ့အိမ်ရှိရာသို့ ဆင်းသက် သည်။

အပွင့် သို့မဟုတ် အပွင့်တစ်ခုကိုဆောင်သော အပင်အစိတ်အပိုင်းကို ပန်းခိုင်ဟု ခေါ်သည်။ နေကြာပန်းခိုင်တွင် အပွင့်များစွာ အစုလိုက်ရှိသဖြင့် အင်းဆက်ပိုး တကောင်ကပင် အားလုံးနှီးပါးကို ဝတ်မှုန်ကူးစေနိုင်သည်။

အပွင့်များစွာတို့သည် တပွင့်တည်းတွင် အပိုနှင့် အမပါသည့် ဒွိုလိင်များ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တပွင့်တည်း၌ပင် ဝတ်မှုန်ကူးပြီး သန္ဓေအောင်နိုင်သည်။

နေကြာတွင် တခိုင်တည်း၌ အပွင့်အပြောက်အပြား ပါဝင်သည်။ အပြင်ပိုင်းရှိ မြူသောအပွင့်ဝါဆိုက အင်းဆက်ပိုးများကို ဆွဲဆောင်သည်။ အလယ်ပိုင်းရှိ မျိုးအောင်နိုင်သောအပွင့်များကြောင့် ဝတ်မှုန်ကူးရန်လွယ်ကူစေသည်။

အင်းဆက်ပိုးဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးသော အပင်တို့သည် လေဖြင့်ကူးသော အပင်တို့ထက် ဝတ်မှုန်အရေအတွက် နည်းသည်။ ၎င်းတို့၏ မအင်္ဂါသည်လည်း ပိုမိုရှင်းလင်းသည်။




ဝတ်မှုန်ခံပေါ်သို့ကျရောက်သော ဝတ်မှုန်မှ ဝတ်မှုန်ပြွန်တံခု ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းပြွန်မှ အစေ့အိမ်အတွင်းသို့ လွှတ်ပေးလိုက်သော မျိုးဆဲလ်နှစ်ခုအနက် တခုက ဥဆဲလ်နှင့်ပေါင်းပြီး ကျန်တခုက အပိုနယူကလီယနှင့် ပေါင်းကာ အစေ့တွင်းစာ ဖြစ်ပေါ်သည်။ အစေ့များသည် အစေ့အိမ်အတွင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။

အစေ့များဖြစ်ပေါ်လာပုံ



အပွင့်ဆောင်ပင်တို့ မျိုးပွားခြင်းတွင် ပထမဆုံးအဆင့်မှာ ဝတ်မှုန်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်တူအပင်၏ ဝတ်မှုန်ခံပေါ်သို့ရောက်လာသော ဝတ်မှုန်သည် ပေါက်လာပြီး ဝတ်မှုန်ပြွန် ဖြစ်ပေါ် လာ သည်။ ၎င်းပြွန် သည် ရှည်လျားပြီး အပိုနယူကလီယ နှစ်ခုပါသည်။ သန္ဓေအောင်ချိန်တွင် အပိုနယူကလီယတခုနှင့် အစေ့လောင်းအတွင်းရှိ အမဥ နယူကလီယ တခုတို့ ပေါင်းစပ်သည်။ သန္ဓေအောင်ပြီးသော ဥမှအပင်လောင်း ဖြစ်လာသည်။ အစေ့အိမ်အတွင်းရှိ အစေ့လောင်းတခုလုံးမှ အစေ့ဖြစ်လာသည်။

နေကြာပန်း၏

စုပေါင်းအဆောက်အအုံ



ဆီထွက်နေကြာကို ပူနွေးသောနေ့ဥတုရှိသည့်ဒေသတိုင်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။



ပွင့်ညှာမဲ့ရေစိမ့်ပန်းခိုင်၏ အပွင့်များတွင် ရိုးတံမရှိပဲ ‘ရေစိမ့်’ ပန်းခိုင်၏ အပွင့်များတွင် ရိုးတံရှိသည်။ ရင်းတူထိပ်ညီ ပန်းခိုင်တွင် တနေရာတည်းမှ အပွင့်၏ရိုးတံအားလုံး ထွက်သည်။ ဦးခေါင်းငယ်ပန်းခိုင်၏ ရိုးတံများမှာ အပွင့်များတွင် ရိုးတံမရှိချေ။

‘မိုက်ခရိုစကုပ်’ ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ဝတ်မှုန်၏မျိုးစိတ်နှင့် ပျံ့လွင့်ပုံကို သိနိုင်သည်။ လေတွင် လွင့်ပါသည့် ဝတ်မှုန်တို့သည် သေးငယ်ပြီး မျက်နှာပြင် ချောမွေ့သည်။ ‘အင်းဆက်’ ပိုးများ သယ်ယူသည့် ဝတ်မှုန်တို့မှာ ကြီးပြီး မျက်နှာပြင် ကြမ်းသည်။

အစေ့မှ အပင်ပေါက်ခြင်း

သန္ဓေအောင်ပြီးသော အစေ့သည် ဖွံ့ဖြိုးရင့်မည်သည်။ ၎င်းသည် အစေ့ခွံဖြင့် ဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်။ စပါးကဲ့သို့သော အစေ့အချို့တွင် အစေ့တွင်းစာရှိသည်။ အစေ့တွင်းရှိ အပင်လောင်းတွင် အမြစ်လောင်း၊ အညွန့်လောင်းနှင့် အစေ့ရွက်တစ်ရွက် သို့မဟုတ် နှစ်ရွက်ပါသည်။

အန္တေးဓာတ်နှင့် အစိုဓာတ်ကို အချိုးအစားမှန်ရရှိလျှင် အစေ့မှအပင်ပေါက်သည်။ ပထမတွင် အစေ့၌ပါလာသော အစာကိုသုံးသည်။ အရွက်များဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ ၎င်းတို့က အပင်အတွက် အစာဖွဲ့စည်းသည်။



ပဲပုပ်စေ့ (ပဲ) အပင်ပေါက်သည့်အခါ အစေ့ရွက်နှစ်ရွက်ကို မြေပေါ်သို့ ပင့်တင်သည်။ ပြောင်း (ယာ) တွင် အစေ့ရွက်သည် မြေကြီးထဲ၌ကျန်ခဲ့သည်။ ပဲပုပ်တွင် အမြစ်လောင်းမှ ဘေးမြစ်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။ ပြောင်းတွင် မူခြားမြစ်များ ဖြစ်ပေါ်သည်။




‘မေပယ်’စေ့သည် လျင်မြန်စွာလည်ပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လွင့်ကျသည်။ သစ်မာနွယ်ပင်၏ အစေ့သည်ပါးလွှာသော အတောင်များဖြင့် လေတွင်လွင့်ပါနိုင်သည်။

အသီးများ

မက်မှုန်သီးကဲ့သို့သော အသီးစုံများသည် ပျော့ပျောင်းသော အခွံများရှိပြီး ရင့်မှည့်ချိန်တွင် မအက်ကွဲပေ။ ပဲသီးကဲ့သို့သော အသီးခြောက်များသည် ရင့်မှည့်ချိန်တွင် အသားမာသော သို့မဟုတ် အပျင်ထူသောအခွံများ ရှိသည်။

အခြားအသီးအမျိုးအစားများမှာ သရက်၊ ချယ်ရီကဲ့သို့သော အတွင်းခွံမာသီး၊ ပန်းသီးကဲ့သို့သော ပွင့်ရင်းသားဝင်သီး၊ စပျစ်ကဲ့သို့သော ‘ဗယ်ရီ’သီး စသည်တို့ ဖြစ်သည်။

အသီးအမျိုးအစား များစွာရှိသေးသော်လည်း အဓိကသိမှတ်ရန်မှာ အစေ့နှင့် ၎င်းကိုပိုးထားသော အခွံပါရှိသည့် အသီးဟုခေါ်သော အစိတ်အပိုင်းသည် မျိုးစေ့ဝက်အပင်တို့၏ အရေးပါသောအပိုင်းဖြစ်သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင် ရှေးကျသော အပင်များနှင့် ပိုင်းခြားပေးလိုက်သော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။



စေ့ရွက်စုံမျိုးရင်းများ

စေ့ရွက်စုံပင်များက စေ့ရွက်ထီးပင်များထက် ပိုများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စားသုံးသော ကော်ဖီ၊ ချောက်ကလက်၊ ပန်းသီး၊ အသုံးဝင်သည့် လှပသော အကွက်ပေါ်သစ်သားစသည်တို့ ရရှိနိုင်သည့် အပင်များအကြောင်းကို ရွှေစာမျက်နှာများတွင် တွေ့ရလိမ့်မည်။ မိုးမခပင်မှ အစ ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံး အပင် ပွင့်သည့် အရှေ့တောင်အာရှအပူပိုင်းဒေသရှိ ‘ရက်ဖလီဆီယာ’ ပင်အထိ မျိုးစုံရှိသည်။

ပင်လယ်ကမ္ဘီးမျိုးရင်း

ပင်လယ်ကမ္ဘီးပင်တို့သည် အပင်လောကတွင် ရွှေပြေးပင်များ ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်း ပင်လယ်ကမ်းခြေသောင်ပြင်များတွင် ပထမဆုံးပေါက်သော အပင်များ၌ ပါဝင်သည်။

ပင်လယ်ကမ္ဘီးပင်တို့သည် အမြဲစိမ်းသည်။ ထင်းရှူးပင်နှင့် တူသော်လည်း မျိုးစေ့ပေါ်အပင်မဟုတ်ပဲ စေ့ရွက်စုံပင်ဖြစ်သောကြောင့် အပွင့် ပွင့်သည်။ အဖိုပွင့်နှင့် သေးငယ်သည့် အနီရောင် အမျှင်စုကဲ့သို့သော အမပွင့်ရှိသည်။ မျိုးစိတ်ပေါင်း ၄၀-၅၀ အနက် အများစုကို ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။



မလေးရှားကျွန်းဆွယ် ကမ်းခြေသောင်စပ်၌ ပေါက်သော ပင်လယ်ကမ္ဘီးပင်



ငရုတ်ကောင်းပင်

ငရုတ်ကောင်းမျိုးရင်း

ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆားပြီးလျှင် ငရုတ်ကောင်းမှာ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်သည်။ ငရုတ်ကောင်းမျိုးရင်း၏မျိုးစိတ် ၁၃၀၀ ခန့်မှာ အပူပိုင်းဒေသချုပ်ပင် သို့မဟုတ် အသားထူသော သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်သည်။ အာရှရှိ နွယ်ပင်ဖြစ်သော ငရုတ်ကောင်းပင်၏ အတွင်းခွံမာသီး အခြောက်များမှ ငရုတ်ကောင်းမည်း ရရှိပြီး အစေ့မှ ငရုတ်ကောင်းဖြူ ရရှိသည်။

မိုးမခမျိုးရင်း

မိုးမခပင်တို့တွင် ရှည်လျား၍ ငိုက်ကျနေသော အကိုင်းများရှိသည်။ ‘ပေါ့ပလာ’ ပင်များ အပါအဝင် အခြားမျိုးစိတ် ၃၃၀ ခန့် ရှိသေးသည်။

မိုးမခပင်တို့သည် ရွက်ကြွေသစ်မာပင် သို့မဟုတ် ရွက်ထီးချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး ပွင့်ချပ်မရှိပဲ လိင်တမျိုးတည်းပါသည့် အပွင့်များရှိသည်။ မြောက်ဘက် သမပိုင်းရာသီဥတုများရှိသည့် ဒေသများ၏ မြစ်ကမ်းစပ်၌ ညွှန်တွင် အများအားဖြင့် ပေါက်သည်။ မျိုးစိတ်အနည်းငယ်ကို တန်ဖရာဒေသတွင် ချုပ်ငယ်များအဖြစ် တွေ့နိုင်သည်။




မိုးမခပင်သည် မြောက်ဘက်သမပိုင်းဒေသရှိ အရွယ်လတ်ချုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ထောင်မတ်သော ကြောင်မြီးပန်းခိုင် ရှိသည်။

မိုးမခပင် (၁) ကို ကမ္ဘာအနှံ့ စိုက်သည်။ ရှေးအခါက အက်စပရင်ကို မိုးမခအခေါက်မှ ထုတ်ယူသည်။ ယခုအခါ ဓာတုနည်းဖြင့် ဖော်စပ်သည်။ ဂျပန်ပေါ့ပလာပင် (ယာ) ဖြစ်သည်။ ပေါ့ပလာပင်တမျိုး၏ သစ်သားကို စက္ကူလုပ်သည်။

သစ်ကြားသီးမျိုးရင်း

သစ်ကြားသီးမျိုးရင်းဝင်အပင်တို့သည် မာကျောသောအခွံ၊ အရသာရှိသော အဆန်နှင့် လှပသော သစ်သားတို့ကြောင့် လူသိများသည်။


ဤမျိုးရင်းတွင် ရွက်ကြွေသစ်မာပင် မျိုးစိတ်ပေါင်း ၆၀ ရှိသည်။ အများအားဖြင့် မြောက်ဘက်သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။ ငှက်မွေးပုံအရွက်ရှိပြီး သေးငယ်သော အဖိုပွင့်နှင့် အမပွင့်တို့သည် တပင်တည်းပေါ်တွင် ရှိသည်။ ဤမျိုးရင်းဝင် အပင်အချို့၏ အရွက်များတွင် ပြင်းထန်သော အနံ့ ရှိသည်။



ဝက်သစ်ချမျိုးရင်း

အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ သမိုင်းနှင့်ပုံပြင်များတွင် ဝက်သစ်ချပင်လောက် အပါအဝင်များသည့်အပင်မရှိပေ။ ရှေးကျသော ဒဂူအစလူမျိုးတို့သည် ဝက်သစ်ချပင်ကို စွမ်းအားနှင့် တောင့်တင်းသန်မာမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကိုးကွယ်သည်။ ဝက်သစ်ချသားဖြင့် စစ်လေ့များ ဆောက်လုပ်သည်။

မျိုးစိတ် ၆၀၀ အနက် ‘ချက်စနတ်’ပင်၏ အသီးသည် အရသာထူးပြီး




ဗတ်မျိုးရင်း

‘ဗတ်’ မျိုးရင်းတွင် သစ်ရရှိသော အဖြူရောင်ဗတ်ပင်နှင့် ငွေရောင်ဗတ်ပင် များမှအစ ‘အော်လဒါ’ပင် နှင့် ‘ဟေဇယ်နတ်’ပင် အထိ အမျိုးမျိုး ပါဝင်သည်။ အချို့ဗတ်ပင်တို့၌ အလွှာလိုက် ခွာ၍ရသော ပါးလွှာနူးညံ့သည့် အခေါက်ရှိသည်။

မျိုးစိတ် ၁၀၀ စလုံးပင် ရွက်ကြွေသစ်မာပင်နှင့် ချုံပင်များဖြစ်ပြီး ဒေသရင်းမှာ မြောက်ဘက်သမပိုင်း ဒေသ ဖြစ်သည်။



အဖြူရောင်ဗတ်ပင်၏ အခေါက်




‘ဗီ’ပင်၏ သစ်သားမှာ အဖိုးတန်သည်။ ဝက်သစ်ချမျိုးစိတ်တို့သည် သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်ဖြစ်ပြီး ရွက်ကြွေ သို့မဟုတ် အမြဲစိမ်း ဖြစ်သည်။ အပွင့်တွင် လိင်တမျိုးတည်းသာ ပါသည်။ တွဲလဲကျနေသော ကြောင်မြီးပန်းခိုင်ပေါ်တွင် အဖိုပွင့်များကို တွေ့ရသည်။ အမပွင့်များမှာ တပွင့်ချင်း သို့မဟုတ် အစုငယ် အနေဖြင့်ရှိသည်။ အသီးသည် အခွံမာပြီး အစေ့တစေ့တည်းသာ ပါသည်။



အသီးများမှည့်နေသည့် ရွက်ကြွေသစ်မာပင် ဝက်သစ်ချမျိုးစိတ်၏ ဒေသရင်းမှာ ဥရောပ ဖြစ်သည်။

အဲလမ်းမျိုးရင်း


‘အဲလမ်း’မျိုးရင်းတွင် ပရိဘောဂပြုလုပ်ရန် သစ်ရရှိသော သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်များပါဝင်သည်။ ဥယျာဉ်မြက်ခင်းများတွင် အရိပ်ပင်အဖြစ် စိုက်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၅၀ တို့တွင် ရွက်လွှဲ ရွက်ထီးများ ရှိသည်။ အချို့မျိုးစိတ်တွင် လိင် တမျိုးတည်းပါသော အပွင့်ရှိပြီး အချို့တွင် ဒွိလိင်အပွင့်များရှိသည်။ လေ အကူ အညီဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးသည်။ ဒေသရင်းမှာ ကမ္ဘာ့မြောက်ဘက်ခြမ်း ဖြစ်သည်။



‘အဲလမ်း’ပင် တို့သည် သန်မာသော အရွယ် လတ်ပင် ဖြစ်သည်။ ပိုးတောင်မာများ သယ် ဆောင်လာသော ဒဏ်ချိ အဲလမ်းရောဂါ ကြောင့် ၁၉၇၅-၇၆ ခုတွင် အင်္ဂလန်ရှိ အဲလမ်းပင်များ ကွယ်ပျောက်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ ရသည်။

သမန်းမျိုးပင်များနှင့်သမန်းပိုး

သမန်းပင်တို့တွင် အပိုပွင့် အပပွင့်အပြင် မြုံသော အထူးအပွင့်တစ်မျိုး ရှိသေး သည်။ သမန်းပိုးမသည် ထိုအမြုံပွင့် ထဲတွင် ဥ ချသည်။ ဥမှ ပေါက်လာသော ပိုးကောင်လောင်းစားရန်ဖြစ်သည်။ သမန်းပိုးမသည် ဥရန် တပင်မှတပင် တပွင့်မှ တပွင့် ကူးယင်း အမပွင့်တို့ကို ဝတ်မှုန်ကူးပေးခြင်းဖြင့် မျိုးပွားရန် ကူညီသည်။ အပင်နှင့်သတ္တဝါတို့ တဦးနှင့်တဦး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို တွေ့ရသည်။



ဆေးခြောက်ပင်မှ လျှော်မှုန့်တို့ ကို ကြုံးကျပ်နိုင်သည်။ ထိုထိုင်း စေသည့် အာနိသင်ကြောင့် ၎င်း ကိုတချိန်က ဆေးဝါး မော်စပ်ရာ တွင်သုံးသည်။



‘တရုတ်ဟက်ဗယ်ရီ’ ပင်၏ခွံမာတစ်ခုသီးများသည်ရှေးခေတ်လူတို့အတွက် အရေးပါသော အစာဖြစ်ခဲ့ပုံရသည်။ ၁၉၂၉ ခုတွင် ပီကင်းမြို့အနီးရှိ ဂူအတွင်း၌ တွေ့ရှိခဲ့သော နှစ် ငါးသိန်းခန့်ရှိ ပီကင်းလူ ၏ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းနှင့် အတူ ဤအဲလမ်းပင်တို့၏ အစေ့ခွံ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများကို တွေ့ရသည်။



အိမ်တွင်း၌အသွဝိုက်လေ့ရှိသော အိန္ဒိယရာဘာပင် (ဝဲ) မှတချိန်ကရာဘာထုတ်ယူခဲ့ကြ၏။ သမန်းမျိုးဖြစ်သော ဤအမြုံစိမ်းပင်သည် လက်ခံပင်ကိုမျှီကာ သေစေ၏။အသားထူသည် သမန်းသီးမျိုး (ယာ) ကို အမှည့်ဖြစ်စေ၊အခြောက်ခံ၍ ဖြစ်စေ စားရ၏။

ပိုးစာမျိုးရင်း


ပိုးစာမျိုးရင်း၏ မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ မှ အစားအစာ၊ အဝတ်အထည်၊ ကြိုး၊ ရာဘာ နှင့် ဆေးခြောက် စသည်တို့ရှိသည်။ တရုတ်ပြည်ရှိ ပိုးစာမျိုးစိတ် တမျိုးကို ပိုးချည်ကောင်များကျွေးရန် အရွှေ့ တိုင်း၌ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ပေါင်မုန့်သီးပင်၊ ပိန္နဲပင်နှင့် ဘီယာရနံ့အတွက်သုံးသော ဗျစ်ပင်တို့သည် ပိုးစာမျိုးရင်းဝင်များ ဖြစ်၏။ နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာကပင် သမန်းသီးကို စားကောင်းဖွယ်ရာအဖြစ် တန်ဖိုးထားခဲ့ကြ၏။ အမြုံစိမ်း သမန်း မျိုးပင်ဖြစ်သော အိန္ဒိယရာဘာပင်ကို ၂၀ ရာစုမတိုင်မီအထိ ရာဘာစေးထုတ် ယူရန် အဓိကအားထားခဲ့ကြ၏။ သမန်းမျိုးပင်တို့သည် အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်သည်။ ၎င်းအပင်များစွာတို့မှ နို့စေးထွက်သည်။ လိင်တမျိုးတည်းပါသည့် သေးငယ်သောအပွင့်များ ပြွတ်သိပ် စွာ အစုလိုက်တည်ရှိသည်။ သမန်းမျိုးပင်တို့တွင် ပင်စည်သည် လုံးဝန်းလာပြီး အခေါင်းပေါက်ပါသော ပွင့်ရင်းခံဖြစ်လာသည်။ ၎င်းထိပ်ဘက်တွင် အပေါက် ပါရှိပြီး အတွင်းနံရံပေါ်တွင် အပွင့်ငယ်များ ရှိသည်။ သမန်းမျိုးပင် အားလုံး သည် ဝတ်မှုန်ကူးပေးသော သမန်းပိုးတမျိုးနှင့်အတူ ကြီးပြင်းသည်။ သက်ရှိ တို့ ရှင်သန်ရန် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အားထားပုံကို ဖော်ပြနေပေသည်။



ငှက်စွန့်ခဲ့သော သမန်းစေ့သည် လက်ခံပင်ပေါ်တွင် သစ်ကပ်ချုံပင် ပေါက်လာသည်။ ၎င်း၏လေးမြစ်များက လက်ခံပင်ကို တဖြည်းဖြည်း မျှီသတ်သည်။



ပိန္နဲပင်သည် အမြဲစိမ်းပင်လတ်ဖြစ်သည်။ အသီးသည် အနံ့ပြင်း၍ အရသာ ထူး၏။



ဖက်ယားပင်တွင် စူးလျှင်ယားစေသော အမွေးများရှိသည်။

‘ရေဖိ’ပင်၏ လျှော်မျှင်များကိုကြိုးကျစ်ရန် သုံးသည်။



စက္ကူပိုးစာပင်၏ အခေါက်ကို စက္ကူ ပြုလုပ်သည်။



ဗျစ်ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံ ရစ်ပတ်ချုံ့နွယ် ပင် ဖြစ်သည်။



ပေါင်မုန့်သီးပင်ကို ကစီပါရှိသည့်စားကောင်းသောအသီးအတွက် စိုက်သည်။

ဖက်ယားမျိုးရင်း

ဖက်ယားမျိုးရင်းဝင်အပင်တို့သည် ယားစေတတ်သဖြင့် မကိုင်ခံကြပေ။ ထို့ကြောင့် အပျက်အဆီးမခံရပဲ ကျန်နေတတ်သည်။ အချို့မျိုးစိတ်တို့၏ အရွက် နှင့်ပင်စည်များပေါ်ရှိ အမွေးထဲမှ အရည်သည် အရေပြားထဲသို့ဝင်လျှင် ယားယံစေသည်။ ဖက်ယားပွင့်တို့သည် သေးငယ်ပြီး လိင်တမျိုးတည်းသာ ပါသည်။

အချို့အပင်တို့မှာမူ သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်သော တနှစ်ခံ သို့မဟုတ် နှစ်ရှည်ခံပင်များဖြစ်ပြီး အသုံးဝင်သည်။ အပင်ငယ်များကို ချက်စားနိုင်သည်။ ရေဖိလျှော်မျှင်သည် ဂုန်လျှော်မျှင်ထက် သုံးဆပိုမိုခိုင်ခံ့သည်။

ကျီးပေါင်းမျိုးရင်း

အနောက်တိုင်းတွင် ကျီးပေါင်းပင်တမျိုးကို ခရစ္စမတ်အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရာတွင် သုံးသည်။ မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ မှာ ကပ်ပါးပင်များဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် အပူပိုင်းဒေသတွင် သစ်ပျော့ပင်နှင့် ချုံပင်များအသွင်ဖြင့် ပေါက်သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့် သတ္တုဓာတ်များကို လက်ခံပင်မှရယူပြီး အပင်အတွက် အစာ ပွဲစည်းခြင်းကိုမူ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်သည်။ ကျီးပေါင်းပင်တို့သည် ထူးခြားစွာပျံ့နှံ့တတ်သောကြောင့် ရုက္ခဗေဒအရ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ ငှက်၏နှုတ်သီးတွင် ကပ်ပါလာသော ကျီးပေါင်းစေ့မှ အခြားအပင်ပေါ်တွင် အပင်ထပ်ပေါက်နိုင်သည်။



‘မစ်စကမ် အယ်လဗမ်’သည် ခရစ္စမတ်အခမ်းအနားတွင်သုံးသော ကျီးပေါင်းမျိုးပင် ဖြစ်သည်။ ကျီးပေါင်းပင်၏ စုပ်ယူအာဂ်များကို လက်ခံပင်၏ အကိုင်းထဲတွင် တွေ့နိုင်ရန် ခွဲဖြတ်ပြထားသည်။ အရှေ့တိုင်း ကျီးပေါင်းတစ်မျိုး(ယာ)ဖြစ်သည်။

ဣဿရမူလီမျိုးရင်း

သစ်ပျော့ပင်နှင့် ရစ်နွယ်ချုပ်ပင်များဖြစ်သော ဣဿရမူလီမျိုးရင်းဝင် အပင်တို့တွင် အပုပ်နံ့ကဲ့သို့ အနံ့ပြင်းသော အပွင့်များရှိသဖြင့် ယင်ကောင်များကဝတ်မှုန်ကူးပေးသည်။ ၎င်းတို့၏အော်လန်ပုံအပွင့်ထဲသို့ ယင်ကောင်ဝင်မိလျှင် အတွင်းသို့ စိုက်လျက်ရှိသော အမွေးများက နှစ်ရက်ကြာဖမ်းထားလိုက်သည်။ အမွေးများနွမ်း၍ ယင်ကောင်လွတ်ထွက်နိုင်ချိန်တွင် အပွင့်မှာဝတ်မှုန်ကူးပြီးဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်း ဒေသတို့တွင်ပေါက်သော မျိုးစိတ် ၄၀၀ တို့၏ အပွင့်များမှာ များသောအားဖြင့် အညိုရင့်ရောင်ရှိသည်။

ရက်ဖလီဆီယာမျိုးရင်း

အရှေ့တောင်အာရှရှိ ‘ရက်ဖလီဆီယာ’ မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် တမျိုးသည် ကမ္ဘာတွင် အကြီးဆုံးအပွင့် ပွင့်သည်။ အပွင့်မှာ ကန့်လန့်ဖြတ် ဆင်တိမိတာ ၉၀ အထိ ကျယ်ပြီး အလေးချိန် ၈ ကီလိုဂရမ်ခန့် ရှိသည်။

မျိုးစိတ် ၂၇ မျိုးတွင် အရွက်လည်းမရှိ၊ ပင်စည်လည်းမရှိချေ။ အပင်တပင်လုံးကိုပင် အပွင့်ပွင့်ချိန်မှသာမြင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အုပ်ချည်မျှင်စုသဏ္ဌာန်ရှိသော ကပ်ပါးပင်ဖြစ်ပြီး တောထဲရှိ စပျစ်မျိုးရင်းဝင်နွယ်ပင်များ၏ ပင်စည်များအတွင်းတွင် ပေါက်သည်။ ပွင့်ဖူးသည် လက်ခံပင်၏ပင်စည်ကို ခွဲဖောက်ထွက်လာပြီး မပွင့်မီ ဂေါ်ဖီထုပ်အရွယ်အထိ ကြီးလာသည်။



ဣဿရမူလီ



‘ဒတ်ချ်ဆေးတံ’ ချုံနွယ်ပင်



ဆူမတ္တရာကျွန်းရှိ ကမ္ဘာတွင်အကြီးဆုံးအပွင့်ဖြစ်သော ရက်ဖလီဆီယာအပွင့်ကို ထိုင်နေသောလူနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြထားသည်။



ချဉ်သောအရသာရှိသည့်ဆီရယ်အရွက်များ



သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သော ‘မြက်ထုံးကြီး’ပင်



နံစား ပတ်ခဝိုပင်



အရှေ့အာရှရှိ ပတ်ခဝိုတစ်မျိုး



မြူပင်သည် အာရှ ဥရောပ၏ သမပိုင်းဒေသတို့တွင် ပေါက်သည်။



တရုတ်ပြည်ရှိ မြူပင်မျိုးပြား တမျိုးကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်အဖြစ် စိုက်ပျိုး၏။



ပတ်ခဝိုမျိုးရင်း

‘ပတ်ခဝို’ မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၈၀၀ တို့အနက် တမျိုးသည် အစားအစာတို့၏ ပင်ရင်းဖြစ်သည်။ အခြားနံစားပင်များ မရှင်သန်နိုင်သော ခြောက်သွေ့သည့် ဒေသရှိ မြေညှိတွင်ပေါက်နိုင်သည်။ ဂျုံကဲ့သို့ အစေ့ကိုကြိတ်ပြီး မုန့်ဖုတ်နိုင်သည်။ မျိုးစိတ်တမျိုးဖြစ်သော ဆီရယ်အရွက်ကို အစိမ်းစားနိုင်သည်။


မြောက်ဘက် သမပိုင်းဒေသရှိ သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်ပြီး ပင်စည်အုပ်ရွက်စွယ်ရှိသည်။ ပွင့်ချပ်မရှိပဲ အမြူရောင် သို့မဟုတ် ပန်းရောင်ပွင့်ဖတ်များ ရှိသည်။

မြူမျိုးရင်း

မြူမျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ခန့် ပါဝင်သည်။ အားလုံးသစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်ဖြစ်ပြီး မထင်ရှားသော အပွင့်များရှိသည်။ အရွက်များကို စားနိုင်သည်။ ဟင်းနုနယ်ပင်မှာ လူသိအများဆုံးဖြစ်သည်။ ယခင်ကသုံးသော သန်ချဆေးအတွက် အဆီကို မျိုးစိတ်တမျိုးမှ ရသည်။

စက္ကူပန်းမျိုးရင်း

စက္ကူပန်းမျိုးရင်းဝင်အပင်များသည် အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်ပြီး ဒွီလိင် ရှိသော အပွင့်ငယ်တို့ကို ဝန်းရံနေသည့် တောက်ပသောပွင့်ခံရွက်များရှိသည်။ စူးစမ်းရှာဖွေသူ ပြင်သစ်လူမျိုး တဦး၏အမည်ကိုယူ၍ ‘ဗူဂီနီဗီလီယာ’ဟု လည်း ခေါ်ကြ၏။ ညနေပိုင်းတွင်မှပွင့်သော ဤမျိုးရင်းဝင် အပင်တမျိုးကို လေးနာရီပန်းပင်ဟု ခေါ်သည်။



တောင်အမေရိကရှိ ရောင် ခုံလေး နှာ ရီ ပန်းပင် (ဝဲ)၊ အရားဇီးနိုင်ငံရှိ စက္ကူ ပန်းနွယ်ပင် (ယာ)

ဇော်မူးမျိုးရင်း

ဇော်မူးမျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၂၀၀၀ ရှိသည်။ အပွင့်များသည် လှပသည့် အပြင် သင်းပျံ့သောရနံ့ရှိသဖြင့် အခါနေရာမရွေး အသုံးဝင်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒေသရင်းမှာ မြောက်ဘက် သမပိုင်းဒေသဖြစ်ပြီး အပျားအား ဖြင့် သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။ သေးငယ်သော အရွက်များ ရွက်ဆိုင်အနေ အထား ရှိသည်။




ဥယျာဉ်စိုက်ပင် ပန်း ရောင် နှင့် အစိမ်းရောင် ‘ကက်ချ ဗလိုင်’၊ အရွယ်လတ်နှစ်နှစ်ခံပင် ‘ဝါးတား စတစ်ချပ်’




‘ဒိုင်ယန်သတ် ဗာဗေးတတ်’၊ ‘ဒိုင်ယန်သတ် ဂျပန်နီကတ်’

ပါစလိန်းမျိုးရင်း

‘ပါစလိန်း’မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၅၀၀ အနက် တမျိုးမှာ အမေရိကတိုက် များတွင် အဆိုးရွားဆုံးဥယျာဉ်ပေါင်းပင် ဖြစ်သည်။ ပါစလိန်းမျိုးပင်တို့သည် သစ်ပျော့ ပင်ဖြစ်ပြီး အသားထူသော အရွက်နှင့် သေးငယ်သော အပွင့် များ ရှိသည်။ အသီးမှာ ‘ကက်ပဆူး’ ဖြစ်သည်။ ဒေသ ရင်းမှာ မြောက်အမေရိက ဖြစ်သည်။



အပူပိုင်းနှင့်သမပိုင်း ဒေသပေါက် ပါစလိန်းပင် (ယာ)၊ အရားဇီးနိုင်ငံမှ ‘ပေါ်တူလက်ကာ ဂရန်ဒီဗလော်ရာ’ (အထက်)



မိဆင်ဗရိုင်ယန်သမမ်မျိုးရင်း

‘မိဆင်ဗရိုင်ယန်သမမ်’မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၆၀၀ ခန့်သည် တောင်အာဖရိကမှ ဖြစ်ပြီး ‘ကျောက်ခဲပင်’ခေါ် အပင်တစုပါဝင်သည်။ သဲကန္တာရပေါက် ၎င်း အပင်တစုသည် ကျောက်ခဲနှင့် တူသောကြောင့် ထိရုတ္တန်တို့၏ အစားမခံ ရချေ။ ၎င်းတို့၏ဒွီလိင်အပွင့်တွင် ပွင့်ချပ်မရှိပေ။ သို့သော် ဝတ်ဆံဖိုမြုံတို့က ပြောင်းလဲလာကာ ပွင့်ချပ်များကဲ့သို့ ဘေးဘက်တွင် ဝန်းရံနေသည်။ မျိုးအောင်နိုင်သည့် ဝတ်ဆံဖိုနှင့် မအင်္ဂါအုံများလည်း ရှိသည်။ ၎င်းအပင် တို့ကို ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်လေ့ရှိ၏။



ကျောက်ခဲပင်သည်တောင်အာဖရိက သဲကန္တာရ မှ အပင် ဖြစ်သည်။ ထုတ်ချင်းပေါက်မြင်နိုင်သော အရွက် ထိပ်များမှ တဆင့် နေရောင်ခြည် သည် အပင် အတွင်း သို့ ဝင်နိုင် သည်။ တနှစ်လျှင် တကြိမ် ပွင့်ပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ခန့် ကြာသည်။

‘ရေခဲပင်’တွင် ရေသိုလှောင်သော အရွက်များ ရှိသည်။ ရာသီဥတုဒဏ် ခံနိုင်သည်။

ကြာမျိုးရင်း

ရေကန်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ကျက်သရေရှိသော ကြာပွင့်ကြီးများသည် ကြည်နူးဖွယ် မြင်ကွင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ကြာပင်တမျိုးမှာ အိန္ဒိယနှင့်တရုတ်ပြည်တို့တွင် အထွတ်အမြတ်ထားသော ပဒုမ္မာကြာ ဖြစ်သည်။အချို့ဒေသများတွင် ၎င်းကို စားသည်။

မျိုးစိတ် ၉၀ တို့သည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ပေါက်သည်။ ရေတိမ်တွင်သာပေါက်သော သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ လေခိုရန်နေရာများပါဝင်သည့် ရိုးတံရှည်ရှိသည်။ အရွက်နှင့် အပွင့်များသည် ရေပေါ်တွင် ပေါလောပေါ်နေသည်။ အပွင့်တွင် ပွင့်ချပ်၊ ဝတ်ဆံဖိုနှင့် မအင်္ဂါအုံများစွာ ရှိသည်။ 'ရိုင်ဇမ်း' များသည် ရေအောက်ရှိ ရွှံ့ထဲတွင် အလျားလိုက် ဖြာထွက်နေသည်။



အမေဇုန်ဒေသရှိ 'ဂျိုင်းယင့်ဝါးတားလီလီ' ကြာပင်၏ အရွက်ကြီးများ



'ပစ်ဂမီဝါးတားလီလီ' ကြာပွင့်သည်တနွေလျှင် လေးနာရီခန့်သာ ပွင့်သည်။



အသီး၊
ရိုင်ဇမ်း ဖြတ်ပိုင်း၊
ရိုင်ဇမ်း

ပဒုမ္မာကြာတွင် စားကောင်းသော ခွံမာတစ်စေ့သီးနှင့် ရိုင်ဇမ်း ရှိသည်။

ဗတ်တာကပ်မျိုးရင်း

'ဗတ်တာကပ်' မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ တို့သည် အမြင်လှသောလည်း အလွန်ပူပန်သော အရသာရှိသည်။ မျိုးစိတ်များစွာတို့သည် အဆိပ်ဖြစ်စေတတ်သည်။ 'အေကွန်နီတမ်' နှင့် 'ဟယ်လီဗိုရတ်' မျိုးစုနှစ်ခုကို ဆေးဝါးထုတ်ရန် သုံးသည်။

အများအားဖြင့် တနှစ်ခံ သို့မဟုတ် နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချို့မှာ ချုံပင် သို့မဟုတ် နွယ်ပင်ဖြစ်သည်။ သမပိုင်းဇုန်တွင်ပေါက်ပြီး ဒွိုင်လိုင်အပွင့်ရှိသည်။ အသီးများ အပြတ်လိုက် သီးသည်။



အရှေ့အာရှရှိ 'အေဒိုနစ် အေမုရင်းဆစ်'



ဂျပန်နိုင်ငံရှိ 'အင်နိုမိုနို ရက်ဒီယာနာ'


အက်ကီးဗီးယားမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၂၀ သာ ပါဝင်ပြီး ဒေသရင်းမှာ အရှေ့အာရှနှင့် တောင်အမေရိက ဖြစ်သည်။ ချုံနွယ်များဖြစ်ပြီး စားကောင်းသောအသီးများ ရှိသည်။

'အက်ကီးဗီးယား' မျိုးရင်းဝင် အပင်များတွင် ရွက်ပြာခုနစ်ခုအထိပါဝင်သော ရွက်ပေါင်းများ ရှိသည်။ ဒွိုင်လိုင်နှင့် လိုင်တမျိုးတည်းပါသော အပွင့်နှစ်မျိုးစလုံး ရှိသည်။ မျိုးစိတ်အလိုက် အဖိုပွင့်၊ အမပွင့်တို့ကို တပင်တည်း သို့မဟုတ် သီးခြားတပင်စီပေါ်တွင်တွေ့ရသည်။ အချို့တွင် ပွင့်ချပ်မရှိသော်လည်း ပွင့်ဖတ်ရှိသည်။



အသီးစားရသော 'အက်ကီးဗီးယား' ထရိုင်ဖိုလီယေးတား'



အဖိုပွင့်၊ ဝတ်ဆံဖိုများ၊ ပွင့်ဖတ်၊ မအင်္ဂါအုံများ

'အက်ကီးဗီးယား' ကွင်းနေးတား' သည် အရှေ့အာရှရှိ ချုံနွယ်ပင် ဖြစ်သည်။



မေလတွင်ပွင့်သည့် မျိုးယဉ် 'ကလမ်မက်တစ်' ပင်



တရုတ်ပြည်ရှိ 'ပီအိုနီ' သစ်မာပင်



'ကလမ်မက်တစ်' ဗလော့ရီဒါ'



'ကလမ်မက်တစ်' ပေတင်'

ဗာဗယ်ရီမျိုးရင်း

‘ဗာဗယ်ရီ’ မျိုးရင်းဝင် ဗာဗယ်ရီပင်ကို ဥရောပနှင့် ဗြိတိန်တွင် အသီးစားရန် စိုက်ပျိုးခဲ့သော်လည်း ဂျပန်တွင် သံချေးမှု ရောဂါဖြစ်စေသော မိုပင်ပေါက် သည့် လက်ခံပင်ဖြစ်သောကြောင့် ဖျက်ဆီးပစ်ရသည်။


မျိုးစိတ် ၂၀၀ တို့သည် သစ်ပျော့ပင်နှင့် ချုံပင်များဖြစ်ပြီး ဒေသရင်းမှာ ပြောက်ဘက်သမပိုင်း ဖြစ်သည်။ ရွက်လွှဲ၊ ရွက်ထိး သို့မဟုတ် ရွက်ပေါင်းနှင့် ‘ဗယ်ရီ’သီး ရှိသည်။ အပွင့်အပွင့်လျှင် ဝတ်ဆံဖို ၁၈ ခုအထိ ပါသည်။



ဂျပန်ဗာဗယ်ရီပင်သည် ကုန်းမြင့်တွင် ပေါက်သော လှပသည့် ချုံပင်ဖြစ်၏။




‘မဟော်နီယာ ဂျပန်နီကာ’ သည် ချုံပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး အပွင့်သည် အလွန် မွှေး၏။



‘ဗယ်ရင်ဝပ်’ ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံ သစ်မာပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး လှပသော အပွင့်များ ရှိသည်။ ဒေသရင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။

တတိုင်းမွှေးမျိုးရင်း

အမြဲစိမ်းသော တတိုင်းမွှေးမျိုးပင်သည် ကြီးမားအုပ်ဆင်းပြီး မွှေးသောအပွင့် များ ပွင့်သည်။ ဒေသရင်းမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းဒေသအတွက် အထိမ်းအမှတ်ဆောင်အပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၀၀ အနက် အများစုသည် သစ်မာပင်၊ ချုံပင်များဖြစ်ပြီး ဒေသရင်းမှာ အာရှဖြစ်သည်။ အပွင့်ကြီးတို့တွင် အရောင်တူသော အစိတ်အပိုင်းများစွာ ပါဝင်သည်။ မျိုးစေ့၌ အပင်တို့၏ ရှေးအကျဆုံးအပင်များဟူ၍ မှတ်ယူကြသည်။



‘မက်ဂနိုလီယာ ကိုဗတ်’ တောင်ပေါ်ပေါက်ချုံပင်၏ ဒေသရင်းမှာ ဂျပန်ကျွန်း များ ဖြစ်သည်။



‘ကျူးလစ်’ ကဲ့သို့ အပွင့်များရှိသော တတိုင်းမွှေးမျိုးရင်းဝင် ကျူးလစ် သစ် မာပင် ဖြစ်သည်။



‘မိုက်ချီလီယာ ဖီဂို’ သည် အမြဲစိမ်းသစ် မာပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး ငှက်ပျော့နဲ့မွှေးသော ပွင့်ဖူးများ ရှိသည်။



‘မက်ဂနိုလီယာ လီလီဖလော်ရာ’



‘မက်ဂနိုလီယာ ဂရန်ဒီဖလော်ရာ’

ဩဇာမျိုးရင်း

ဩဇာမျိုးရင်းဝင်မျိုးစိတ် ၈၅၀ တို့သည် အပူပိုင်းဒေသရှိ သစ်မာပင်၊ ချုံပင် နှင့် ချုံနွယ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်များစွာတို့တွင် အနံ့ရှိသောအရွက်၊ အခေါက်နှင့် အပွင့်ကြီးများ ရှိသည်။

အပွင့်တွင် ဝတ်ဆံဖိုနှင့် မအင်္ဂါအုံများစွာရှိသည်။ 'ဗယ်ရီ' သီးများကိုသီးခြား ဖြစ်စေ၊ စုပေါင်းတွဲဆက်လျက်ဖြစ်စေ တွေ့ရသည်။



ဩဇာပင်သည် အနောက် အိန္ဒိယကျွန်းစုနှင့် အပူပိုင်းအမေရိကမှ အခြား အပူပိုင်းဒေသများသို့ ရောက်ရှိသည်။

ဇာတိပွိုလ်မျိုးရင်း

ဇာတိပွိုလ်သည် အရှေ့ပိုင်း အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပေါက်သော ဇာတိပွိုလ်ပင်၏ အစေ့ဖြစ်သည်။ အစေ့ဖုံးကို အခြောက်ခံပြီး အမွေးအကြိုင် ဇာပွင့်အဖြစ် သုံးသည်။ မျိုးစိတ် ၂၅၀ တို့မှာ အမြဲစိမ်းချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။ အနံ့ရှိသောသစ်သားနှင့် အနီရောင်သစ်ရည်ရှိသည်။ ရွက်ထိပ်ဖြစ်ပြီး အဖိုပင်၊ အမပင် သီးခြားဖြစ်သည်။ အစေ့တွင် ကြက်သွေးရောင်အစေ့ဖုံးရှိသည်။



ဇာတိပွိုလ်ပင်၏ ကြက်သွေးရောင်အစေ့ဖုံးရှိသော အစေ့ကို အသီးထဲတွင် မြှင်နိုင်သည်။

လော်ရယ်မျိုးရင်း

'လော်ရယ်' မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၁၁၀၀ တွင် သစ်ကြံပိုး၊ ပရုတ်နှင့် ထောပတ်သီးပင် တို့ ပါဝင်သည်။ အနံ့ ရှိသောချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင် များ ဖြစ်သည့် လော်ရယ်ပင်များ၏ ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်း အရှေ့တောင် အာရှ ဖြစ်သည်။ ဒွီလိင်ရှိ သော အပွင့်ငယ်များနှင့် အတွင်းခွံမာသီး သို့မဟုတ် ဗယ်ရီသီးရှိ၏။ ထောပတ်သီးတွင် ဆီနှင့် ဗီတာမင် များစွာပါဝင်၏။ ဟင်းခတ် အမွေးအကြိုင်ဖြစ်သော သစ်ကြံပိုးခေါက် သည် အိန္ဒိယနှင့် သီရိလင်္ကာတို့မှ အများ အပြား ထွက်သည်။



အဖိုပွင့်



အမပွင့် (ဝဲ)

အသီး

လော်ရယ်ပင်၏ အရွက်ကို ဟင်းခတ် အမွေး အကြိုင် အဖြစ် သုံး၏။ ၎င်း၏ ဒေသရင်းမှာ မြေထဲ ပင်လယ်ဒေသ ဖြစ်သည်။



'မင်ဇိုင်း' သစ်မာပင်



ပရုတ်ပင်



ဆီများသည့် အမြဲစိမ်း ထောပတ်သီးပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အမေရိက အပူပိုင်းဒေသများ ဖြစ်သည်။



ဟင်းခတ် အမွေးအကြိုင် ရရှိသော သစ်ကြံပိုးပင်

ပေါ်ပီမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၂၅၀ အနက် ဘိန်းပင်ကိုသာ ထိုင်းမှိုင်းဆေးအတွက်စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ၎င်းဆေးသည် ရှေးအခါကပင် ဆေးဝါးပေးစပ်ရာ၌ အရေးပါခဲ့သည်။ ရှေးနှစ်ရာပေါင်းများစွာကတည်းကပင် ဘိန်းပင်ကို အာရှ၌ စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။

ဘိန်း၊ ‘မော်မင်း’ နှင့် ‘ဟီးရီးအင်း’တို့ကို တရားဝင် ဆေးဝါး အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တားမြစ်ထားသော မူးယစ်ဆေးဝါး အဖြစ်လည်းကောင်း သုံးစွဲကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးတို့၏ အဓိကအန္တရာယ်မှာ ဆေးခွဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။

ဆေးခွဲသည့်အခါ အဆင့်ဆင့်တိုး၍သုံးစွဲပြီး နောက်ဆုံးတွင် သေသည်။ ထိုင်းမှိုင်းခြင်းမရှိသော ပေါ်ပီစေ့များကို အစားအစာ ရနံ့သင်းစေရန် သုံးသည်။ ၎င်းတို့မှ ဆီရသည်။

အခြားပေါ်ပီမျိုးတို့မှာ ကာလိဖိုးနီးယားပြည်နယ်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သော ရွှေရောင်ပွင့်သည့် ပေါ်ပီနှင့် ဥရောပ စစ်တလင်းပြင်များကို ဖုံးလွှမ်းခြင်းဖြင့် စစ်၏အနံ့ဉာရုံကို အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့သော ‘ပြောင်းပေါ်ပီ’တို့ဖြစ်သည်။



နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း ပျောက်စေသော မော်မင်း နှင့် အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော ဟီးရီးအင်းများ ထွက်သည့် ဘိန်းပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို တူရကီပြည်နှင့် ‘ရွှေကြိတ်နယ်မြေ’ဟုဆိုသော ထိုင်း၊ လောနှင့် မြန်မာနယ်စပ်တွင် စိုက်ပျိုးသည်။



အရှယ်လတ် နှစ်နှစ်ခံပင် ‘ကိုရိုဒဲလစ် အင်ဆိုက်ဆာ’



နှစ်ရှည်ခံ ‘ငှက်တောင်ပေါ်ပီ’ပင်



ရွှေရောင်ပွင့်သောတနှစ်ခံ ‘ကာလိဖိုးနီးယား ပေါ်ပီ’ပင်



အဆိပ်ဖြစ်စေသော လိမ္မော်ရောင် နို့စေးထွက်သည့် ‘ဂရိတ်တား ဆယ်လန်ဒိုင်း’ပင်

ဂေါ်ဖီထုပ်မျိုးရင်း

အလွန်အရေးပါသော မျိုးရင်းကြီးဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၂၅၀၀ တွင် ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းမုန်လာ၊ မုန်လာ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။

သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး ရွက်လွှဲအနေအထားရှိသည်။ အစုလိုက်ပွင့်တတ်သော အပွင့်တိုင်းတွင် ပွင့်ပတ်၊ ပွင့်ချပ်နှင့် ဝတ်ဆံဖိုလေးခုစီရှိပြီး ကြက်ခြေပုံအနေအထားရှိသည်။ အချို့မျိုးစိတ်ကို အလှစိုက်သည်။



နှစ်ပွင့်ထပ်ရှိသော ‘စတော့’ပင်



စားသုံးနိုင်သော ရေစမုန်ပင်



ဂေါ်ဖီထုပ်ပင်သည် နှစ်နှစ်ခံ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အရွက်များသည် အရည်ရွှမ်း၊ အသားထူပြီး စားကောင်းသည်။

ရေတကောင်းမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်တို့သည် အာရှအပူပိုင်း၊ မဒါဂါစကာနှင့် ဩစတြေးလျ မြောက်ပိုင်းတို့တွင် ပေါက်သည်။ အရွက်များသည် ရေတကောင်းပုံသဏ္ဌာန် ရှိသည်။ ၎င်းအတွင်းတွင် ရေခံထားနိုင်သည်။ ‘အင်းဆက်ပိုးကိုလည်း ထောင် ဖမ်းပြီး ကြေညက်စေနိုင်သည်။ အရွက်တရွက်စီတွင် ရွက်ပြားပိုင်း၊ နှာမောင်း ပိုင်းနှင့် အဖုံးပါသည့် ရေတကောင်းသဖွယ် အပိုင်းတို့ပါဝင်သည်။ အင်းဆက် ပိုးသည် ရေတကောင်းအဝမှ ဝင်လာသောအခါ အတွင်းသို့လိပ်ကျပြီး ရေနစ် သေဆုံးသည်။ ထိုအခါ အစာခြေအာက်ဆစ်များက အင်းဆက်ပိုးကို ကြေညက် စေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤမျိုးစိတ်များကို သားစားပင်များဟု ခေါ်သည်။



မလေးရှားတောင်တန်းများပေါ်တွင်ပေါက်သော ရေတကောင်းပင်

နေနှင့်ပေါက်မျိုးရင်း

ဗီးနပ်ထောင်ချောက်ပင်သည် ထူးဆန်းသော ‘ဒရော်ဆာရေးစီး’ မျိုးရင်းဝင်မျိုးစိတ် ၁၀၀ တွင် ပါဝင်သည်။ ၎င်း၏အရွက်ပေါ်ရှိ ခလုတ် မွေးရည်တခုခုကို အင်းဆက်ပိုး ထိလိုက်လျှင် ရွက်ပြားနှစ်ခြမ်းပိတ်သွား၏။ ထိုအခါ အရွက်ရှိ အဖုများမှ ထွက်လာသော အစာခြေအာက်ဆစ် များက အင်းဆက်ပိုး၏ ပျော့သောအပိုင်းများ ကို ကြေညက်စေ၏။ ခြေထားသော အရည်ကို အရွက်က စုပ်ယူပြီး သောအခါ ရွက်ပြား နှစ်ခြမ်း ပြန်ပွင့်လာပြီး အင်းဆက်ပိုးအခွံကို စွန့်ထုတ်၏။ နေနှင့်ပေါက်ပင်တွင် အရွက် ပေါ်ရှိ စေးကပ်သော အမွေးငယ်များက အင်းဆက်ပိုးလာနားလျှင် ဖမ်းထားနိုင်၏။ အများအားဖြင့် ဩစတြေးလျတွင် ပေါက် သော သားစားသစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။




သစ်ပုပ်ညွန့်များထဲတွင် ပေါက် သော နေနှင့်ပေါက်ပင်



ရွက်ကျပင်ပေါက်မျိုးရင်း

ရွက်ကျပင်ပေါက်မျိုးရင်းဝင်အပင်တို့ကို ဩစတြေးလျနှင့် တောင်အမေရိကမှ လွဲ၍ ပူပြင်းခြောက်သွေ့သော ဒေသတိုင်းတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ရေသိုလှောင်သည့် ဖယောင်းဆန်သော အရွက်ထူများရှိသည်။ ဤနှစ်ရှည်ခံ သစ်ပျော့ပင်တို့သည် ပင်စည်မှဖြစ်စေ၊ အရွက်တရွက်မှဖြစ်စေ အပင်သစ်ပေါက်နိုင်သည်။



ရွက်ကျပင်ပေါက်၏ ဒေသရင်းမှာ မဒါဂါစကာမြစ်ပြီး ယခုအခါ အပူ ပိုင်းဒေသများတွင် ပေါက်သည်။ ၎င်းသည် ဆေးဖက်ဝင်သည်။



အရှေ့မြောက်အာရှ ကျောက်ထူထပ်သည့် နေရာရှိ ‘ဆီဒန် ကန့်ရှာတိကမ်’



ပဒုမ္မာကြာနှင့်တူသော အရွက်ရှိသည့် ‘ဂျပန် ဆီဒန်’ပင်




နှစ်ရှည်ခံ ‘ဟောက်စလီ’ ပင်သည် ရွက်ကျပင်ပေါက် မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ဥရောပရှိ ကျောက်ထူထပ်သောနေရာတို့တွင် ပေါက်သည်။

အမေရိကန်အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ညွန့်များတွင်ပေါက်သော ဗီးနပ်ထောင်ချောက် ပင် ဖြစ်သည်။ စားထားသော ပိုးနားသန်ကောင်၏အခွံကို ပုံတွင်တွေ့နိုင်သည်။



တွားသွားသော 'ဆက်ကဇီဖရက်' ပင်၏ အကိုင်းမှ အမြစ်ထွက်တွယ်ပြီး အပင်သစ် ပေါက်သည်။



ခြောက်လပန်းပင်သည် ပူနွေးသော သမပိုင်းဒေသများတွင် ပေါက်သည်။



'ပါနက်ဆတ်' မြက်ပင်သည် သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။



'ခွဇီယာပင်' သည် အရှေ့အာရှရှိ ချုံပင်ငယ် ဖြစ်သည်။



နဂွံပင်သည် ဆူးရှိသော ချုံပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး အသီးကို ယိုလုပ်နိုင်သည်။ အစိမ်းစားနိုင်သည်။

ကျောက်ခွဲမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၁၂၀၀ တို့သည် ကျောက်ထူထပ်သော တောင်များ ပေါ်တွင် ပေါက်ပြီး အမြစ်များက ကျောက်တုံးများကို အက်ကွဲစေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောက်ခွဲပင်ဟုခေါ်သည်။ အချို့ မျိုးစိတ်များကို ဥယျာဉ်တွင် စိုက်သည်။ လူသိအများဆုံးမှာ ခြောက်လပန်းပင် ဖြစ်သည်။ ပန်းရောင် သို့မဟုတ် အပြာနုရောင် အပွင့်များ ပွင့်သည်။

ကျောက်ခွဲပင်၏အရွက်တို့သည် နှင်းဆီပွင့်ပုံ အနုအသားရှိသည်။

ဝစ်ဟေဇယ်မျိုးရင်း

အယူသည်းမှုများကြောင့် 'ဝစ်ဟေဇယ်' (ရုန်းမဟေဇယ်) အမည်ရလာခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ ဤအပင်၏ ခက်ရင်းခွပုံအကိုင်းသည် မြေအောက်ရေရှိသည့် နေရာသို့ရောက်လျှင် အောက်ဘက်သို့ ထိုးစိုက်ကျခြင်းဖြင့် ရေကြောရှာဖွေရန် အသုံးဝင်သည်ဟု အယူရှိကြ၏။


'ဟေဇယ်' ပင်တို့ကို လိမ်းဆေး ဖော်စပ်ရာတွင် သုံးသည်။

ဝစ်ဟေဇယ်မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၁၀၀ ခန့်ရှိပြီး ရွက်ထိး၊ ဒွါလိုင် သို့မဟုတ် လိုင်တမျိုးတည်းသာပါသော အပွင့်များ ရှိသည်။

ပလိန်းမျိုးရင်း

'ပလိန်း' မျိုးရင်းတွင် ပြောက်အမေရိကနှင့် အနောက်အာရှရှိ သစ်မာပင်များ ပါဝင်ပြီး မျိုးစိတ်ရှစ်ခုသာရှိသည်။ ပလိန်းပင်ကို အလွှာကြီးများအဖြစ် ကွာထွက်သောအခေါက်ကြောင့် လူသိများသည်။

'လန်ဒန်ပလိန်း' ပင်ကို ပြောက်ဘက်သမပိုင်းဒေသတွင် စိုက်သည်။



သမပိုင်းဒေသရှိ ဝစ်ဟေဇယ်ပင်ကို အလေ့ကျပေါက်ပင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဥယျာဉ်စိုက် ချုံပင် အဖြစ်လည်းကောင်း တွေ့ရသည်။

ကြံ့ခိုင်ပြီး ကြည့်ကောင်းသော ပလိန်းပင်ကို တောင်ပိုင်းဥရောပတွင် လမ်းဘေးတလျှောက်စိုက်သည်။



ဆောင်းဟေဇယ်ပင်သည် ဥယျာဉ် စိုက်ချုံပင် ဖြစ်သည်။



လန်ဒန်ပလိန်းပင်ကို လမ်းဘေး တလျှောက်တွင် စိုက်သည်။

နှင်းဆီမျိုးရင်း

နှင်းဆီမျိုးရင်းကြီးတွင် မျိုးစိတ် ၃၂၀၀ ပါဝင်သည်။ နှင်းဆီသမ္မက သစ်တော၊ စထရော်ဗယ်ရီ၊မက်မုန်း၊ မက်မန်း၊ ချယ်ရီ၊တရုတ်နှင်းသီးပင်၊ ပန်းသီးပင်တို့လည်း ပါဝင်သည်။

ကမ္ဘာအနှံ့၌ပင် နှင်းဆီကို သိချင်း၊ ပုံပြင်နှင့် ကြည်နူးဖွယ်ဇာတ်လမ်းများတွင် ထည့်လေ့ရှိသည်။နှင်းဆီဆိုလျှင် လှပသည့်အပွင့်ကိုသာ မြင်ကြသည်။ သို့သော် အပွင့်ပင်များသမ္မက သမပိုင်းရှိ အသီးပင်အများစုလည်း ဤမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ သစ်ပျော့ပင်၊ ချုပ်နှင့် သစ်မာပင် သုံးမျိုးစလုံးရှိသည်။

အရွက်တို့သည် ရွက်လွှဲအနေအထားရှိပြီး ရွက်စွယ်ပါသည်။ အပွင့်သည် ဒွီလိင်ဖြစ်ပြီး ဝတ်ဆံဖို အမြောက်အမြားရှိ၏။ မအင်္ဂါအံ့အရေအတွက်သည် တပင်နှင့်တပင် ကွာခြားသည်။ မျိုးစိတ်အနည်းငယ်သည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်တတ်၏။ သို့သော် နှင်းဆီပင်တိုင်း ဆူးချွန်များပါသဖြင့် အန္တရာယ်ရှိသည်။



‘ကွင်းအယ်လီဘောက်’ နှင်းဆီသည် မျိုးစပ်ပင် ဖြစ်သည်။



‘ဂရေ စမူးပီ’ နှင်းဆီသည်လည်း မျိုးစပ်ပင် ဖြစ်သည်။



‘စပိုင်ရီယာ ပရူနိုဖိုလီယာ’သည်ရွက်ကြွေချုပ်ငယ် ဖြစ်သည်။




အိန္ဒိယ စထရော်ဗယ်ရီပင်တွင် အရသာမရှိသော အသီးများ ရှိသည်။



‘ဂျပန် ကွင့်’ပင်တွင် လှပသောအနီရောင်အပွင့်များ ရှိသည်။




‘ဟော် သွန်’ ပင် တွင် စားကောင်းသည့် အသီးရှိသည်။



ဝဲဘက်မှ ယာဘက်အထိ ပုံများတွင် ပန်းသီးပင်များ၏ အပွင့်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ စားရသော အသီးများဖြစ်ပေါ်လာပုံကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပွင့်ခြားဝတ်မှုန်ကူးပေးခြင်းဖြင့် ပိုမို အရည်အသွေးကောင်းသော ပန်းသီးများ ရရှိနိုင်သည်။ ‘ဂိုးလဒင်းဒီလီရှပ်’ (ဝဲ) နှင့် ‘စတားကင်း’ (ယာ) ကဲ့သို့သော မျိုးပြားများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။



‘ခွေးနှင်းဆီ’ သည် အင်္ဂလန်၏ အမျိုးသားပန်း ဖြစ်သည်။



တရုတ်နှင်းသီးပင်သည် အပူလျော့ပိုင်းရှိ အမြဲစိမ်း ချုံပင်ငယ် ဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင်ပွင့်ပြီး နွေဦးရာသီတွင် သီးသည်။



နွေဦးရာသီတွင်ပွင့်သော တောင်ကုန်းချယ်ရိပ်ကို လူသိများသည်။ မှည့်နေသော ချယ်ရီသီးများ (ယာ) ဖြစ်သည်။



မက်မုန်ပင်ကိုပူဇွန်းသော သမပိုင်းဒေသများတွင်စိုက်သည်။လက်ယာဘက်တွင် အမွေး ထူအသီး၊ လက်ဝဲဘက်တွင် ပန်းရောင်အပွင့်များ ဖြစ်သည်။



အရှေ့တိုင်းသစ်တော်သီးပင် (အထက်) တွင် လုံးဝန်းသော အသီးရှိသည်။ အနောက် တိုင်း သစ်တော်သီးမှာမူ အညွှာဘက်တွင် ရှည်ထွက်နေသည်။ အသီးများသည်ချို၏။



တရုတ်ပြည်ဒေသရင်းဟု ယူဆရသော တရုတ်နှင်းသီးပင်ကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အစိုက် များသည်။ အသီးကိုအစိမ်းဖြစ်စေ၊ ယိုလုပ်၍ဖြစ်စေ စားနိုင်သည်။




‘ပရူနတ် ဒိုမက်စတီကာ’ မက်မန်းမျိုးသည်ရွက်ကြွေသစ်မာပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး စားကောင်း သော အသီးရှိသည်။ အသီး (ယာ) ကို အစိမ်းဖြစ်စေ၊ အခြောက်ပြုလုပ်၍ ဖြစ်စေ စားနိုင်သည်။ အပြွေရောင်အပွင့်များ(ဝဲ)ဖြစ်သည်။



‘ပရူနတ် မူမီ’ (ဝဲ) တွင် အပွင့်ကြွေပြီးနောက် အစေ့အိမ်မှ အသီး ဖြစ်လာသည်။ ရင်းသည် ‘ပရူနတ် တိုမင်တိုဆာ’ ၏ အသီး (ယာ) နှင့် တူသည်။



စထရော်ဗယ်ရီပင်သည် နိမ့်သဖြင့် အသီးသန့်ရှင်းစေရန် အပင်အောက်တွင် ကောက်ရိုးပုံးပေးရသည်။



စထရော်ဗယ်ရီပင်စည်အဆစ်မှ အမြစ်များ ထွက်သည်။ အမေရိကန်တောင်ပိုင်းတွင် အဓိကစိုက်သည်။



‘ရတ်ဗယ်ရီ’ ပင်သည် ဆူးရှိသော ချုံဖုတ်ပင် ဖြစ်သည်။ ‘ရူးဗတ်’ မျိုးစုဝင် ဖြစ်သည်။

ပဲမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၁၃၀၀၀ ရှိသော ပဲမျိုးရင်းသည် နေကြာနှင့် သစ်ခွံမျိုးရင်းများ ပြီးလျှင် တတိယအကြီးဆုံး မျိုးရင်းဖြစ်သည်။ ပဲမျိုးပင်တို့ကို ကမ္ဘာအနှံ့ အပြားတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပရိုတင်းအများဆုံး ပါဝင်သည်။

ကိုယ်ခန္ဓာ၏ 'ဆဲလ်' တိုင်းတွင် မရှိမဖြစ်သော ပရိုတင်းကို ပဲမျိုးပင် များ ရှိသော ကြောင့်သာ အလွယ်တကူ ရနိုင်သည်။

ပဲမျိုးပင်များကို လူတို့ စားသုံးသည့် အစေ့များပါသော အသီးများအရ အလွယ်တကူ သိနိုင်သည်။ ပဲမျိုးပင်တို့၏ အသီးများ ရင့်မှည့်သော အခါအက်ကွဲသည်။ ၎င်းတို့၏ အမြစ်များပေါ်တွင် အမြစ်ဖုများ ရှိသည်။ ၎င်းအမြစ်ဖုများအတွင်းရှိ 'ဗက်တီးရီးယား' များက လေထဲရှိ 'နိုက်ထရိုဂျင်' ကို အပင်အတွက် အာဟာရဖြစ်သော 'နိုက်ထရိတ်' ဖြစ် ပေါင်း ဖြစ်အောင် ပြောင်း ပေးသည်။ ပဲမျိုးပင်များကို စိုက်ခြင်းဖြင့် ယာသမားများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးနှစ်မျိုးရရှိသည်။ ပရိုတင်းများစွာပါဝင်သော သီးနှံကိုရရှိခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာကို အာဟာရဖြစ်သည့် ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ပဲမျိုးရင်းကို ထိကရုံးမျိုးရင်းငယ်၊ ငှက်မျိုးရင်းငယ်နှင့် စားတော်ပဲမျိုးရင်းငယ်ဟူ၍ ထပ်မံခွဲထားသည်။ မျိုးရင်းငယ် တခုနှင့်တခုကို အပွင့်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့် ခွဲခြားသိနိုင်သည်။


ထိကရုံးမျိုးရင်းငယ်

ထိကရုံးမျိုးပင်တို့သည် အများအားဖြင့် အပူပိုင်းတွင် ပေါက်သည်။ ထိကရုံးပင်ကို အနည်းငယ်ထိလိုက်ရုံဖြင့် အရွက်များငိုက်ကျသွားပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှ နဂိုအနေအထားသို့ ပြန်ရောက်သည်။ 'အကေးရှား' ပင်များလည်း ဤမျိုးရင်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။

ထိကရုံးပွင့်တို့သည်ဝတ်ဆံဖိုရှည်လျားသည့်အပွင့်ငယ်များဖြစ်ပြီး ဦးခေါင်းငယ်ပန်းခိုင်အသွင် တည်ရှိသည်။




‘ဂျပ်နက်လိုဗာ’ ပင် သည် ကွင်းပြင်များနှင့် ကမ်းစပ်တို့တွင် ပေါက်၏။




သော်ကကြီးပင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကျက်သ ရေဆောင် အမြဲစိမ်းအပင် ဖြစ်သည်။



အကေးရှားပင်သည် ပူနွေးခြောက်သွေ့သော ဒေသ၊ အထူးသဖြင့် ဩစတြေးလျတွင် ပေါက်သည်။



ထိကရုံးပင်ကို အပူပိုင်းတွင် တွေ့ရတတ်သော်လည်း ဒေသရင်းမှာ တောင်အမေရိက ဖြစ်သည်။



‘ပီတိုင်း’ ပင်သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ သစ်မာပင် ဖြစ်သည်။ အစေ့များကို စားနိုင်သည်။



ရွေးပင်သည် အပူပိုင်းအာရှရှိ သစ်မာပင် ဖြစ်သည်။ ရွေးစေ့ကို ချွေချိန်ရာတွင် သုံးသည်။



ဝတ်ဆံဖိုအရင်းရှိ ဝတ်ရည်ကို စားသုံးရန်လာသော ငှက်များ က ကသစ်ပင်ကို ဝတ်မှုန်ကူးပေးသည်။

ငှက်ပျိုးရင်းငယ်

အပူပိုင်းဒေသရှိ လှပသော အပွင့်ဆောင်သစ်မာပင် များစွာ ပါဝင်သည်။ နွေးသော သမပိုင်းဒေသတို့တွင် သစ်ပျော့ပင်၊ ချုံပင်နှင့် သစ်မာပင်များ အသွင်ဖြင့်ပေါက်သည်။ မွေးကင်းသီးကို ဝမ်းနူးဆေးတွင် သုံးသည်။ သဘောမာပင်ကို မှိုကြောင့် အရေပြားတွင်ဖြစ်သောရောဂါအတွက် သုံးသည်။



ချုံပင်ငယ်ဖြစ်သော သဘောမာပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအမေရိက ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို မှိုကြောင့်အရေပြားတွင်ဖြစ်သောရောဂါအတွက် သုံးသည်။



‘ဆီဆယ်ပိနိုယာ ဂျပွန်နိုကာ’ သည်ချုံပင် ဖြစ်သည်။




‘တရုတ် အဖူးနီ’ပင်ကို အလှ စိုက်သည်။



အဝါရောင် ပွင့်သော အင်္ဂလိပ်မဲလီပင်သည် အပူပိုင်းရှိ ရွက်ကြွေ သစ်မာပင်ငယ် ဖြစ်သည်။



စိန်ပန်းကလေးပင်သည်အမြဲစိမ်းချုံပင်ငယ်ဖြစ်သည်။ အပွင့်လှသောကြောင့် အပူပိုင်းဒေသတွင် စိုက်သည်။




စိန်ပန်းပင်သည် ရွက်ကြွေသစ်မာပင် ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်း ဒေသတဝန်းတွင် လူသိများသည်။

စားတော်ပဲမျိုးရင်းငယ်

စား ကောင်းသော ပဲမျိုးပင်အားလုံး ဤမျိုးရင်းငယ်တွင် ပါဝင်သည်။ မျိုးရင်းငယ်သုံးခုအနက် ဤမျိုးရင်းငယ်သာလျှင် အပူပိုင်းရော သမပိုင်းပါ ပေါက်သည်။ များသောအားဖြင့် သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အခြားအပင်များကိုဖြစ်စေ၊ ထောင်မတ်သောအရာဝတ္ထုကိုဖြစ်စေ နှာမောင်း များဖြင့် နှယ်တက်သည်။ အပွင့်သည် လိပ်ပြာပုံ ဖြစ်သည်။ စားရသော ပဲအမျိုးမျိုး ပါဝင်သည့် အုပ်စုဖြစ်၍ အလွန်အရေးပါသည်။



မြေပဲသည် အဓိကစားသုံးသီးနှံ တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပုံတွင် အပွင့်၊ အသီးနှင့် အမြစ်ပုများ ကို တွေ့နိုင်သည်။



အရှေ့အာရှရှိ 'ဝမ် စ တီး ရိုး ယား' ပင် သည် ရစ်နှယ်ချုပ် ဖြစ်သည်။ တွဲလဲ ကျနေသည့် ရနံ့သင်းသော ပန်းခိုင်များ ရှိသည်။



ပဲသီးဖြစ်ပေါ်ပုံ အဆင့် သုံးဆင့်။ သန္ဓေအောင်ပြီးသော အပွင့် (ဝ)၊ အပွင့်ကြွေပြီးနောက် ကျန်ခဲ့သော အစေ့အိမ် (အလယ်)၊ အစေ့အိမ် ဖွံ့ဖြိုးရင့်မှည့်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အခွံနှစ်ခြမ်းပါသည့် ပဲသီးတောင့် (ယာ)



တောင်ပိုင်း ဥရောပရှိ 'လူပင်' ခေါ် ပဲပင်




တိရစ္ဆာန်အစာဖြစ်သော တောပဲပင်



တိရစ္ဆာန်အစာဖြစ်သော 'ကလိုဗာ' အမြွှာပင်



နယူးဂီနီ သစ်မာတွားသွားပင်



အသားကဲ့သို့ပရိုတင်းများသော ပဲပုပ်စေ့ရသည့် ပဲပင်



'ဆိုက်တီဆတ် စကိုပေးရီးယတ်' ပဲပင်



အဆုတ်လိုက်ပွင့်သော တောပဲပင်တစ်မျိုး



တိရစ္ဆာန်အစာ ကလိုဗာအနီပင်



အလှစိုက်သော ပဲမွှေးပန်းပင်

ကျောက်ပန်းမုန်းရင်း

ကျောက်ပန်းတို့သည် အများအားဖြင့် သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်သည်။ ရောင်စုံပွင့်သောမျိုးစိတ် ၈၅၀ ခန့်သည် သမပိုင်းနှင့်အပူလျော့ပိုင်းဒေသတို့တွင် ဖြစ်ထွန်းသည်။ အပင်အချို့တွင် လိမ္မော်ကဲ့သို့ ရနံ့နှင့်အခြားရနံ့များ ရှိသည်။ ပွင့်ပတ်ငါးခုနှင့် ပွင့်ချပ်ငါးခု ရှိသည်။ ကက်ပဆူးသီးသည် ရင့်မှည့်ချိန်တွင် ရုတ်တရက် ပေါက်ကွဲပြီး အစေ့များလွင့်ထွက်ကာ မျိုးပြန့်ပွားသည်။

စောင်းလျားမျိုးရင်း

မျိုးရင်းဝင်မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ အနက် များစွာသောအပင်တို့၏အရွက်နှင့်ပင်စည်တွင် ‘အောက်ဇာလစ်အက်ဆစ်’ ပါဝင်သောကြောင့် အချဉ်ဓာတ် ရှိသည်။ သို့သော် မျိုးစိတ်တမျိုး၏အသီးမှာ အလွန်အရည်ရွှမ်းပြီး အရသာချိုသည်။ အများအားဖြင့်သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်သည်။ သို့သော်သစ်မာပင်အချို့လည်း ရှိသည်။ အပူပိုင်း သို့မဟုတ် အပူလျော့ပိုင်း ဒေသတို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ အချို့အပင်၏အရွက်များသည် ညအခါတွင် အိပ်သည်။



‘ဂျရနီယမ် အီရီယိုစတီမွန်’ သည် မြက်ခင်းတွင် ပေါက်သည်။



ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ‘ဂျရနီယမ် ခရာမာရီ’ သည် နွေနှောင်းတွင် ပွင့်သည်။



‘အောက်ဇာလစ်’ ပင်များသည် နွေနှောင်းတွင် ပွင့်သည်။ ပန်းရောင်နှင့် အဝါရောင်အပွင့်များ အဆုပ်လိုက်ပွင့်သည်။



တောင်အာဖရိကရှိ ‘ပယ်လာဂိုနီယမ် ဆက်ဇမိုနီယမ်’ မှ ဆီမွေးရသည်။

တောင်ကြာပန်းမျိုးရင်း

ထင်ရှားသောအပွင့်များအတွက် ဥယျာဉ်မျိုးများ တန်ဖိုးထားသည့် အပင်များ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၈၀ အနက် အများစုမှာ ဗဟိုနှင့် တောင်အမေရိကရှိ တောင်များပေါ်တွင် ပေါက်သော သစ်ပျော့နွယ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ အပွင့်မှာ ခွံလိင်ဖြစ်ပြီး အနီ၊ အဝါ၊ လိမ္မော်ရောင် ရှိသည်။ အရွက်ဝိုင်းသည် အနွယ်တူသော မျိုးစိတ်များကို မျိုးစပ်ရာမှ မျိုးပြားများစွာ ရရှိသည်။



စောင်းလျားပင်သည် အမြဲစိမ်းသစ်မာပင်ငယ် ဖြစ်သည်။ အသီးသည် အရည်ရွှမ်းပြီး စားကောင်းသည်။



အမေရိကတိုက်များမှ တောင်ကြာပန်းပင်သည် တပွင့်ချင်း သို့မဟုတ် နှစ်ပွင့်ထပ်ပွင့်သည်။ အရွက်များကို အစိမ်းစားနိုင်သည်။



‘လစ်ဂနမ် ဗိုက်တေ’၏ မူလဒေသမှာ အပူပိုင်းအမေရိက ဖြစ်သည်။

လစ်ဂနမ် ဗိုက်တေမျိုးရင်း

လစ်ဂနမ် ဗိုက်တေမျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၂၀၀ ခန့်အနက် အများစုမှာ သစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်များဖြစ်ပြီး သစ်မာပင် အနည်းငယ်သာ ပါဝင်သည်။ မျိုးစိတ်တမျိုး၏သစ်သားမှာ အလွန်မာပြီး ကြာရှည်ခံသောကြောင့် ပန်ကာ ဝင်ရိုးနှင့် စက်သီးများပြုလုပ်ရန်သုံးသည်။ သစ်သားအလွန်လေးသောကြောင့် ရေတွင် ပြုလုပ်သည်။

လစ်ဂနမ် ဗိုက်တေမျိုးရင်းဝင်အပင်များကို အပူပိုင်းဒေသတဝန်းတွင် တွေ့နိုင်သည်။ ရွက်ပေါင်းများနှင့် ဒွီလိင်အပွင့်များ ရှိသည်။

ဘီသွာလျော့မျိုးရင်း


ဘီသွာလျော့ မျိုးရင်းသည် ယဉ်ကျေးမှု အစလောက်ကပင် အသုံးဝင်ခဲ့သည်။ ကျောက်ခေတ်လူတို့သည် ၎င်းလျော့မျှင်များဖြင့် အထည်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး စိုက်ပျိုးပင် တစ်မျိုးဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် ဘီသွာလျော့မျှင်ဖြင့် အဝတ်စရက်လုပ်ပြီး မမ်မီအလောင်းများကိုရစ်ပတ်ကြသည်။ ယခုခေတ်တွင်လည်း အထည်ကြိုး၊ ပိုက်ကွန်၊ ရွက်ပြုလုပ်သည်။ မျိုးစိတ်တမျိုးမှရသောလင်းစေ့ဆီကို သဘောဆန်းနှင့်အရောင်တင်ဆီတွင် သုံး၏။

မျိုးစိတ် ၂၀၀ ခန့်ရှိပြီး အများစုသည် သမပိုင်းရာသီဥတုရှိသည့်ဒေသတွင် ကောင်းစွာ ပေါက်သည်။

ရှောက်မျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သော လိမ္မော်၊ သံပရာ၊ ကျွဲကော၊ သံပရို၊ ရှောက်ချို အစရှိသည့်အပင်တို့၏အသီးများမှာ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝသော စီးပွားဖြစ်အပင်များ ဖြစ်သည်။ ရှေးဦးစွာ တရုတ်ပြည်နှင့် အိန္ဒိယပြည်တို့တွင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၀၀၀ ခန့်တွင် မြေထဲပင်လယ်ဒေသ၌ စိုက်ပျိုးလာသည်။ ဝိဇ်နနှင့် ပေါ်တူဂီလူမျိုးများက ကမ္ဘာသစ်သို့ ယူဆောင်လာခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အဓိကစိုက်ပျိုးပင် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။


မျိုးစိတ် ၁၃၀၀ တွင် ချုံပင်၊ သစ်ပျော့ပင်နှင့် သစ်မာပင်များအပြင် အခမ်းအနားပြင်ဆင်ရန်အတွက်သာသုံးနိုင်ပြီး အသီးမသီးသောအပင်များလည်းပါဝင်သည်။ အသီးမှာ ‘ဗယ်ရီ’ အတွင်းခွံမာသီး သို့မဟုတ် ‘ကက်ပဆူး’ များဖြစ်သည်။



ဘီသွာလျော့ပင်သည် အေး၍ စိုစွတ်သော ဒေသတွင် ပေါက်သည်။ ၎င်း၏လျော့ကို ရှေးခေတ်အီဂျစ်လူမျိုးတို့ အထည်ရက်လုပ်သည်။



ရှောက်ချိုသီး အခွံတွင် ထူးခြားသည့် အနံ့ရှိသော ဆီအဖုများပါသည်။



တရုတ်လိမ္မော်ပင်၏ အပွင့်များ



တရုတ်လိမ္မော်ပင်



‘ဗုဒ္ဓလက်ချောင်းတော်များ’ ခေါ် ရှောက်မျိုး



‘ဆစ်ထရတ် ဂျပ္ပန်နီကာ’ အသီး



‘ဆစ်ထရစ်အက်ဆစ်’ ရသော သံပရိုသီး



အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုရှိ 'ယွန်'ရုတ် မဟော်ဂနီ'ပင်မှအဖိုးတန် သစ်သား ရရှိသည်။



အယ်လပိုင်၊ တောင်တန်းတွင်ပေါက်သည့် ပေါ်လီဂလာမျိုးစိတ်တစ်မျိုး မဟော်ဂနီမျိုးရင်း

'မဟော်ဂနီ'မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၈၀၀ တို့တွင် တန်ဖိုးအရှိဆုံး သစ်သားရရှိသော အပင်အချို့ ပါဝင်သည်။ အချို့အပင်များသည် မြင့်မားတင့်တယ်သည့် သစ်မာပင်ကြီးများဖြစ်ပြီး အချို့မှာသစ်မွေးရရှိသည့် ချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင်ငယ်များ ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် အာဖရိကနှင့် အမေရိကတိုင်း ပူနွေးသောအပိုင်းများတွင် ပေါက်သည်။

ဤမျိုးရင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် 'ပေါ်လီဂလေးစီး'မျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၇၀၀ ခန့် ပါဝင်သည်။ နယူးဇီလန်မှအပ ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါက်သည်။

သီဟိုဠ်သရက်မျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းတွင် အရသာရှိသော သီဟိုဠ်သရက်ပင်နှင့် သရက်ပင်များအပြင် ဘေးဖြစ်စေတတ်သော အဆိပ်ဝက်သစ်ချနှင့် ရင်ဂတ် ပင်တို့လည်းပါဝင်သည်။

မျိုးစိတ် ၆၀၀ အနက် အများစုမှာ အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်ပြီး သစ်စေး၊ ကော်စေး၊ ယွန်းဆေးများ ရရှိသည်။ ၎င်းအစေးများထိမိလျှင် လောင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။ အချို့မတဲသူများအတွက် နာကျင်ခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်းတို့သည် ပြင်းထန်လျှင် သေနိုင်သည်။



သီဟိုဠ်သရက်ပင်မှ လောင်စေတတ်သော သစ်ရည် ထွက်သည်။ အသီးဆန်များကို မစားမီ ကောင်းစွာ လျော်ရမည်။



သရက်သီး



အနံ့သင်းသောဒွိလိင်ရှိသရက်ပွင့်ငယ်များ



မလေးရှားရှိ အမြဲစိမ်းသစ်မာပင် 'ဂလူတာ ရင်ဂတ်'သည် အစေးလောင်တတ်သည်။



အရှေ့အာရှရှိ သစ်စေးပင်မှ ထွက်သည့် သစ်စေးရည်ကို ယွန်းထည်ဖြုတ်လုပ်ရာတွင် သုံးသည်။



ဖယောင်းရသည့် ဖယောင်းပင်

ရာဘာမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၇၃၀၀ အနက် အရေးပါဆုံးအပင်မှာ ရာဘာပင် ဖြစ်သည်။ အခြား အသုံးဝင်ပစ္စည်းများ ရရှိနိုင်သည့် အပင်များလည်း ပါဝင်သည်။ ခရစ္စမတ် အချိန်၌တွေ့ရသော လှပသည့် ဂနိုင့်ကျက်သရေပင် (ခရစ္စမတ်ပန်းပင်) များ မှအစ မုန့်လုပ်စားရသော ပီလောပီနပ်နှင့် ကြက်ဆူဆီရရှိသော ကြက်ဆူ ပင်များအထိ ဖြစ်သည်။ ကြက်ဆူဆီကို ဆေး၊ ဆပ်ပြာ၊ ဗယောင်းတိုင်နှင့် အရောင်တင်ဆီ ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည်။ 'ဂေါက်ပီ'ပင်မှ ဆီထွက်သောအစေ့ များကို အဆစ်ရောင်ရောဂါကုသရာတွင် သုံးခဲ့ဖူးသည်။

နယ်သစ်ရှာဖွေသောပေါ်တူဂီတို့ဘရာဇီးသို့ရောက်သည့်အခါတွင်ရာဘာ ဘောလုံးများနှင့် ကစားနေသော နယ်ခံလူများကို တွေ့ရှိရာမှ ဥရောပတိုက်

သားတို့ ရာဘာကို စတင်သိရှိကြသည်။ ရာဘာပင်၏ဒေသရင်းသည် ဘရာဇီး နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အပင်ပေါက်များသည် အင်္ဂလန်မှတစ်ဆင့် ပူနွေး စွတ်စိုသည့် ရာသီဥတုရှိသော စင်ကာပူသို့ တဖြည်းဖြည်း ရောက်လာသည်။ ယခုအခါတွင် ရာဘာတုကို ရေနံစိမ်းမှ ပြုလုပ်နေပြီ။ သို့သော် အရွှေ့တောင် အာရှတွင် သဘာဝရာဘာသည် အရေးပါဆုံးပင် ဖြစ်သည်။

ရာဘာပင်၏အခေါက်ကို လှီးဖြတ်၍ ရာဘာနို့စေးခံယူသည်။ အစေးခံ သွားစေရန် အက်ဆစ်ထည့်သည်။ အခဲကို တလိပ်ဖျားဖြင့်ညှပ်၍ အရည်ကို ညှစ်ထုတ်ပြီးနောက် မှိုတက်၍ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ကျပ်တင်သည်။



ရာဘာပင်၏ဒေသရင်းမှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ အပြုရောင် ရာဘာနို့စေး ရသည်။



မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အဘွားအိုတဦး ရာဘာ နို့စေးခြစ်နေသည်။



ပင်စည်တွင် ရှည်လျားစွာ ခြစ်ထားသော နေရာမှ နို့စေးများကျနေသည်။



ဥယျာဉ်စိုက် ရွက်လှပပင်များသည် အလှစိုက်ချုပ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ ရောင်စုံအရွက် များမှာ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးရှိပြီး အများအားဖြင့် တွန့်လိမ် နေတတ်သည်။ ၎င်းတို့၏ ဒေသရင်းမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ဤအပင်တမျိုးမှ ရရှိသော အဆီကို ဝမ်းနုတ်ဆေးအဖြစ် သုံးသည်။



ရှားစောင်းပြာသစ်ပင်သည် ကြီးမားသော သစ်မာပင် ဖြစ်သည်။

'မက်ကရင်ဂီ'ပင်၏ အကိုင်း (ဝဲ)၊ အသားထူပင် စည်ရှိသည့် ဂေါက်ပီပင် (ယာ)၏ ဒေသရင်းမှာ ဗဟိုအမေရိက ဖြစ်သည်။



ပီလောပီနံပင်သည် အပူပိုင်းဒေသများတွင် တွေ့ရှိရသည်။ မြင့်သော သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး စားကောင်းသော အရွက်များ ရှိသည်။ ကစီအပြည့် ပါဝင်သော 'ကျူဗာမြစ်' ရှိသည်။



နယူးဂီနီမှ ကြောင်မြီးပန်းပင်တွင် အနီရောင် ကြောင်မြီးပန်းခိုင်များ ရှိသည်။



ဂနိုင့်ကျက်သရေပင်တွင် အချို့အရွက်တို့မှာ ကြီးမားပြီး အနီရောင်ရှိသောကြောင့် အပွင့်ဟု အထင်မှားတတ်သည်။ နှင်းဆီ ပွင့်ပုံ အနေအထားရှိသော အနီရောင် အရွက်များ၏အလယ်တွင် အဝါရောင် အပွင့်ငယ်များကို တွေ့ရသည်။



'ယူဖော်ဗီယာ ဟယ်လီယိုကိုပီယာ' (ယာ) သည် ဥရောပတိုက်တွင် ပေါက်သည်။ မဒါဂါစကာမှ 'ယူဖော်ဗီယာ စပလင်ဒင်' (ယာအစွန်) သည် သဲကန္တာရ တပိုင်း ဒေသများ၌ ပေါက်သည်။



ကြက်ဆူပင်သည် သစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ပင်လုံးပျော့သော ချုံပင် ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းဒေသများတွင် အလွေ့ကျပေါက်ပင် နှင့် ခိုက်ပျိုးပင်အဖြစ် တွေ့ရ၏။ မူလဒေသမှာ အာဖရိက ဖြစ်သည်။ ကြက်ဆူဆီကို အစေ့မှထုတ်ယူရသည်။



ဟော်လီမျိုးရင်း

အနောက်တိုင်းခရစ္စမတ်ပွဲတော်တို့တွင် သုံးသည့် အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက်၊ အနီရောင်အသီးတို့ဖြင့်လှပသော 'ဟော်လီ' မျိုးရင်းဝင်အပင်များကိုလူသိများသည်။ မျိုးစိတ် ၃၀၀ အနက် တမျိုးကို လက်ပက်ခြောက်အဖြစ် သုံးသည်။ ရွက်ထိးရှိသော ချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင်များဖြစ်သည်။ အရွက်များဆုံသည့်နေရာတွင် အစိမ်းရောင်သန်းသည့် သေးငယ်သော အပွင့်များကို စုပြုံလျက် တွေ့ရသည်။



ဟော်လီပင်သည် အမြဲစိမ်းပင်ငယ်ဖြစ်ပြီး ဒေသရင်းမှာ ဥရောပဖြစ်သည်။

မေပယ်မျိုးရင်း

'မေပယ်' မျိုးရင်းဝင် မေပယ်ပင်တို့မှ နွေရာသီတွင် အရိပ်ရသည်။ နွေဦးတွင် တင်လဲရသည်။ ဆောင်းဦးတွင် အရွက်များ ခြောက်သွေ့ချိန်၌ တောက်ပသော အရောင်များရှိသည်။ ဤမျိုးရင်းဝင် အပင်တမျိုးဖြစ်သော 'ဆစ်ကမိုး' ပင်၏ အသားကို တယောအကောင်းစားပြုလုပ်သည်။ မေပယ်ရွက်သည် ကနေဒါနိုင်ငံ၏ အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်သည်။

မျိုးစိတ် ၂၅၀ ခန့်ကို မြောက်ဘက် သမပိုင်း ဒေသတို့တွင် တွေ့ရသည်။ သစ်မာပင်ဖြစ်စေ၊ ချုံပင်ဖြစ်စေ အားလုံး အရွက်ကြွေသည်။ မေပယ်မျိုးစိတ် အချို့မှရသော သစ်ရည်ကို တင်လဲရည်အဖြစ် သုံးနိုင်သည်။ မေပယ်သစ်သားကို ပရိဘောဂများပြုလုပ်ရန် တန်ဖိုးထားသည်။


ရေမျောမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်တို့တွင် ကြိုးမားလုံးဝန်း၍ အခွံထူသော အစေ့များရှိသည်။ အစေ့အရောင်မှာ ပြောင်လက်ပြီး နီညိုရောင် ဖြစ်သည်။ 'ချက်စနတ်' သီးများ နှင့်တူသော်လည်း အရသာခါးပြီး အဆိပ်အတောက်ပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ မျိုးစိတ် ၂၄ မျိုးခန့်မှာ သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်များဖြစ်သည်။

ဆုပ်ဗယ်ရီမျိုးရင်း

'ဆုပ်ဗယ်ရီ' မျိုးရင်းဝင် ဆုပ်ဗယ်ရီ (ကုလားကင်ပွန်း) ပင်၏အသီးတွင် ဆုပ်ပြာကဲ့သို့ အဖြူထွက်သည့် ပစ္စည်းပါဝင်သောကြောင့် အဝတ်လျှော်ရန် ဂျပန်ပြည်၊ တရုတ်ပြည်တို့တွင် သုံးခဲ့ဖူးသည်။ မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ တွင် ကြက် မောက်၊ တောကြက် မောက်နှင့် 'လိုင်ချီး' ပင် များပါဝင်သည်။ အသီးများကို စည် သွတ် သို့မဟုတ်အအေးစိမ်ပြီးရောင်းသည်။ သစ်မာပင်၊ ချုံပင်နှင့်နှွယ်ပင်များ ပါဝင်သည်။ ရွက်ပေါင်းများရှိသည်။

အရှေ့ အာရှရှိ ဆုပ်ဗယ်ရီ ပင် သည် အရွယ်လတ်သစ်မာပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အသီးမှာ အဆိပ် ဖြစ်စေတတ်သော 'ဆပိုနင်' ထွက်သည်။



ရေမျောပင်၏ အသီးသည် မစားကောင်း၊ အစေ့ကို တိရစ္ဆာန်ကျွေးနိုင်၏။



ဥယျာဉ်စိုက်မေပယ်ပင်



ရေမျောပင်



လိုင်ချီးသီး၏ အပြွေရောင် အသားနုကို စားနိုင်သည်။



ကုလား မျက်စိပင်၏ အသီးသည် မီးအိမ်နှင့်တူသည်။



ကြက်မောက်သီး၏ အသားနုသည် ချို၏။



ပန်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပွင့်သောတနှစ်ခံဒန်းပန်းပင်

ဒန်းပန်းမျိုးရင်း

မျိုးစိတ်၄၅မျိုး၏ အသီးတို့သည် ရင့်မှည့်ချိန်တွင် အနည်းငယ်ထိရုံမျှဖြင့်ပေါက် ကွဲပြီး အစေ့များကိုဖြန့်ကျံစေသည်။ စိုစွတ်သောနေရာများတွင် ပေါက်လေ့ ရှိသည်။ အပူပိုင်းအာရှနှင့် အာဖရိကတွင် ပေါများသည်။ အသားထူသော ပင်စည်ရှိသည့် သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ ပွင့်ချပ်ငါးခုအနက်တခုတွင် ဝတ်ရည်ပါသည်။

စပျစ်မျိုးရင်း

စပျစ်ပင်တို့သည် ရှေးအကျဆုံးစိုက်ပျိုးပင်တို့အနက် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အသီး မှရသောအရည်သည် ဝိုင်အရက်ပြုလုပ်ရန် အခြေခံဖြစ်သည်။

ဝိုင်အရက်ပြုလုပ်ခြင်းမှာ 'အောက်ဆီဂျင်' ကင်းမဲ့သည့် အခြေအနေတွင် စပျစ်သကြားကို 'အယ်လကိုဟော' အဖြစ် ပြောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စပျစ် သီးများကို ခြေထားပြီး အချဉ်ဖောက်သည်။ ထိုအခါ အရည်ထဲရှိ သကြားကို တဆေးပင်၏ အင်ဇိုင်းများက အယ်လကိုဟောနှင့် 'ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်' အဖြစ် ပြောင်းလိုက်သည်။ အနံ့အရသာကောင်းစေရန် စည်များထဲတွင် အလုံပိတ်ပြီး နှစ်အတော်ကြာ ထားရသည်။ စပျစ်သီး အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပြီး ဝိုင်အရက်အပြု သို့မဟုတ် အနီဖြစ်လာသည်။


အပင်အများစုသည် သစ်မာပင်စည်ရှိသော နွယ်ပင်ဖြစ်သည်။



'ဗာလဆာ'ပင်မှ ပေါ့ပါးနူးညံ့သော သစ်သားရသည်။ ၎င်း၏ ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအာဖရိက ဖြစ်သည်။



'အမျိုးသမီးလက်ချောင်း'ခေါ် မျိုးစပ် စပျစ်ပင် ဖြစ်သည်။



ဝိုင် စပျစ်ပင်၏ ဒေသရင်းမှာ မြေ ထဲ ပင်လယ် ဖြစ်သည်။



အကြမ်းခံသော 'ဟွန်ကင်ယာ ဖီစီဖိုလီယာ' ၏အရွက်မှ အသုံးဝင် လျှော်မျှင်ရသည်။



အရှေ့တောင်အာရှရှိ 'ဗိုက်တစ်ထရိုင်ဖိုလီယာ' ၏ အသီးသည် မစားကောင်းပေ။

ဂုန်လျှော်မျိုးရင်း

ဂုန်လျှော်မျိုးရင်းဝင် အပင်တို့မှရရှိသော လျှော်မျှင်တို့သည် ဝါကွမ်းပြီးလျှင် အသုံးအဝင်ဆုံးနှင့် အပေါများဆုံးဖြစ်သည်။ ဥရောပရှိ 'လင်ဒင်'ပင်မှအစိုးတန် ဗတ်သစ်သား ရသည်။

အပူပိုင်းတွင်သာတွေ့ရသောမျိုးစိတ် ၃၅၀ခန့်မှာ သစ်ပျော့ပင်၊ချုပ်ပင်နှင့် သစ်မာပင်များဖြစ်သည်။ ဘက်လားဒေ့ရှ်မှ ဂုန်လျှော်အများဆုံး ထွက်သည်။ ၎င်းကို အိတ်များ၊ ကြိုးများ ပြုလုပ်သည်။

ခေါင်ရန်းမျိုးရင်း

ခေါင်ရန်းနှင့်ဝါပင်တို့သည် ဤမျိုးရင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ဝါပင်ကိုအီဂျစ်နှင့်ပီရူး နိုင်ငံတို့တွင် သမိုင်းမတင်မီကပင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ ဝါမှရက်လုပ်သော ချည်ထည် သည် လူသုံးများသည်။ သစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ချုံပုတ်ပင်ဖြစ်သော ဝါပင်၏ ‘ကက်ပဆူး’ သီးသည် ရင့်မှည့်ချိန်တွင်အက်ကွဲသည်။ ထိုအခါ အစေ့ပတ်လည်ရှိ ဝါဂွမ်းမျှင်များ ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့ကို အထည်ရက်လုပ်သည်။ ဝါစေ့မှ ဆီထွက်သည်။

မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ တွင် သစ်မာပင်များအပြင် သစ်ပျော့ပင်နှင့် ချုံပင်များ လည်း ပါဝင်သည်။ မျိုးစိတ်အချို့ကို တိရစ္ဆာန်အစာအဖြစ် သုံးပြီး အချို့ကိုမူ အလှစိုက်၏။ ရုံးပတိကို စားသုံးသူများသည်။



‘ဟစ်ဗစ်စကတ်’ တရုတ်မျိုး (ဝဲ) ၊ ဟစ်ဗစ်စကတ် ဆီးရီးယားမျိုး (ယာ) ၊ ဟစ်ဗစ်စကတ် ဂျပန်မျိုး (အလယ်)



အနောက်အာရှရှိ ပန်းချဉ်ပေါင်ပင်သည် အလွန်မြင့်သော သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပင်အဖြစ် လူကြိုက်များသည်။



ရုံးပတိသည် အပူပိုင်းဒေသတဝန်းရှိ မြင့်သော သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။ အသီးစားရန် စိုက်သည်။



ခေါင်ရန်းမျိုးစိတ်များစွာတို့သည် နေ့အချိန်တွင် အရောင်ပြောင်းသည်။ သုံးပန်လှပွင့်တို့ သည် နံနက်တွင် အဖြူ၊ ညနေတွင် ပန်းရောင်သို့ ပြောင်းသည်။



ဤအိန္ဒိယဝါပင်မျိုးသည် ချုံပင်ဖြစ်သည်။ အခြားဝါပင်မျိုးများသည် သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။

သဘောလက်ပံမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင် သစ်မာပင်တမျိုးသည် ဟောလိဝုဒ ကျော်ကြားမှုတွင် အထောက်အကူပြုသည်။ တောင်အမေရိကရှိ 'ဗာလဆာ' ပင်၏ သစ်သားသည် အလွန်ပေါ့ပါးနူးညံ့သောကြောင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရာတွင် လေယာဉ်ပုံစံ ငယ်များမှသည် ပရိဘောဂအတုများအထိ ပြုလုပ်ရန်သုံးသည်။ လူကြမ်းက ဇာတ်လိုက်၏ခေါင်းကို ၎င်းသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ကုလားထိုင်ဖြင့် ရိုက်သောအခါ ကုလားထိုင်ကျိုးသွားသော်လည်း နာကျင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပေ။

အများအားဖြင့် အမေရိကတိုက်ပျားမှဖြစ်ပြီး အချို့ကို အရှေ့တောင်အာရှနှင့် အာဖရိကတွင် တွေ့နိုင်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၄၀ ခန့်တွင် 'ဗေအိုဗတ်'ပင်လည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းမှအစားအစာ၊ အမျှင်၊ အရိပ်နှင့် ဆေးဝါး ရရှိသည်။




အာဖရိကရှိ ဗေအိုဗတ်ပင်တွင် ရေသိုလှောင်ထားသော ပင်စည်မကြီး၊ သစ်ငုတ်သဖွယ် အကိုင်းအခက်များနှင့် အပြွေရောင် အပွင့်ကြီးများ ရှိသည်။ အညှာရှည်ရှိသော အသီးများတွဲလဲကျနေသည်။ ပင်စည်မှ လျှော်မျှင်ရသည်။ အသားနုကို မျှော်ရည်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသီးနှင့်အရွက်ကို စားနိုင်သည်။

ကိုကိုးမျိုးရင်း

ကိုကိုး၊ချောကလက်နှင့်ကိုလာပျော်ရည်များကို ကိုကိုးမျိုးရင်းဝင်အပင်များမှ ရရှိသည်။ ကိုကိုးဟူသောစကားလုံးမှာ အမေရိကရှိ မာယာအင်ဒီးယန်း တို့၏ စကားအရ ပျော်ရည်ခါးဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မျိုးစိတ် ၅၅၀ ပါဝင်သည်။

အများစုမှာ အပူပိုင်းချုပ်သို့မဟုတ် သစ်မာပင်များဖြစ်သည်။အသီးများ အသားထူပြီး ပျဉ်းတူသောအခွံရှိသည်။ အစေ့ကို အချဉ်ဖောက်၍လှော်ကာ ကြိတ်ထောင်းပြီးနောက် ကိုကိုး၊ချောကလက်နှင့် ကိုကိုးထောပတ်ပြုလုပ်သည်။



တရုတ်ပြည်နှင့် ဂျပန်ပြည်ရှိ ခူလတန် ဘုရင်၏ထီးပင်သည် ဆောင်းဦးတွင် ပထမဆုံး အရွက်ကြွေသည်။ တရုတ်ပြည်တွင်တူရိယာပစ္စည်းများ ပြုလုပ်ရန် သုံးသည်။



ဦးရင်းပင်သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ အမြဲစိမ်းပင် ဖြစ်သည်။ အနံ့ပြင်းသော အသီးကို အချိုက နှစ်သက်စွာ စားသုံးသည်။



သဘောလက်ပံပင်၏ အသီးခွံအတွင်းရှိ ရှည်လျား ပြွေမွေးသော အမျှင်များကို ကုရှင်၊ မေ့ရာနှင့် အသက်ကယ် အင်္ကျီများတွင် ထည့်ရန် လဲပို့အဖြစ် သုံးသည်။



ကိုကိုးသီး၏ အစေ့များမှ ကိုကိုးနှင့်ချောကလက်ရသည်။ချောကလက်အနံ့အရသာရရန် အစေ့များကို အချဉ်ဖောက်ရသည်။

ဝါမီယာမျိုးရင်း

သစ်မာပင်နှင့်ချုပ်ပင်ဖြစ်သော ‘ဝါမီယာ’ မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၂၇၅ မျိုးတို့၏ ဒေသရင်းမှာ အာရှ၊ အမေရိကနှင့် ဩစတြေးလျတို့ဖြစ်သည်။ အရွက်နှင့်အပွင့်များ အလွန်ကြီးသည်။ အသီးများသည် အမြောက်ဆန်အရွယ်အထိရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် ခြောက်သွေ့ပြီး မစားကောင်းပေ။

လက်ဖက်မျိုးရင်း

လက်ဖက်ရည်သည် ကမ္ဘာတွင် အကျော်ကြားဆုံး အဖျော်ယမကာ တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဂျပန်လူမျိုးတို့၏ ဇင်အခမ်းအနားသည် လက်ဖက်ရည်ကို ရေနှေးတွင် ခတ်၍ သောက်ခြင်းမှ အခြေခံ၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ မြိတ်သူလူမျိုးတို့၏ တနေ့တာအချိန်တွင် “လက်ဖက်ရည်သောက်ချိန်” သည် အရေးပါသော အချိန်ပိုင်း ဖြစ်သည်။

အရေးပါသော မျိုးရင်းဝင်အပင်မှာ လက်ဖက်ပင် ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၅၀၀ အနက် အများစုသည် အပူလျော့ပိုင်းတွင်ပေါက်သည်။ လက်ဖက်ပင် အရှိုင်းသည် မြင့်သောချုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးပင်မှာ အရွက်ခွေးသဖြင့် ၁.၅ မီတာထက်မမြင့်ချေ။ အချဉ်မဖောက်သော အရွက်နုများကို အဖန်ခြောက်ပြုလုပ်၍ အချဉ်ဖောက်ထားသောအရွက်များကို အချိုခြောက် ပြုလုပ်သည်။



အရှေ့တောင်အာရှရှိ ‘ဝါမီယာ ဆတ်ဖရူတီကိုဆာ’သည် အမြဲစိမ်းချုပ်ပင်ဖြစ်သည်။ အသီးကို ငှက်များစားသည်။



လက်ဖက်ပင် (ယာ) သည် အမြဲစိမ်းချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး ဒေသရင်းမှာ တရုတ်ပြည်ဖြစ်သည်။ ‘ကမ်မီလီယာ ဆာဆန်ကွာ’ (ဝဲ)



မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ကင်မရွန် ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် လေးလံသောခြင်းများကို ပိုး၍ လက်ဖက်ခူးနေသူများဖြစ်သည်။

မင်းကွတ်မျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၅၅၀ တို့သည် အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်သော သစ်မာပင်နှင့် ချုပ်ပင်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏သစ်သားသည် အလွန်မာပြီး ခိုင်ခံ့သဖြင့် လှေ၊ ဗိုရိုစသည်တို့ပြုလုပ်ရာတွင်သုံးသည်။ ကံ့ကော်သည်ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်ဖြစ်သည်။

မင်းကွတ်မျိုးစိတ်များတွင် စားကောင်းသောအသီးနှင့် အပွင့်များရှိသည်။ အချို့မျိုးစိတ်တို့တွင် ထူထဲကြီးမားသော အရွက်များရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် ‘အော်တိုဂရတ်’ပင်၏ အရွက်ပေါ်တွင် ကလေးများနှင့် ချစ်သူများက အမည်များကို ရေးတတ်ကြသည်။




မင်းကွတ်ပင်တွင်အရသာရှိသော အသီး ရှိသည်။ ပန်းရောင်ဖြစ်သောအသီးခွံသည် အဝတ် များ ကို အဝါရောင်စွန်းစေသည်။



လျာဗားမှ အိန္ဒိယအထိ အလေ့ကျပေါက်သော ကံ့ကော်ပင် ဖြစ်သည်။



အော်တိုဂရတ်ပင်သည် သစ်ကပ်ပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အမြစ်များက လက်ခံပင်ကို တဖြည်းဖြည်းမျိုးသည်။



အပွင့်

ဆီအပူများရှိသောအရွက်

‘စိန်ဂျွန်စဝပ်’ပင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ကုန်းများပေါ်တွင်ပေါက်သော နှစ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်သည်။ တချိန်က ရိုးရာဆေးဖော်ရာတွင် သုံးသည်။

စိန်ဂျွန်စဝပ်မျိုးရင်း

စိန်ဂျွန်စဝပ်မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၂၅၀ တို့တွင် သစ်ပျော့ပင်၊ ချုံပင်နှင့် သစ်မာပင် စသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ရွက်ဆိုင် သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းပတ် အနေအထားရှိသော အရွက်တွင် အနက်ရောင် ဆီအပူများ ပါရှိသည်။ အပွင့်တွင် ပွင့်ဖတ်၊ ပွင့်ချပ်ငါးခုစီနှင့် ဝတ်ဆံဖိုများစွာ ပါဝင်၏။ ၎င်းတို့၏ဒေသရင်းမှာ သမပိုင်းဒေသများနှင့်အပူပိုင်းဒေသရှိတောင်များ၏ဆင်ခြေလျှောများဖြစ်၏။

ကညင်မျိုးရင်း


မျိုးစိတ် ၃၀၀ တို့သည် အာရှ၏အပူပိုင်းမိုးသစ်တောများတွင် ပေါက်ရောက်ကြီးထွားသော သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်များစွာတို့မှ အဖိုးတန်သစ်သား ရရှိသည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဤသစ်တောများကို ဝင်ငွေရရန်နှင့် စိုက်ပျိုးရန်မြေအတွက် ခုတ်လှဲကြသည်။ ငါးနှစ်မှ ဆယ်နှစ်အတွင်း တကြိမ်သာ ပွင့်သည်။ ပွင့်ဖတ်နှစ်ခုမှ အတောင်သဖွယ် ဖြစ်နေသဖြင့် အသီးကြွေကျသည့်အခါ အတောင်ခတ်နေသောငှက်နှင့်တူသည်။



သစ်မာရသော ‘ရှိုရီးယား ကာတစ်ဆီအိုင်’



အတောင်နှစ်ခုပါသော ကညင်သီး



နှစ်ရှည်ခံပင် ဂျပန် ‘မိုင်အိုလာ ဂရစ်ပိုဆာရက်’ (အထက်)၊ ဥရောပရှိ ‘ပင်စီ’ ပင် (ယာ)

မိုင်အိုလာမျိုးရင်း

‘မိုင်အိုလာ’မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၈၅၀ ခန့်၏ ထက်ဝက်မှာ ‘မိုင်အိုလာ’မျိုးစုဖြစ်ပြီး နူးညံ့သေးငယ်လှသော ရောင်စုံအပွင့်များကြောင့်ဥယျာဉ်စိုက်သူများတန်ဖိုးထားသည်။ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ပင်စီပင်လည်း မျိုးရင်းဝင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။

မိုင်အိုလာပင်တွင် ပွင့်ဖတ်ငါးခုနှင့် ပွင့်ချပ်ငါးခု ရှိသည်။ အောက်ဆုံးရှိ ပွင့်ဖတ်သည်ပိုကြီးပြီး အတက် သို့မဟုတ် အိတ်ပါသည်။ မိုင်အိုလာမျိုးစိတ်များစွာတို့သည် နွေဦးတွင်ပွင့်သည်။

သီတင်းမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၂၄ မျိုးသာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးပင်၏ အစေ့မှ ထွက်သော လိမ္မော်နီအရောင်ကို နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးအတွက် သုံးသည်။ အစာဆိုးဆေးအဖြစ်လည်း သုံးသည်။

ဤအပင်အများစု၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအမေရိက ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးပင်တွင် အနီရောင်သစ်ရည်နှင့် အစေ့များစွာပါသော အသီးရှိသည်။ အသီးတို့တွင် အသားထူသော အနီရောင်အခွံ ရှိသည်။ အရွက်သည် ရွက်ထီးဖြစ်ပြီး ကြောင်လိမ်ပုံ အနေအထားရှိသည်။



သီတင်းသီးမှ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးတွင်သုံးသော ဆိုးဆေး ရသည့်။

စုကာယျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၆၀၀ ခန့်အနက် အများစု၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအမေရိကဖြစ်သည်။ အပင်များသည် နွယ်ပင်များဖြစ်ပြီး ရွက်ထီး သို့မဟုတ် ရွက်ပေါင်းများမှာ ရွက်လွှဲအနုအထား ရှိသည်။ အပွင့်တွင် ပွင့်ဖတ်နှင့် ပွင့်ချပ် ငါးခုစီ ရှိသည်။ စုကာပန်းများသည်ကြက်သွေးရောင်ဖြစ်သောကြောင့်ခရစ်တော်၏နောက်ဆုံး အချိန် ခံစားချက်ကို မော်ဆောင်၍ ခရစ်တော်၏ ဝေဒနာ ပန်း ဟုလည်း ခေါ်သည်။



စုကာပင်သည် တောင်အမေရိကမှ ဖြစ်သည်။



စုကာသီး၏ အသားနုထဲ၌ အစေ့များရှိသည်။

သင်္ဘောမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းတွင် သင်္ဘောပင်သည် လူသိများပြီး အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။ သင်္ဘောသီးတွင် ဗီတာမင်အနွှဲစီ များစွာပါဝင်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ပူနွေးစွတ်စိုသော နိုင်ငံတိုင်းတွင် ပေါက်သည်။ မျိုးရင်းဝင်သစ်ပျော့ပင်ငယ်များမှ ထွက်သော နွားနို့ရောင်သစ်ရည်ဘွင် 'ပက်ပန်း' ခေါ် 'အင်ဇိုင်း' ပါဝင်သည်။ ၎င်းအင်ဇိုင်းသည် ပရိုတင်းများကို 'အေမီနိုအက်ဆစ်' များအဖြစ် ပြိုခွဲနိုင်သည်။ သင်္ဘောပင်စည်မှ အကိုင်းအခက်ဖြာလေ့မရှိ။ ရိုးတံရှည်သော အရွက်ကြီးများသည် ပင်စည်မှ ကြောင်လိမ်ပုံ ရစ်ပတ်ထွက်သည်။ အဖိုပင်နှင့် အမပင် သီးခြားဖြစ်သည်။မျိုးစိတ်အားလုံး၏ဒေသရင်းမှာအပူပိုင်းအမေရိကဖြစ်သည်။



ဗီတာမင်ကြွယ်ဝ၍ အရသာရှိသည့် အသီးကြောင့် လူသိများသော သင်္ဘောပင်

ကြွေပန်းမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၈၀၀ တို့သည် အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။ လှပသောအပွင့်များနှင့် အရွက်များရှိသည်။ သမပိုင်းဒေသများတွင် အိမ်၌ အလှစိုက်ပင်များအဖြစ် စိုက်သည်။ အချို့ကြွေပန်းမျိုးစိတ်တို့သည် သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး အသားထူသည့်ပင်စည်များရှိသည်။ ရောင်စုံပြောက်ကျား အရွက်ကြီးများသည် အပွင့်ထက် ပိုမိုလှပသည်။ တပင်တည်းပေါ်တွင် အဖိုပွင့်၊ အမပွင့် နှစ်မျိုးစလုံးရှိသည်။ ၎င်း၏ အရွက်ပိုင်းတပိုင်းမှ အပင်သစ်တပင် ပေါက်လာနိုင်ခြင်းသည် ထူးခြားသည်။




ကြွေပန်းပင်သည် တနှစ်ပတ်လုံးပွင့်သည်။

အနီယပြည့်ရှိ ကြွေပန်းပင်တွင် လှပသည့် အရွက်များ ရှိသည်။

ရှားစောင်းမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၁၂၀၀ ပါဝင်ပြီး အမေရိကရှိသဲကန္တာရဒေသတွင် ပေါက်သော အပင်များဖြစ်သည်။ ပင်စည်များအတွင်း ရေကိုသိုလှောင်ထားသည်။ အရွက်များရှိသော်လည်း အချို့မျိုးစိတ်တွင် ဆူးအဖြစ်တည်ရှိသော အရွက်များက တိရစ္ဆာန်များဘေးရန်မှ ကာကွယ်သည်။

ရှားစောင်းအများစုတွင် ရောင်စုံအပွင့်ကြီးများရှိ၏။ ‘ဆာဂူအာရို’ ရှားစောင်းပင်ကြီးများသည် နှစ် ရာပေါင်းများစွာ အသက်ရှည်သည်။



လက်ဝဲဘက်တွင် ရှားစောင်းအမျိုးမျိုးပုံ ဖြစ်သည်။ လက်ယာဘက်ရှိကျားလျှာပင်၏ ပြားသောပင်စည်ပေါ်တွင် ချိတ်ကောက်ငယ်များ ရှိသည်။ အသီးကို စားရ၏။



မက္ကဆီကို ရှားစောင်းသည် ညတွင် ပွင့်သည်။ လက်ယာဘက်ရှိ ‘ကဏန်းရှားစောင်း’ ပင်၌ အဆစ်များပါပြီး ပြားသောပင်စည် ရှိသည်။

ဒန်းကြီးမျိုးရင်း

ရာစုနှစ်များစွာကပင် ဒန်းပင်၏အရွက်ကို ဆံပင်၊ မုတ်ဆိတ်မွေး၊ လက်သည်း ခြေသည်း၊ မြင်းလည်ဆံမွေး၊ မြင်းမြီး၊ သိုးမွေးနှင့် ပိုးချည်တို့ကို ဆေးဆိုးရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤမျိုးရင်းတွင် သစ်မာပင်၊ ချုံပင်မှ သစ်ပျော့ပင်အထိ အပင်မျိုးပေါင်း ၄၅၀ ကျော်ခန့် ရှိသည်။ အများစု၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသ ဖြစ်သည်။




အပူပိုင်းဒေသဥယျာဉ်များရှိပန်းအိမ်


ဒန်းကြီးပင်၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအာရှ ဖြစ်ပြီး ၎င်းမှ ဆိုးဆေးရသည်။

ဒက်ဖနီမျိုးရင်း

‘ဒက်ဖနီ’ မျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၅၀၀ ခန့်ရှိသည်။ လှပပြီးမွေးသောပန်းများ ရှိသည်။ မျိုးစိတ်အချို့၏အပွင့်များတွင် အဆိပ်ပါသည်။ လျှော်မျှင်ပါသည့် ထူထဲသောအခေါက်ရှိ၏။ အသီးမှာခွံမာ တစ်စေ့သီး သို့မဟုတ် အတွင်းခွံမာသီး ဖြစ်၏။



အမြဲစိမ်း ‘ဒက်ဖနီမွေး’ ပင်၏ ဒေသရင်းမှာ တရုတ်ပြည်ဖြစ်သည်။



‘ဒက်ဖနီဆူဖို-မီဇာရီယမ်’ ချုံပင်(ဝ) နှင့်သစ်မာပင် ‘ဒီဂျီဝါသီယာ ခရိုင်ဆင်သာ’ (ယာ) တို့သည် ရွက်ကြွေပင်များ ဖြစ်သည်။

တလည်းမျိုးရင်း

တလည်းမျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် နှစ်ခုသာ ရှိသည်။ တလည်းပင်သည် အရွက်ကြွေသော ဆူးရှိချုံပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ဒေသရင်းမှာ ပါရှားနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ အသီးတွင် ချိုပြီးအရည်ရွှမ်းသည့် အသားပါသော အစေ့များရှိသည်။ ရှေးမဆွကပင် စိုက်ပျိုးလေ့ရှိပြီး အသီးကို ဝိုင်အရက်စိမ်လေ့ ရှိသည်။


အရွက်များ ရွက်ဆိုင်ထွက်ပြီး အပွင့်များတွင် ပွင့်ချပ်ငါးခုမှ ရှစ်ခုအထိ ရှိသည်။ ဝတ်ဆံဖိုများစွာ ပါဝင်သည်။ ‘ဗယ်ရီ’ သီး ရှိသည်။



တလည်းသီးသည် လုံးဝန်းပြီး သားရေနှင့်တူသည့် အနီရောင်အခွံထူ ရှိသည်။



တလည်းပင်သည် ရွက်ကြွေချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင် ဖြစ်သည်။



တလည်းသီးတွင် အစေ့များ အကန့်လိုက် ရှိသည်။

ဘရာဇီးတစ်စေ့သီးမျိုးရင်း

‘ဘရာဇီးတစ်စေ့သီး’မျိုးရင်းဝင်အပင်များသည် သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင် ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၅၀ ခန့်ရှိပြီး ၎င်းတို့၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအမေရိက ဖြစ်သည်။ လင်းနို အကူအညီဖြင့်ဝတ်မှုန်ကူးသည်။အသီးများကိုစားသုံးနိုင်ပြီး အဆီကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်ယူနိုင်သည်။



‘အမြောက်ဆန်’ပင် (အင်ကြင်းတစ်မျိုး) ၏ ဒေသရင်းမှာ တောင်အမေရိက ဖြစ်သည်။ အမြောက်ဆန်နှင့်တူသော အသီးများရှိသည်။ အနံ့ဆိုး၏။



ကျည်းပင်သည် ရွှံ့ညွန့်ထူသည်ဖြစ် ကမ်းတွင် ပေါက်သည်။ ညဘက်တွင် မွေးသောပန်းများက လင်းနိုကို ဆွဲဆောင် ၍ ဝတ်မှုန်ကူးစေသည်။

လမုမျိုးရင်း

မျိုးရင်းဝင်အပင်များသည်ဒီရေအတက်အကျရှိသောနေရာတဝိုက်ရွှံ့ညွန့်ထူရာ အပူပိုင်းပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ပေါက်သည်။ အပေါ်သို့ကွေး၍ ထောင်မတ်နေ သော အမြစ်အချို့သည် လေကိုစုပ်ယူခြင်းကြောင့် လေမရှိသောရွှံ့ညွန့်ထဲတွင် ပေါက်နိုင်သည်။ ပင်လယ်အတွင်းရှိ ဆားဓာတ်သည် အပင်အတွင်းမှ ရေကို ‘တဘက်စိမ့်’နည်းဖြင့် စိမ့်ထွက်နိုင်စေသည်။ ထို့အတွက် အပင်တွင်းရှိ ရေခန်း မသွားစေရန် အရွက်များသည် ထူထဲပြီး သားရေကဲ့သို့ မာကျောသည်။

အစေ့သည်အပင်မှအသီးမကြွေမီအညောက်ပေါက်နိုင်သည်။အမြစ်လောင်း ငယ်လည်း ထွက်နိုင်သည်။ အသီးကြွေချိန်တွင် အမြစ်လောင်းသည် ရွှံ့ညွန့် အတွင်းသို့ လှံသဖွယ်စိုက်နေသည်။ ဒီရေတက်ချိန်တွင်ကြွေပါက ရေထဲသို့ကျပြီး မျောပါလျက် အခြားတနေရာ၌ အမြစ်စွဲနိုင်သည်။




မြူးခြေထောက်ပင်သည် အပူပိုင်းဒေသရှိ အမြဲစိမ်းပင် ဖြစ်သည်။

အိုးပုတ်မျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၄၀၀၀ ရှိပြီး ချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့၏ဒေသ ရင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည်။ ရွက်ကြောများထင်ရှားသော အရွက် ရှိသည်။ ပွင့်ချပ်လေးခုမှ ငါးခုအထိ ရှိသည်။ ပုံတွင်တွေ့ရသော မျိုးစိတ်၏ အသီးမှာ စားကောင်းသော်လည်း ပါးစပ်ကို ခရမ်းရောင်ခွန်းစေသည်။



ဩစတြေးလျမှ မောရစ်ရှနိုင်ငံအထိ တွေ့နိုင်သော အိုးပုတ်ပင်



မြူးခြေထောက် အပင်ပေါက်များ



လမုမျိုးရင်းဝင် မြူးပင်

ယုကလစ်မုရ်းရင်း

မုရ်းစိတ် ၄၀၀၀ အနက် အချို့ကို လူသိများကြသည်။ လေးညှင်းပွင့်ကို ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် သုံးပြီး ‘ယုကလစ်’ ပင် နှင့် ‘မာတယ်’ ပင်များကို အပူပိုင်းဒေသရှိ ဥယျာဉ်များနှင့် လမ်းဘေးတလျှောက်တွင် စိုက်သည်။ မာလကာသီးသည် အာဟာရဖြစ်စေသည်။ မုရ်းစိတ်အတော်များများမှ ဆီထုတ်ယူနိုင်သည်။

အများအားဖြင့် အပူပိုင်းဒေသရှိ သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်ဖြစ်ပြီး ပစိဖိတ်ချိုင့်ဝှမ်းဒေသတွင် တွေ့နိုင်သည်။ အနီပြင်းသောအရွက်တွင် ဆီအဖုများပါသည်။ အသီးမှာ ‘ကက်ပဆူး’ သို့မဟုတ် ‘ဗယ်ရီ’ ဖြစ်သည်။

ယုကလစ်ပင်ကို သစ်မာပင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ချုံပင် အဖြစ်လည်းကောင်း တွေ့ရသည်။ သက်သေပိုင်၏အရွက်များသည် ဝိုင်းသည်။




အပွင့်

အသီးဖြတ်ပိုင်း



ယုဂျီနီယာ မုရ်းစိတ် ၁၀၀၀ ကျော်တွင်ပါဝင်သော ‘ယုဂျီနီယာ အေကီယာ’ ၏ ဒေသရင်းမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်သည်။



သစ်မာပင်ယေ မာလကာပင်၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသရှိက ဖြစ်သည်။



‘ပုလင်းဆေး ဝက်မွှင်ဘီး’ ပင်၏ ပန်းခိုင်သည်ပုလင်းဆေးသောဝက်မွှင်ဘီးပုံရှိ၏။



‘စက္ကူအခေါက်’ ပင် ၏ အရွက်မှ ‘ကာဂျူပွတ်’ ဆီ ရသည်။ အခေါက်ကို လှေရေလုံစေရန် အသုံးပြုသည်။



လေးညှင်းသည် ‘ယုဂျီနီယာ ကယ်ရီယိုဖီးလတ်’ ၏ ပွင့်ဖူးအခြောက်ဖြစ်သည်။



အသီး



ညနေပရင်းမရို့ ပင်၏အဝါရောင်အပွင့်သည် ညနေပိုင်း၌သာ ပွင့်၏။

‘မီးပေါင်း’ ပင် (ယာအစုန်) သည် မီးလောင်မြေတွင် ကောင်းစွာ ပေါက်သည်။ ‘ယုဂျီနီယာ ဟိုက်ဗရစ်ဒါ’ (ယာ) သည် အမြဲစိမ်း ချုံပင်ဖြစ်သည်။ လှပသော အပွင့်များကြောင့် တန်ဖိုးရှိ၏။

ညနေပရင်းမရို့ မုရ်းရင်း

‘ညနေပရင်းမရို့’ မုရ်းရင်းဝင် မုရ်းစိတ် ၆၅၀ အနက် ‘ယုဂျီနီယာ’ ပင်သည် လှပပြီး ညွတ်ကျနေသောအပွင့်ကြောင့် ထင်ရှားသည်။ အခြားအပင်များ၏ အပွင့်များသည် ညနေပိုင်းတွင်သာပွင့်ပြီး ပိုးဖလံများဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးသည်။ အများအားဖြင့် သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဒေသရင်းမှာ သမပိုင်းတိုင်းဖြစ်သည်။ အရွက်များသည် ရွက်ဆိုင် သို့မဟုတ် ရွက်လွှဲအနေအထားရှိသည်။ အချို့မုရ်းစိတ်၏အစေ့များ၌အမျှင်များရှိသောကြောင့်လေတွင်လွင့်ပါနိုင်သည်။



တိုက်ကပ်နွယ်မျိုးရင်း


တိုက်ကပ်နွယ်ပင်၏ အရွက်များသည် အဆောက်အအုံ နံရံတို့၌ တွယ်တက်နေ တတ်ပြီး ၎င်းရှုခင်းသည် အနောက်နိုင်ငံများတွင် ကဗျာဉာဏ်ကုန်စရာမြင်ကွင်း တစ်မျိုး ဖြစ်ခဲ့သည်။ မျိုးစိတ် ၈၀၀ ရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် 'ဂျင်ဆင်'ပင်မှာ အရှေ့တိုင်း၌ နာမည်ကြီးသည်။ ဂျင်ဆင်ကို တရုတ်ရိုးရာအားဆေးများတွင် သုံးသည်။ ၎င်း၏အပွင့်သည် သေးငယ်ပြီး အသီးမှာ 'ဗယ်ရီ'သီး ဖြစ်သည်။



အမြစ်တို့ များပြင့် တွယ်တက်သော ဥရောပ တိုက်ကပ်နွယ်ပင်



ဆောင်းဦးပေါက်တွင်ပွင့်သော အမြစ်မီး နွယ်ပင်



ဓမ္မန်နက်ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံပင်ဖြစ်ပြီး တူရကီနိုင်ငံရှိ ရှေးခေတ် အဆောက်အအုံပျက်များကြား၌ ပေါက်နေသည်။



တခါတရံ အဝဲပင်ဟုခေါ်သော ထီးပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အရှေ့မြောက်ဩစတြေးလျ ဖြစ်သည်။ ရှည်လျားပြီးပြန့်ကားသောပွင့်ကိုင်းများရှိခြင်းကြောင့် အဝဲဟုလည်းခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

မုန်လာဥဝါမျိုးရင်း

မုန်လာဥဝါတွင် ဗီတာမင်အေ၏ အရင်းခံဖြစ်သော 'ကယ်ရိုတင်း' များစွာ ပါဝင်သည်။ မျိုးစိတ် ၂၉၀၀ အနက် 'ဟင်းမလော့'ပင်မှ အဆိပ်ထုတ်ယူနိုင် သည်။ ဒဿနပညာရှင် ဆိုကရေးတီးသည် အစိုးရကို ဝေဖန်သဖြင့် ဟင်းမလော့ပင်မှ အဆိပ်ကို သောက်၍ သေစေရန် ၈ ရံ အာဏာပိုင်များက အမိန့်ပေးခဲ့သည်။

အစားအစာ အမျိုးမျိုးကို မုန်လာဥ ဝါမျိုးရင်းမှရရှိသည်။ တရုတ်နံနံ၊ ပါစလေး၊ ဓမ္မန်၊ နံနံ၊ ဓမ္မန်နက်နှင့် မြင်းခွာတို့သည် မုန်လာဥဝါ မျိုးရင်းဝင် အချို့ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် များစွာ သည် အနံ့ရှိသော အခေါင်းပွ သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်ပြီး ငှက်မွေးပျံရွက်ပေါင်းများရှိသည်။



မုန်လာဥဝါသည် ရေသောက်မြစ် ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို စားနိုင်သည်။



'ဂျာဗားပါစလေး'ပင်၌ တွားသွား သော ပင်စည်များရှိသည်။ စွတ်စို သော နေရာများတွင်ပေါက်သည်။



ဥရောပမှ နှစ်နှစ်ခံ ဟင်းမလော့ပင် တွင် ပြင်းထန်သော အဆိပ်ပါသည်။



ဂျာဗားမြင်းခွာ၌ တွားသွားသော ပင်စည်ရှိသည်။ အရိပ်ရသော နေရာ တွင် ပေါက်သည်။



'အင်ဂျယ်လီကာ'ပင်ကို ကိတ်မုန်တွင် အနံ့အရသာ ရှိစေရန် သုံးသည်။ ဆေးအဖြစ်သုံးခဲ့သည်။

ဒေါဂုဗျိုးရင်း

အလွန်လှပသော အပွင့်ဆောင် သစ်မာပင်အမျိုးမျိုးသည် ‘ဒေါဂု’ မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ အဖြူ သို့မဟုတ် အနီရောင် အပွင့်ငယ်တို့သည် အစုအပြုံလိုက် ပွင့်သည်။ ၎င်းအပွင့်ကို အဖြူနှင့် ပန်းနုရောင်ပွင့်ခွက်ကြီးများက ဝန်းရံထားသည်။ ‘ကော်နတ် ကော်ဆွန်’ ၏ အသီးသည် စားကောင်းသော်လည်း အခြား ဒေါဂုဗျိုးစိတ်၏ အသီးအမျိုးစုမှာ အဆိပ်ဖြစ်စေတတ်သည်။



ဒေါဂုဗျိုးပုဒ်မျိုး (ဝဲ) ကို ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်သည်။ ‘ဗန်ဗယ်ရီ’ပင် (ယာ) တွင် အပွင့်များ အစုလိုက်ပွင့်သည်။

ဝင်းတားဂရင်းမျိုးရင်း


ဝင်းတားဂရင်းမျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၃၅ မျိုး အနက် တမျိုးမှ ဝင်းတားဂရင်းဆီကို သကြားလုံး၊ ‘ချူးယင်းဂမ်း’၊ သွားတိုက်ဆေးနှင့် ဆေးဝါးတို့တွင် ရန်အတွက် ထည့်သည်။ အခြား မျိုးစိတ်တမျိုးမှ ဆီကို လင်နပ်လိမ်းဆေးအဖြစ် သုံးသည်။ သောက်လျှင် အဆိပ်ဖြစ်သည်။

ဝင်းတားဂရင်းပင်တို့သည် မြောက်ဘက်အာတိတ်ဒေသအထိ ပေါက်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ သေးငယ်၍ ဝိုင်းသောအရွက်တို့မှာ ဆောင်းတချိန်လုံး စိမ်းလန်းရှင်သန်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် နှစ်ရှည်ခံပင်များဖြစ်ပြီး မြေအောက် တွားသွားပင်စည်ရှိသည်။ အချို့တွင် ခေါင်းလောင်းပုံ အပြွန်ရောင် အပွင့်များ ရှိသည်။ မျိုးစိတ်အနည်းငယ်မှာ သစ်ဆွေးပေါ်တွင် ပေါက်သည်။

ဟက်သာမျိုးရင်း

‘ဗလူးဗယ်ရီ’၊ ‘ကရင်ဗယ်ရီ’နှင့် ‘ဗရိုင်ယာ’တို့သည် ‘ဟက်သာ’မျိုးရင်းဝင် အပင်များဖြစ်သည်။ ဗရိုင်ယာအမြစ်ကိုဆေးတံ ပြုလုပ်သည်။ တောင်လေပင်လည်း ဤ မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ လှပသောအပွင့်များ ရှိသည်။

အပင်အမျိုးစုမှာအမြစ်ခွံချုပ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၉၀၀ နီးပါးတို့သည် နေရာတည်းစွဲပေါက်သောအပင်များမဟုတ်ကြပေ။ အပူပိုင်းတောင်စောင်းများမှ အာဖရိတ်ဒေသအထိ ပေါက်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့် သစ်ပုပ်မြေတွင် ပေါက်သည်။



ဝင်းတားဂရင်းပင်သည် အမြစ်ခွံ ချုပ်ငယ် ဖြစ်သည်။ တောင်စောင်းများတွင် ပေါက်သည်။



‘ဗဲဟက်သာ’ပင် နှင့် အပွင့်ငယ်ပွင့်သော ‘ကော်လူနာ ဗာလဂါရစ်’ ချုပ်



ဥယျာဉ်များ နှစ်သက်သော ‘အင်ကီယန်သတ် ပိရူလေးတတ်’ ရွက်ကြွေချုပ်



ရွက်ကြွေချုပ် ‘ရိုဒိုဒင်ဒရွန်ဂျပ်နီနီကတ်’



အမြစ်ခွံ ချုပ် ‘ရိုဒိုဒင်ဒရွန်မက်ကရိုဆက်ပလမ်’



‘အယ်ရီကာ မမ်မိုဆာ’သည် ဟက်သာမျိုးရင်းဝင် အယ်ရီကာမျိုးစု၏ မျိုးစိတ် ၅၀၀ တင် ပါသည်။ ဒေသရင်းမှာ တောင်အာဖရိက ဖြစ်၏။



‘ပရင်းမရို’ ပင်သည် ဥရောပသစ်တောများတွင် ပေါက်သည်။



အယ်လပိုင်း စနိုးဗဲပင်



နှစ်ရှည်ခံပင်၏ ‘ဆိုက်ကလာမင်’ ပင်တွင် နှလုံးပုံ အရွက် ရှိသည်။

ပရင်းမရို မျိုးရင်း

ပရင်းမရို မျိုးရင်းတွင် သစ်ပျော့ပင်မျိုးစိတ် ၈၀၀ ခန့် ပါဝင်သည်။ ထူးဆန်းသည့် မျိုးစိတ်တမျိုးမှာ ‘ကြက်သွေးရောင်ပင်ပါနယ်’ ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပွင့်ချပ်များပိတ်နေလျှင် ရာသီဥတုကြမ်းတမ်းမည်ဟု ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ အပင်အများစုကို မြောက်ဘက်သမပိုင်းဒေသတွင် တွေ့ရသည်။ နွေဦးတွင် အပွင့် ပွင့်သည်။ အယ်လပတောင်တွင် ဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးကြောင်းကို ‘အယ်လပိုင်းစနိုးဗဲ’ ပင် ပွင့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။

ကန့်ချုပ်မျိုးရင်း

အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့် မြေထဲပင်လယ် တဝိုက်တွင်ရှိသော ပင်လယ်ကမ်းခြေများနှင့် ခြောက်သွေ့သော ဒေသတို့၌ ပေါက်သည်။ သစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ချုပ်ပင်များဖြစ်သည်။ ကုရှင်ပုံအကြမ်းခံ ‘သရစ်’ ပင်မှအစ အပူပိုင်းဒေသပေါက် ချုပ်ပင်ဖြစ်သော ‘မော်ဂက်မီနော့’ ပင်အထိ ပါဝင်သည်။



ဥရောပ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ပေါက်သော သရစ်ပင်

သကြားသီးမျိုးရင်း

‘ချူးယင်းဂမ်း’ ရရှိသည့် နို့စေးထွက်သော ဤမျိုးရင်းတွင် သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုပ်ပင်များ ပါဝင်သည်။ နို့စေးကို အခြောက်ခံသောအခါ ကော်စေးအားလုံး၏ အခြေခံဖြစ်သော ‘ချိုကယ်’ ကို ရသည်။ မျိုးစိတ် ၈၀၀ အနက် တမျိုးမှ ထွက်သော နို့စေး ‘ဂတ်တာပါချာ’ ကို ရေအောက်ကြေးနန်းဖုံးအုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ အပင်အားလုံး၏ ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်အချို့၏ အသီးသည် အရသာရှိသည်။



ကန့်ချုပ်ပြာသည် ‘တောင်အာဖရိကရှိ အလှစိုက်ချုပ်’ ဖြစ်သည်။

အက်ဗောနီမျိုးရင်း

‘အက်ဗောနီ’ ပင်၏ အနက်ရောင်အနှစ်သားသည် ကျော်ကြားသော သစ်သားဖြစ်သည်။ မာကျော၍ ခိုင်ခံ့ပြီး အရောင်တင်လိုက်လျှင် တောက်ပသည်။ ဗီရို၊ အနက်ရောင် စန္ဒရာခလုတ်နှင့် ယခင်က သင်္ဘောပန်ကာဝင်ရိုး ပြုလုပ်ရန် သုံး၏။ မျိုးစိတ် ၃၂၅ မျိုးသည် ချုပ်ပင်နှင့် သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် သားရေကဲ့သို့သော အရွက်များရှိပြီး ပူနွေးသောဒေသတွင် ပေါက်သည်။ အက်ဗောနီမျိုးရင်းဝင် တည်ပင်၏ အသီးသည် အရသာရှိသည်။



အရှေ့အာရှနှင့် မြေထဲပင်လယ်ဒေသရှိ တည်ပင်၏အပွင့်နှင့် အသီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဒေသရင်းမှာ အိန္ဒိယပြည် ဖြစ်သည်။

သကြားသီး (ဝဲ) တွင် အရသာရှိသောအညိုရောင်အသား ရှိသည်။



ဗောက်သီးပင်၌ မီးအိမ်သဏ္ဌာန် ပွင့်ပတ်များ ရှိသည်။



ခရမ်းပင်၏ဒေသရင်းမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။



ငရုတ်ပင်၏ အသီးနှင့် အစေ့တွင် ဓမ္မသော အရသာရှိသည်။




ခရမ်းချဉ်ပင် ကို ကမ္ဘာအနှံ့စိုက်ပျိုးသည်။ မျိုးပြားများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက် အချို့သည်ထူးခြားလာ၍ သဘာဝအလျောက် မျိုးပွားနိုင်ခြင်းမရှိ။

ဤမျိုးရင်းဝင်သီးနှံများကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့် ရောနှောချက်ပြုတ်သည်။ အင်အားကို တိုးပွားစေသော အရေးပါသည့် အစားအစာတွင် အပါအဝင်ဖြစ်သောအာလူးကို ကမ္ဘာအနှံ့ စားသုံးသည်။ ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ဗီတာမင်စီ ပါဝင်သည်။ ‘ပိကျူနီယာ’ပင်မှ လှပသောအပွင့်ရသည်။ ‘ဗယ်လာဒိုနာ’ပင်၏ ‘ဗယ်ရီ’သီးမှရသော ဆေးကို လူနာအား မေ့ဆေးမပေးမီ အသုံးပြုသည်။

ဆေးရွက်ကြီးပင်၏အရွက်ကို သောက်ရှူနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် ‘နစ်ကိုတင်း’အဆိပ်ပါသည်။ ထို့ပြင် ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်များသည် အမျိုးမျိုးအသုံးဝင်သည်။ မျိုးစိတ် ၂၀၀၀ ခန့် ရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းနှင့် သမုပိုင်းဒေသများဖြစ်ပြီး နွယ်တက်သောချုပ်ပင် သို့မဟုတ် သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။



‘ကျူဗာ’ဖြစ်သော အာလူး၏ဒေသရင်းမှာ တောင်အမေရိက ဖြစ်သည်။ အချို့နိုင်ငံများတွင် အာလူးသည် အနပ်တိုင်းမပါမပြီးသော စားဖွယ် ဖြစ်သည်။



ပိကျူနီယာပင်သည် တနှစ်ခံပင် ဖြစ်၏။ မျိုးပြားများသည် အာကျင်တီးနားနိုင်ငံရှိ မျိုးစိတ်နှစ်မျိုးမှ ပွားများလာသည်။



ပဒိုင်းပင် (ဝဲ) ဖြစ်သည်။ ဆေးရွက်ကြီးပင် (ယာ) ကို နယ်သစ်ရှာသော ဥရောပတိုက်သားများက အမေရိကန်အင်ဒီးယန်းများထံမှ ယူဆောင်ခဲ့သည်။

ဗယ်လာဒိုနာပင်၏ ဗယ်ရီသီးများတွင် ‘အေထရီပင်း’ ပါဝင်ပြီး ၎င်းသည် အာရုံကြောအဖွဲ့ကို ထုံထိုင်းစေသည်။

ကျားပါးစပ်မျိုးရင်း


ကျားပါးစပ်မျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၃၀၀၀ ပါဝင်ပြီး အရောင်အသွေးစုံသည့် အပွင့်များကြောင့် လူသိများသည်။

ကျားပါးစပ်ပွင့်များတွင် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု ရှိပြီး အပွင့်ကိုဘေးမှပေးခြင်းဖြင့် နှုတ်ခမ်း များကို ရုတ်ခြည်းပွင့်စေနိုင်၊ ပိတ်စေနိုင်၏။ ဤမျိုးရင်းဝင် ‘ပေါ်လိုနီယာ’ ပင်၏ သစ် သားမှာ ပေါ့ပါးပြီး ကြာရှည်ခံသည်။ အလွန်အစွမ်းထက်သော နှလုံးရောဂါကု ဆေးကို ‘ဒစ်ဂျစ်တယ်လစ်’ပင်မှ ရသည်။

အပင်အများစုသည် သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ အချို့မှာ ကပ်ပါးတပိုင်း ဖြစ် သည်။ အသီးတွင် အစေ့များစွာပါသည်။



တနှစ်ခံ ပေါင်းပင်ဖြစ်သော ‘ငှက်မျက်စိ’ ပင်၏ ဒေသရင်းမှာ ဥရောပဖြစ်သည်။



ပေါ်လိုနီယာပင်မှ အဖိုးတန်သစ် သားရသည်။

ဖော်ဂက်မီနော့မျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ခန့်သည် ပူနွေးသောဒေသများတွင် ပေါက်သည်။ အပွင့် တွင် ကတော့ပွင့်ချပ်အုံ့ဝိုက်နှင့် ဝတ်ဆံဖို ငါးခု၊ မအင်္ဂါတခုရှိသည်။ ၎င်းအပင်များ နှင့် ပတ်သက်၍ ဣန္ဒာရီပုံပြင်များ များစွာ ရှိခဲ့သည်။ ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်တခုသည် ကမ္ဘာ့ ပထမ ချစ်သူစုံတွဲ ဇာဒမ်၊ ဝေန်ဒိုပင် ပတ် သက်နေသည်။



နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင် ‘ဖော်ဂက်မီနော့’ ပင်တွင် အပြာရောင် အပွင့် ငယ် များ ရှိသည်။



အပူပိုင်းအမေရိကရှိ ‘ကြိုးချိုဖုတ်’ ပင်၏ အခေါက်မှ လျှော်မျှင်ရသည်။



‘မြေခွေးလက်အိတ်’ခေါ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လစ်ပင် (ဝဲ) သည် ဥရောပတွင် အလေ့ကျပေါက်သော နှစ်နှစ်ခံသစ်ပျော့ပင် ဖြစ်သည်။ ကျားပါးစပ်ပင် (ယာ) များသည် နှစ်နှစ်ခံပင်များ ဖြစ်သည်။

နှမ်းမျိုးရင်း

အပူပိုင်းဒေသရှိ သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ် ၅၀ ခန့်ရှိသည်။ နှမ်းပင် ပါဝင်သောကြောင့် ဤမျိုးရင်းကို လူသိများ၏။ နှမ်းစေ့များကို အစားအစာ များတွင် ထည့်၍လည်းကောင်း၊ နှမ်းဆီကို ချက်ပြုတ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည်။ နှမ်းဆီသည် ဆူဒန်နိုင်ငံမှ အများဆုံးထွက်သည်။ မျိုးရင်းဝင် အသီးများမှာ ‘ကက်ပဆူး’ သို့မဟုတ် ‘ခွံမာသီးများ’ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ်အချို့၏ အသီးတွင် ဆူးပါသည်။



နှမ်းပင်

သံလွင်မျိုးရင်း

သံလွင် ပင်၏ သစ် ခက်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး သင်္ကေတအဖြစ် အနောက်တိုင်း ယဉ်ကျေးမှုတွင်သုံးသည်။ ၎င်းအပင်များကို မွေးကြိုင်သောအသီးနှင့် မာကျော၍ လှပသောသစ်သားအတွက် စိုက်ပျိုးသည်။ အသီးကို နှစ်ရှည်သိုလှောင်၍ လည်းကောင်း၊ ဆီကြိတ်ယူ၍လည်းကောင်း စားသုံးသည်။ ဤမျိုးရင်းဝင် စံပယ်ပင်၏ အပွင့်ကို တရုတ်လူမျိုးများက လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတွင် ထည့်၍ သောက်သည်။ စံပယ်ဆီကို ရေမွှေးနှင့် ဆပ်ပြာပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည်။

အပင်မျိုးပေါင်း ၄၀၀ ခန့်သည် ချုံပင်မှ သစ်မာပင်အထိဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ် များစွာသည် အာရှနှင့်မြေထဲပင်လယ်ဒေသတွင်ပေါက်သည်။ ခေါင်းလောင်းပုံ အပွင့်များရှိသည်။



သံလွင်ပင်သည် အမြဲစိမ်းနှစ်ရှည်ခံအပင်ဖြစ်ပြီး မြေထဲပင်လယ် ဒေသတွင် စိုက်သည်။

ဗတ်လီယာမျိုးရင်း

အလွန်ပြင်းထန်သည့် အဆိပ်တမျိုးဖြစ်သော ‘ထရစ်ခန်း’ ကို ‘ဗတ်လီယာ’ မျိုးရင်းဝင် အပင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းအဆိပ်ကို အစေ့ခွံမှ ထုတ်ယူနိုင်သည်။ အဆိပ်သင့်လျှင် ပြင်းထန်စွာတက်ခြင်းဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ အရွက် များသည် ရွက်ထီးဖြစ်ပြီး ရွက်စွယ်များရှိ၏။ အပူပိုင်းဒေသတွင်ပေါက်သည့် အန္တရာယ်မပေးနိုင်သော မျိုးပြား ၈၀၀ ခန့် ရှိသည်။



‘ဗတ်လီယာ ဒေဗီဒီ’ကို တရုတ်ပြည်သမုဒိုင်းရှိ ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်သည်။



ချုံပင်ငယ်ဖြစ်သော စံပယ်ပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အာရှဖြစ်သည်။

ဂျင်ရှင်မျိုးရင်း

အပြာရောင် ‘ဂျင်ရှင်’ပွင့်များသည် ဥရောပရှိ အယ်လပိုင်းဒေသ မြက်ခင်းပြင် များတွင် နှင်းခဲများပျော်ချိန်၌ ပွင့်လေ့ရှိသည်။ မျိုးစိတ် ၈၀၀ ရှိပြီး အဝါ၊ အပြာနှင့် အနီရောင် အပွင့်များ ပွင့်သည်။ အဝါရောင်ပွင့်သော မျိုးပြား တမျိုး၏ အမြစ်မှာ အရသာခါးပြီး ဆေးဖက်ဝင်သည်။



နွေဦးရာသီ၌ ပွင့်လေ့ရှိသော ဂျင်ရှင်ပင်နှင့် ‘ပရင်းမရို’ ပင်တို့ ဖြစ်သည်။



အဖြူပွင့်ရှိသောဂျင်ရှင်ပင်သည် အာရှရှိ ရေကန်၊ ရေမြောင်းများတွင် ပေါက်သည်။

သဘောမညိုမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၁၃၀၀ အနက် အများစုသည် အပူပိုင်းရှိ ချုံပင်ဖြစ်ပြီး လှပသော အပွင့်များ ရှိသည်။ ဘုမ္မရာဇာနှင့် ‘ဝထရီပင်းသတ်’ ပင်တို့မှ အဖိုးတန်ပရဆေးထုတ်ယူနိုင်သည်။ ပန်းရောင်ပွင့်ရှိသော သဘောမညိုပင်မှ ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ဖျက်နိုင်သော ဆေးရရှိသည်။



နွယ်သင်္ကပင်တွင် နှလုံးကို အဆိပ်ဖြစ်စေသော ‘ဂလူကိုဆိုက်’ ပါရှိသည်။



အကျော်ပင်၏ဒေသရင်းမှာ အပူပိုင်းအမေရိက ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် မွေးသောပန်းများ အဆုတ်လိုက်ပွင့်သည်။



ရွှေဝါပန်းပင်သည် သစ်မာပင်ဖြစ်ပြီး အစေးသည် ဝမ်းသက်စေနိုင်သည်။



ပန်းရောင်ပွင့်ရှိသော သဘောမညိုပင်တွင် နို့စေးပါသည်။

မုရိုးမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင် အပင်များတွင် များသောအားဖြင့် အဆိပ် ဖြစ်နိုင်သည့် ပျစ်သောနှိုးစေးများရှိသည်။ မျိုးစိတ် ၈၀၀ ခန့်ရှိပြီး သစ်ပျော့ပင်၊ ချုံပင် သို့မဟုတ် သစ်ကပ်ပင်များဖြစ်၍ အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသတို့တွင် ပေါက်သည်။ မုရိုးပင်များ၏ အသီးများသည် မှည့်လျှင် နှစ်ခြမ်းကွဲပြီး အမွှေးပါသောအစေ့များ လေတွင်လွင့်ပါသည်။




အမေရိကအပူပိုင်းဒေသမှ အဆိပ်ရှိသော မုရိုးပင်တစ်မျိုး



‘စတက်ပီလီယာ’ မျိုးစိတ်နှစ်ခု (အထက်) ၏ အညွန့်ထွက်သော အပွင့်များကို ယင်ကောင်များက ဝတ်မှုန် ကူးပေးသည်။ ‘ဒစ်ချီဒီယာ အက်စတီဖာနာ’ (ဝဲ) သည် ပုရွက်ဆိတ်များ သယ်လာသောအမှိုက်များမှ ဓာတ်ဆားရရှိသည်။

အာဖရိကကျူးလစ်သစ်မာပင်မျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၇၅၀ ပါဝင်သည်။ အပွင့်များမှာ 'ကျူးလစ်' ပန်းနှင့်တူသည်။ မျိုးစိတ်တစ်ခုမျှ ဝက်အူချောင်းပုံအသီးများ တွဲလဲကျနေသဖြင့် 'ဝက်အူချောင်း' ပင်ဟူ၍ အမည်ပေးခဲ့သည်။ ဤမျိုးရင်းတွင် သစ်မာပင်၊ ချပ်ပင်နှင့် နွယ်ပင်များပါဝင်ပြီး အပူပိုင်းဒေသများ၌ တွေ့နိုင်သည်။



အာဖရိက ကျူးလစ်သစ်မာပင်



ကောက်လန်းတိပင်တစ်မျိုး

ကောက်လန်းတိမျိုးရင်း

မျိုးရင်းဝင်အပင်အားလုံးသည် အမြစ်ကပ်ပါးပင်ဖြစ်၏။ အရွက်များသည် ရွက်ဖတ်ငယ်များဖြစ်ပြီး 'ကလိုရိုဖီး' မပါရှိပေ။ ထို့ကြောင့် အစာမဖွဲ့စည်းနိုင်ပဲ အခြားအပင်၏အမြစ်များတွင် ကပ်ပါးအမြစ်နေလျက် အစာကိုလက်ခံပင်မှစုပ်ယူသည်။ မျိုးစိတ် ၁၄၀ ရှိသည်။ အပွင့်များမှာ ပြန့်ပွံ့သဏ္ဌာန်ရှိပြီး နှုတ်ခမ်းနှင့်ခွံပါရှိ၏။ ဥရောပနှင့် အာရှရှိ ပူနွေးသောဒေသများတွင် ပေါက်သည်။

ဂလော့ဆီနီယာမျိုးရင်း

'ဂလော့ဆီနီယာ' မျိုးရင်းတွင် အပွင့်ရှိ ပွင့်ချပ်များသည် ပြန့်တခုကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီး ကတော့ပုံ သို့မဟုတ် နှုတ်ခမ်းပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ မျိုးစိတ် ၁၂၀၀ ခန့်အနက် အချို့တွင် ကတ္တီပါသားရှိသော ရောင်စုံအရွက်နှင့်လှပသော အပွင့်များရှိသည်။ အပူပိုင်း၊ အပူလျော့ပိုင်းဒေသနှင့် ပူနွေးသောဒေသတို့တွင် ပေါက်သည်။ အချို့တို့သည် အခြားအပင်ပေါ်တွင် ပေါက်သော သစ်ကပ်ပင်များ ဖြစ်သည်။



စိန်တံချူပင်



'အာဖရိက မိုင်အိုလက်' ပင်သည် နှုတ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်၏။



ကတ္တီပါ သား အပွင့် ရှိသော ဂလော့ဆီနီယာပင် ဖြစ်၏။



'အိပီစီယာ' ပင်သည် တွားသွားသစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းတောင်အဖရိကရှိ အလှစိုက်ပန်းပင် တစ်မျိုးဖြစ်၏။

အပူပိုင်းအာဖရိကရှိ ဝက်အူချောင်းပင်၏ အပွင့်သည် ညဘက်တွင် ပွင့်သည်။ လင်းနို့ များက ဝတ်မှုန်ကူးပေးသည်။

ပူဖောင်းမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်များသည် အသား စား အပင် များ ဖြစ်၏။ ပူဖောင်းပင်များသည် နိုက်ထရိုဂျင်ဓာတ်ရရှိရန် အင်းဆက်ပိုးများကို ထောင်ဖမ်းယူသည်။ အပင်မှစစ်ထုတ်ပေးသော အရည်များသည် အင်းဆက်ပိုး၏ ခန္ဓာကိုယ်ကို အရည်ဖြစ်အောင် ပြေပေးသည်။ ထိုအရည်ကို အပင်က စုပ်ယူသည်။

၎င်းတို့ကို ကမ္ဘာအနှံ့တွေ့နိုင်သည်။ ရေထဲတွင်ပေါက်ပြီး အပွင့်များမှာ ရေပေါ်တွင် ပေါ်နေသည်။ ပင်စည်မှာသေးသွယ်ပြီး အမြစ်များ မရှိပေ။ သေးမျှင်ပြီး အစိတ်စိတ်ကွဲနေသော အရွက်များတွင် ပူဖောင်းငယ်များစွာ ရှိသည်။ ၎င်းတို့ဖြင့် အင်းဆက်ပိုးများကို ထောင်ဖမ်းယူသည်။




‘ဗတ်တာဝပ်’ပင်၏ အရွက်အပေါ်မျက်နှာပြင်ရှိ စေးကပ်သော အမွှေးများမှထွက်သည့် အရည်များဖြင့် အင်းဆက်ပိုးကို ကြေညက်စေသည်။

ခရာမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၂၂၀၀ ရှိသည်။ အပူပိုင်းဒေသပေါက် သစ်ပျော့ပင်နှင့် ချုံပင်များ ဖြစ်သည်။ ဒွီလိုင်ရှိသော ခရမ်းရောင် သို့မဟုတ် အဖြူရောင်အပွင့်များ ရှိ၏။ အရွက်တွင် ဆူးရှိသည်။

ရှေးဂရိခေတ် ကောင်းစားစဉ်တွင် ဂရိကျောက် ဆစ် ပညာရှင် များ သည် ခရာရွက်ပုံသဏ္ဌာန်များကို အဆောက်အအုံများ၌ လှပစွာ ထုလုပ်ခဲ့ကြ၏။ ၎င်းလက်ရာဒီဇိုင်းများကိုနှောင်းခေတ် ‘ကော်ရင်သီယမ်’ ကျောက်တိုင်များ၌ပင် ဆက်ခံထုလုပ်ခဲ့သည်။



ခရာပင်ကို ဆားဓာတ်ပါသည့် ရွှံ့ညွန်များတွင် တွေ့ရသည်။

ပူဖောင်းဖြတ်ပိုင်း

ပူဖောင်းတခုလုံး



ပူဖောင်းပင်ရှိ ပူဖောင်း၏ အခင်အမွှေးများကို အင်းဆက်ပိုးက မိမိလျှာဖြင့် အခင်ပွင့်ပြီး အင်းဆက်ပိုးသည် ရေနဲ့ အတူ ပူဖောင်းအတွင်းသို့ စုပ်သွင်းရသည်။



ပန်းရေစွတ်နွယ်သည် အရှေ့တောင်အာရှရှိ သစ်မာနွယ်ပင် ဖြစ်သည်။



‘အောက်သတ် ဟာဆူတတ်’ သည် သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်၏။



‘ဂျက်ဗီနိုယာ ကာနီယာ’သည် တနင်္ဂပတ်လုံး ပွင့်သည်။


ပန်းကန်စွန်းနွယ်မျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၁၂၀၀ ရှိသည်။ ကန်စွန်းဥတွင် ကစိနှင့် သကြား ပါသည်။ သံဓာတ်နှင့် ဗီတာမင်ပါသော ရေကန်စွန်းပင်သည် အရွှေတောင်အာရှ၏ ဟင်းရွက်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ သစ်ပျော့နွယ်ပင်များ ဖြစ်သော်လည်း အချို့မှာ ချုပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အာရှနှင့်အမေရိကရှိ ပူနွေးသောဒေသများတွင် ပေါက်သည်။



တွားသွားသော ‘ဗိုက်တက်’ ပင်သည် အပူပိုင်းရှိ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ပေါက်သည်။

‘ဗာဗီနာ ဟိုက်ဗရစ်ဒါ’ သည် မျိုးစပ်ပင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။



ကျွန်းပင်သည်အိန္ဒိယ၊မြန်မာနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင်ပေါက်၏။



ကန်စွန်းကြီးပင်သည် တွား၍ပေါက်သည်။ ရေကန်စွန်းသည် သစ်ပျော့ပင် ဖြစ်၏။

လက်ဝဲဘက်ရှိ မြတ်လေးပင်သည်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ လက်ဝဲအစွန်ရှိ ‘ဂျပန်ပတ်နွယ်ပေါင်း’ ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံ နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ ကန်စွန်းမျိုးရင်းဝင် အပင်များ ဖြစ်သည်။

ကျွန်းပင်မျိုးရင်း

ကျွန်းပင်၏သစ်သားသည်ခိုင်ခံ့သောကြောင့် ပရိဘောဂနှင့်လှေသင်္ဘောများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်သဖြင့် ၎င်းကို ရာစုနှစ် များစွာကပင် တန်ဖိုးထားခဲ့ကြသည်။ မျိုးစိတ် ၂၆၀၀ အနက် အများစု၌ လှပသောအပွင့်များ ပွင့်သည်။ အပင်များသည် သစ်ပျော့ပင်၊ ချုပ်ပင်နှင့် သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။ လေးထောင့်ပင်စည်ရှိ၏။ အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသများတွင် အများဆုံး ပေါက်၏။ အချို့ကို မြောက်သမပိုင်းဒေသများတွင် တွေ့နိုင်သည်။



စိန်နားပန်ပင်သည် အနံ့ရှိသော ချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး ပင်စည်၌ ဆူးများရှိ၏။ အမေရိကအပူပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းနိုင်ငံများတွင် ပေါက်သည်။



ပန်းပဒေသာပင်တွင် ပိရမစ်ပုံပန်းခိုင်ရှိသည်။ ဒေသရင်းမှာ အာဖရိကအပူပိုင်းဖြစ်သည်။

ပင်စိမ်းမျိုးရင်း



ရှေးကပင် ‘လာမင်ဒါ’ ပင်၏ အဆီကို ဆပ်ပြာနှင့် ရေမွှေးတွင် ရနံ့သင်းစေရန် သုံးသည်။



ရောင်စုံ အရွက် များရှိသည့် ရွက်လှပန်း ကို ပူနွေးသော ဒေသတွင် စိုက်သည်။



‘ဂါဒင်ဆေး’ပင်သည် ရနံ့ရှိချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး အစားအစာတွင် ရနံ့သင်း စေရန်အပြင် လက်ဖက်ခြောက်နှင့် ဝိုင်ပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည်။

ပင်သော်၊ ပင်စိမ်း၊ ‘မာဂျော်ရမ်’၊ ‘ပက်ပါမင့်’ နှင့် ‘တိုင်း’ပင်တို့သည် ပင်စိမ်း မျိုးရင်းဝင်များ ဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၃၂၀၀ အနက် အချို့မျိုးစိတ်မှ ထွက်သော နံ့သာဆီကို ရေမွှေးတွင် ရနံ့သင်းစေရန် သုံးသည်။

မျိုးစိတ်များကို ကမ္ဘာအနှံ့တွေ့နိုင်သည်။ အများစုမှာ သစ်ပျော့ပင် သို့မဟုတ် ချုပ်ပင်များ ဖြစ်၏။ လေးထောင့်ပုံပင်စည်နှင့် ရွက်ဆိုင်များသည် အပင်၏ထင်ရှားသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အပွင့်၏ ပြန့်ကားသော အောက် နှုတ်ခမ်းတွင် ပျားများနားနေစဉ် ဝတ်ဆံဖိုများ ငိုက်ကျလာပြီး ပျားကိုဝတ်မှုန် ဖြင့် လိမ်းကျံပေးသည်။ ပျားဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးစေရန် ဖန်တီးချက် ဖြစ်သည်။



ငါယာမြို့ပင်၏ အရွက်များမှ အဆီကို ဆေးဝါးတွင် သုံးသည်။



‘ရိုးစမေရီ’ ပင်ကို ဟင်းခတ် အမွှေး အကြိုင် အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရေမွှေး ပြုလုပ်ရာတွင်လည်းကောင်း သုံးသည်။



တိုင်းပင်များ ထူထပ်စွာပေါက်နေပုံ (တိုက်ကပ်နွယ်ပင်၏အရွက်များနှင့် ရောနေသည်။) ၎င်း၏အဆီကို ရေမွှေးပြုလုပ်ရာတွင် သုံးသည်။



‘မြေအိုင်ဗီ’ပင်သည် နွေဦးရာသီ ၌ ပွင့်သည်။



‘အနာပျောက်ဆေး’ပင် သည် သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။



‘နဂါးခေါင်းအတု’ပင် သည် နှစ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်သည်။



‘ဂျပန်သွေးတိတ်’ပင်၏ အရွက်ကို သွေးတိတ်ဆေး အဖြစ် သုံးခဲ့သည်။



မင်သော်ပင်ကို အနံ့အရသာ အတွက် သုံးသည်။

အကြာတစ်ထောင်မျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်များသည်ပေါင်းပင်များ ဖြစ်သည်။ အစေ့များကို လှောင်အိမ်မွေး ငှက်များကျွေးနိုင်သည်။ မျိုးစိတ်တခုကို တရုတ်ပရဆေးတွင် ဆေးတမည်အဖြစ် သုံးသည်။

မျိုးစိတ် ၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။ သမပိုင်းဒေသများတွင် အတွေ့ရများသည်။ နှင်းဆီပွင့်ပုံ အနေအထားရှိသော အရွက်နှင့် ကတော့ပုံ အပွင့်ငယ်ရှိသည်။



အကြာတစ်ထောင်ပင်(အထက်)၊ အကြာတစ်ထောင်အပင်ကြီး (ယာ) ကို သမပိုင်းဒေသ၌တွေ့ရသည်။ ဆေးဖက်ဝင်သည်။

ဟန်းနီးဆတ်ကယ်မျိုးရင်း


‘ဟန်းနီးဆတ်ကယ်’ မျိုးရင်းဝင် အပွင့်များတွင် ချိုသောဝတ်ရည်ရှိသဖြင့် ငှက်ပိတုန်းနှင့် ရှည်လျားသောလျှာရှိသည့် ‘အင်းဆက်’ ပိုးများ ကြိုက်သည်။ မျိုးစိတ် ၂၇၅ မျိုးခန့် ရှိသည်။ မွေးသောပန်းများသည် ဘီးပုံ၊ ကတော့ပုံ သို့မဟုတ် နှုတ်ခမ်းပုံရှိပြီး အဖြူမှအဝါသို့ အရောင်ပြောင်းနိုင်သည်။ အတွင်းခွံမာသီး သို့မဟုတ် ‘ဗယ်ရီ’ သီးရှိသည်။ အများစုသည် မြောက်သမပိုင်းဥပဒေများတွင် ပေါက်သည်။



‘ဝေးဖဲရင်း’ ပင်သည် ဥရောပတိုက် ထုံးမြေတွင်ပေါက်သော ချုံပင်မြင့် ဖြစ်၏။

ဗယ်လာရီယန်မျိုးရင်း

‘ဗယ်လာရီယန်’ မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၃၇၀ ခန့်ရှိသည်။ အပင်များကို ဆေးဝါးနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် သုံးသည်။ ဤမျိုးရင်းမှ မျိုးစုတမျိုး၏ အရွက်ကို အစိမ်းစားနိုင်သည်။ ဆေးဝါးအတွက်အသုံးပြုသည့်အဆီကို အခြားမျိုးစုဝင်အပင်များ၏ မြေအောက်ပင်စည်များမှ ထုတ်ယူသည်။ ပင်စည်ထိပ်တွင် စု၍ အပွင့်ပွင့်သည်။



ပန်းရောင်ပွင့်သော ဗယ်လာရီယန်ပင်သည် သေးသွယ်လှပသောလည်း အနံ့မှာ ဆိုးရွားသည်။




ရနံ့အသင်းဆုံး ဤဟန်းနီးဆတ်ကယ်ပင်ကို ဟိမဝန္တာမှ အင်ဒိုနီးရှားအထိ တွေ့နိုင်၏။

ကော်ဖီမျိုးရင်း

လက်ဖက်ရည်ကဲ့သို့ပင် ကော်ဖီသည်လည်း နှစ်ခြိုက်စွာ သုံးဆောင်ကြသော စားသောက်ဖွယ်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ သို့သော် မျိုးရင်းဝင် အပင်များသည် ဆေးဝါးအတွက်လည်း ကျော်ကြားသည်။ ‘ဆင်ကုန်’ပင်၏ အခေါက်မှရသော ‘ကွီနိုင်း’ဆေးသည် ၎င်းတို့များကို ကုသနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိချိန်မှစ၍ ဆေးကောင်းတမည် ဖြစ်ခဲ့သည်။ မျိုးစု ‘အန်ကာရီယာ’သည် သားရေနယ်ရာ၌ အသုံးဝင်သည်။

ကော်ဖီမျိုးစိတ်များစွာ ရှိသည်။ ဒေသအလိုက် ကော်ဖီပင်မျိုးပေါ်မူတည်၍ အနံ့အရသာ ကွာခြားသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရောစပ်ခြင်းဖြင့် ကော်ဖီအမျိုးမျိုး ရနိုင်သည်။ အမြဲစိမ်းချုပ်ပင်ဖြစ်ပြီး ‘ဗယ်ရီ’သီးရှိသည်။ အသီးရင့်မှည့်ချိန်တွင် အစေ့များကို အခြောက်လှန်းပြီး အနံ့ရရှိရန် လှော်ရသည်။

ဤမျိုးရင်း ဝင် အပင် များသည် သစ်ပျော့ပင်၊ ချုံပင်၊ နွယ်ပင်နှင့် သစ်မာပင်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို နွေးသောဒေသများတွင် တွေ့နိုင်သည်။ အရွက်များသည် ရွက်ဆိုင် သို့မဟုတ် စက်ဝိုင်းပတ် အနေအထား ရှိသည်။



ကော်ဖီပင်၏ဒေသရင်းမှာ အာဖရိကဖြစ်၏။ ယခုအခါ အပူပိုင်းဒေသများ၏ အရေပါသော စီးပွားဖြစ်သီးနှံပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အပွင့်သည် မွှေးသည်။



ဂျာဗားပုဏ္ဏရိုက်ကို အလေ့ကျပ်ပင်နှင့် စိုက်ပျိုးပင် အဖြစ် တွေ့ရသည်။ ပန်းရောင်နှင့် အဝါရောင်ပွင့်သော မျိုးပြားများလည်း ရှိသည်။



အနောက်အာဖရိကရှိ ပွင့်တူရွက်တူပင်တွင် ကြက်သွေးရောင် ပွင့်ပတ်များ ရှိသည်။ အဝါ၊ အဖြူ၊ လိမ္မော်ရောင် အပွင့်များလည်း ရှိသည်။



ဇီဝေါပွင့်တွင် မွှေးသော ရနံ့ ရှိသည်။



‘မက်ဒါ’ပင်၏အမြစ်မှဆိုးဆေးအနီရ၏။




တောင်အမေရိက ဆင်ကုန်ပင်၏ အခေါက်မှရရှိသော ကွီနိုင်းကို ဆေးအဖြစ် သုံးသည်။

ဗူးမျိုးရင်း

ရွှေပရုံ၊ ဖရုံ၊ သခွား၊ ခွံကြမ်းသခွားမေး၊ အပူပိုင်းအမေရိက ဖရုံမျိုးနှင့် ဖရုံမျိုးသည် ဗူးမျိုးရင်းဝင်အသီးများ ဖြစ်သည်။ အသားများကို ခြစ်ထုတ်၍ အသီးကို အခြောက်ခံလျက် လိုသလိုလှီးယူပြီး ဗူးများ၊ ခွက်များနှင့် တူရိယာ ပစ္စည်းများပြုလုပ်သည်။

မျိုးစိတ် ၇၀ ရှိသည်။ အမေးထူသော တနှစ်ခံ သစ်ပျော့ပင်များဖြစ်ပြီး နှာမောင်းများဖြင့် နွယ်တက်သည်။ အဖိုပွင့်နှင့် အမပွင့်သည် မျိုးစိတ်ကို လိုက်၍ တပင်တည်း သို့မဟုတ် သီးခြားအပင်တွင် ပွင့်လေ့ရှိသည်။ ကြီးမားသည့် 'ဗယ်ရီ' သီးများ ရှိသည်။



ဗူးခါးပင် (အထက်) သည် အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။ မာကျောသောအသီးခွံကို ရေဗူး အဖြစ် သုံးသည်။

ဂျပန်ရှိ 'ထရိုင်စကီဆန်သီ' နွယ်ပင်၏ အသီးကိုစားနိုင်သော်လည်း ရင့်လျှင် အမြစ်၏နည်းတူ အဆိပ်ဖြစ်သည်။

သပွတ်သီး (ယာ) ကို စားနိုင်သည်။ သပွတ်အူကို တခါတရံ အိုးတိုက်ရာတွင် သုံးသည်။




သခွားသီးကို အစိမ်းစားနိုင်၏။ အမျိုးမျိုး အချဉ်တည်၍လည်း စီးပွားဖြစ် ရောင်းသည်။

ရွှေပရုံပင်ကို ပူနွေးသော ဒေသ များတွင် စိုက်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ရွှေပရုံ အဆာ သွတ်မုန့်ကို လူကြိုက်များသည်။



ကြက်ဟင်းခါးပင်ကို အပူပိုင်းဒေသများတွင် စိုက်သည်။



ဖရုံပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အာဖရိက ဖြစ်၏။ အသီးသည် ချို၏။ အစေ့ကို လှော်စားရ၏။

အဖြူ၊ လိမ္မော်နှင့် အစိမ်းရောင်ရှိ ခွံကြမ်းသခွားမေးအသီးသည် ချိုသည်။

ခေါင်းလောင်းပွင့်မျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းတွင် အပြာနှင့်ခရမ်းပြာရောင် ခေါင်းလောင်းပုံအပွင့်များ ရှိသည်။ မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ခန့်ရှိပြီး သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ မြေ ကံသ မပိုင်း ဒေသတွင် ပေါက်သည်။ အချို့ကို အပူပိုင်းဒေသရှိ တောင်ကုန်း များပေါ်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ပင်စည်တွင် နို့စေးရှိသည်။



‘ပလက်တီကိုဒွန် ဂရန်ဒီမလောရတ်’



‘လိမ္မိလီယာ အီရီနတ်’ ကိုပန်းခင်းများ တွင် စိုက်ပျိုးသည်။



‘ကင်တာဗာရီ ခေါင်းလောင်းပွင့်’ ပင် သည် နှစ်နှစ်ခံ အလှစိုက်ပန်းပင် ဖြစ်သည်။



‘လိမ္မိလီယာ ကီနိုင်စစ်’ သည် အာဖရိကတိုက် ကင်ညာတောင်ပေါ်ရှိ သစ်တောတွင်ပေါက်သည်။ သုံးမီတာကျော် မြင့်သည်။

ဒေစီမျိုးရင်း

‘ဒေစီ’ မျိုးရင်းတွင် မျိုးစိတ် ၂၀၀၀၀ ခန့်ရှိပြီး စေ့ရွက်စုံမျိုးရင်းများအနက် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ဖြစ်၏။ အပွင့်ငယ်များသည် စုစည်းလျက် ဦးခေါင်းငယ် ပန်းခိုင်အဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားသဖြင့် ‘အင်းဆက်’ ပိုး တကောင်တည်းက အပွင့် အားလုံး သို့မဟုတ် အချို့ကို ဝတ်မှုန်ကူးပေးနိုင်သည်။ ပန်းခိုင်များကို ပွင့်ခံ ရွက်များဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။

စားရသော ‘အာတီချုတ်’၊ ဆလတ်နှင့် ပန်းခင်းများတွင် တွေ့နိုင်သော ဂန္ဓမာ၊ ဒေလီယာတို့သည် ဒေစီမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်သည်။ ဂန္ဓမာကိုလွန်ခဲ့သည့် နှစ် ၂၅၀၀ ခန့်ကပင် တရုတ်ပြည်၌ စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။

နေကြာပင်များကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ အင်ဒီးယန်းများက စတင် စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ နေလမ်းကြောင်းကိုလိုက်၍ပွင့်နေတတ်သောကြောင့် နေကြာ ပင်ကို နေ၏အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် ၎င်းတို့က မှတ်ယူခဲ့သည်။

ဆွီဒင်လူမျိုး ရုက္ခဗေဒပညာရှင် အင်ဒါဒါးလ်ကို ဂုဏ်ပြုမှုညွှန်ခေါ်ခဲ့သော ဒေလီယာပင်များကို မျိုးစပ်ခြင်းဖြင့် မျိုးပြားများ ရရှိခဲ့သည်။

မျိုးစိတ်များသည် သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်သည်။ နေကြာသည် နေဘက်တွင်ပွင့်ပြီး ညဘက်တွင်ပိတ်သည်။ အစေ့နှင့်တူသော အသီးများတွင် ရှည်လျားသောအမွှေး များရှိသဖြင့် မိခင်အပင်မှ ကြွေချိန်တွင် လေနှင့်အတူ ပျံလွင့်နိုင်သည်။



လှပသည့် ဒေလီယာ



‘ကော်လာရက် ဒေလီယာ’




ကွင်းပြင်များတွင် ပေါက်သည့် ‘သစ်ဆယ်’ ပင်



တိရစ္ဆာန်များကို အဆိပ်သင့်စေ သည့် ကပ်စေးနှံကြီးပင်




နေကြာတစ်မျိုးဖြစ်သည့် ‘လီ ယွန်တိုပိုဒီယမ် ဂျပွန်နိုကမ်’



ဆေးအဖြစ်သုံးသည့် ဆေးဖက်ဝင် ဒေါနမျိုး



ဆီထွက်နေကြာပင်၊ အစေ့မှ ဆီ ရသည်။



ဝန်ဒီလိုင်ယန်အဖွင့်ရှိ အဝေ့များသည် အချိန် မှန်မှန် ထွက်ကျလေ့ရှိ၏။ ငါဝန်ဒီဟု တင်စားခေါ်သည်။



အမေရိကရှိ 'လျှေ့ဆလင်' အာတီချုတ်တွင် ချက်စားနိုင်သော အာလူးနှင့်တူသည့် ကျူဗာများရှိသည်။



မက္ကဆီကန်မျိုး ထပ်တစ်ရာပန်းပင်သည် တနှစ်ခံပင် ဖြစ်သည်။

'ဝန်ဒီလိုင်ယန်' ပင်ကို မြောက်သမပိုင်းဒေသများတွင် တွေ့ရသည်။ အသီးတွင် အပွေ့ပါသည်။ အောလုံးငယ်များနှင့်တူသည်။



ဘိုးဝိုက်ဂန္ဓမာပင်များ



'ဘီချီမိုညီ' ဂန္ဓမာအပွင့်ကြီးမျိုး

ဩစတြေးလျပန်းခြောက်မျိုးသည် အပွင့်ကြာရှည်ခံခြင်းကြောင့် မညှိုးပန်းဟု အမည်တွင်သည်။



ဆလတ်ပန်းပင်



ဆူးရှိဆိုးသစ်ဆယ်ပင်



'နွားမျက်စိဒေဝီ'ပင်



'ကွန်းပလာဝါး'ပင်



မော်လမြိုင်ပန်းပင်

ဓမ္မရွက်ထီးမျိုးရင်းများ

လူတို့သည် အပင်များကို အစာအတွက် စတင်စိုက်ပျိုးချိန်မှစ၍ မြက်မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည့် စပါး၊ ဂျုံနှင့် ပြောင်းကဲ့သို့သော ဓမ္မရွက်ထီးပင်များကို စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မရွက်ထီးပင်များသည် ဓမ္မရွက်စုံပင်များထက် ဖွဲ့စည်းပုံ ပို၍ရှင်းလင်းသည်။

ရှင်မွေးလွန်းမျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်း၌ ရှည်လျားသောပင်စည်များရှိသည်။ သမပိုင်းဒေသရှိ ရွှံ့ညွန့်၊ အိုင်များနှင့် ကန်များအတွင်း၌ ပေါက်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၅ မျိုးခန့်၏ ပင်စည်နှင့် အရွက်များကို မြက်ဖျာများရက်လုပ်ရန်နှင့် အသီးခြောက်များကို ခေါင်းအုံးသွတ်ရန်သုံး၏။ တောင့်တင်းရှည်လျားသော အရွက်နှင့်လိင်တမျိုးတည်းပါသော အပွင့်ရှိသည်။



ရှင်မွေးလွန်းအပင်ကြီးမျိုးသည် သမပိုင်းဒေသရှိ ရွှံ့ညွန့်နှင့်ကန်များထဲ၌ပေါက်၏။



အုတ်ခါးပင်သည် အရွယ်လတ်ပင် ဖြစ်ပြီး နွေတွင် ပွင့်၏။ ကစီပါသော ကွမ်အတက်ကို စားသုံးနိုင်သည်။



'ရေအိုင်ပေါင်း' ပင်၌ 'ရိုင်ဇမ်း' ရှိပြီး ရွှံ့ညွန့်ထဲတွင် ပေါက်သည်။ ဆင်တိမိတက ၆၀ အထိ မြင့်သည်။

ဆပ်သွားဖူးမျိုးရင်း


မျိုးစိတ် ၃၀၀ ခန့်ရှိပြီး သစ်မာပင်၊ ချုံပင်နှင့် နွယ်ပင်အထိ ရှိနိုင်သည်။ အာရှ၊ အာဖရိကမှ ပစိဖိတ်ဒေသများအထိ ပျံ့နှံ့သည်။ ဆူးပါသော အရွက်များသည် ပင်စည်ကို ခရုပတ်စီ၍ ထွက်၏။ အရွက်များကို ဖျာများ၊ တောင်းများရက်လုပ်၏။ အချို့အသီးများသည် အရည်ရွှမ်းပြီး အချို့မှာ မာကျော၏။ အသီးများကို စားသုံးနိုင်သည်။ ဆပ်သွားဖူး မျိုးစိတ်တခု၏ အရွက်ကို အစားအစာနှင့် ပျော်ရည်များတွင် အမွှေးအကြိုင် အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ မျိုးစိတ် အချို့တွင် ပင်စည်ရှိ မြေပေါ်သို့ ပေါ်နေသော အမြစ်များသည် အပင်ကို ထောက်ပေးထားသည်။ လိင်တမျိုးတည်းပါသော အပွင့်ငယ်များအဆုပ်လိုက် ပွင့်သည်။



ဆပ်သွားဖူးပင်၏ ပင်လုံးထောက်မြစ် (ဝဲ) ၊ ဆပ်သွားဖူးပင်ကြီး (အထက်) တွင် ဆူးရှိသည့် အရွက်ရှည်နှင့် မာကျောသော အသီးများရှိသည်။ အိန္ဒိယနှင့် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေတွင် တွေ့ရသည်။

ငါးရှဉ့်မြက်မုါးရင်း

ဤမုါးရင်းဝင် အပင်များသည် ထူးခြားစွာပေါက်သည်။ မုါးစိတ်တခုသည် ရေပေါ်တွင် ပေါလောမျောနေပြီး ကြာပွင့်ငယ်နှင့်တူသည်။ အချို့၌ရှည်လျားသောပင်စည်နှင့် အမြစ်အနည်းငယ်ရှိ၏။ အချို့၌အမြစ်များစွာရှိပြီး အရွက်ဖားများ ငိုက်ကျနေသည်။ မုါးစိတ်အလိုက်ရွက်ပြားမုါးရှိသကဲ့သို့ သေးသွယ်ပြီး အရောင်ကြည်လင်သော အရွက်မုါးလည်းရှိသည်။ အများစုသည် အပူပိုင်းဒေသရှိ ပင်လယ်ရေတိမ်ပိုင်း၌ ပေါက်သည်။ ရေချိုတွင် ပေါက်သော အပင်၏ အပွင့်များ၌ လိင်တမုါးတည်းသာပါသည်။ အမပွင့်များသည် ရေပေါ်တွင်ပေါ်နေပြီး အဖိုပွင့်များသည် ရေအောက်တွင်မြုပ်နေ၏။ မုါးပွားချိန်၌အဖိုပွင့်သည် ရေပေါ်သို့ပေါ်လာပြီး အမပွင့်နှင့် ယှဉ်တွဲလျက်မျောယင်းဝတ်မှုန်ကူး၏။



အလှမွေးငါးကန်တွင် စိုက်သော ‘ဟိုက်ဒရီလာ ဗာတီစီလာတာ’ကို အရှေ့အာရှရှိလယ်ကွင်းနှင့်ကန်များ၌တွေ့နိုင်သည်။


ငါးရှဉ့်မြက်ကိုအလှမွေးငါးကန်တွင် လှပစေရန် စိုက်၏။

သုံးထောင့်မြက်မုါးရင်း

မုါးစိတ် ၃၂၀၀ ရှိပြီး မြက်နှင့် သဏ္ဌာန်တူသည်။ နှစ်ရှည်ခံပင်များဖြစ်ပြီး ရွှံ့ညွန့်ထဲတွင် ပေါက်သည်။ အခေါင်းပိတ်၊ သုံးထောင့်ပင်စည်နှင့် ရှည်လျားသေးသွယ်သည့်အရွက်ရှိပြီး လိင်တမုါးတည်း သို့မဟုတ် ဒွိလိင်အပွင့်များသည် အစုလိုက် ပွင့်သည်။ ပင်စည်နှင့်အရွက်တို့၌ ‘ဆီလီကာ’ ဓာတုပုံဆောင်ခဲများ ပါဝင်သောကြောင့် ထိမိလျှင် ရှုစေတတ်၏။



‘ဆိပ်ပရတ် မိုက်ကရွိုရီယာ’ ၌ ဝက်မွင်ဘီးနှင့်တူသည့် ပွင့်ညာမဲ့ ရေစိမ့်ပန်းခိုင်ရှိ၏။ ပင်စည်နှင့်အရွက်တွင် ဆီလီကာပါသဖြင့် တိရစ္ဆာန်များ မစားနိုင်ချေ။



အာရှ ‘ဟိုက်ဒရိုကဲရစ်’ ပင်တွင် ပေါလောမျောသည့် အရွက်များရှိပြီး အဖိုပင်နှင့် အမပင် သီးခြားရှိသည်။



အာဖရိက သုံးထောင့်မြက်ပင်စည်၏အူတိုင်ကို ရှေးခေတ် အီဂျစ်လူမျိုးများက စာရေးစက္ကူများ ပြုလုပ်၏။

မြက်မျိုးရင်း

အနောက်တိုင်းအတွက် အာဟာရကိုပေးခဲ့သော ဂျုံ၊ ရာစုနှစ်များစွာကပင် တရုတ်လူမျိုးများ စိုက်ခဲ့သော စပါး၊ အမေရိကန် အင်ဒီးယန်းလူမျိုး အစဉ် အဆက်အာဟာရဖြစ်သော ပြောင်း၊ ကမ္ဘာဟောင်းရှိလယ်သမားနှင့် စစ်သား တို့၏ အာဟာရဖြစ်ခဲ့သော မုယောစပါးသည် မြက်မျိုးရင်းဝင်အပင်များ ဖြစ်သည်။

အစိမ်းရောင် အရွက်ငယ်များရှိသည့် မြက်ပင်များသည် မြက်ခင်းများ အဖြစ်သာမက လှပသောဥယျာဉ်များ၊ ဝါးတောများအပြင် ကမ္ဘာအနှံ့ ပေါက်လျက်ရှိသည်။

မြက်မျိုးရင်းဝင်ကြံမှ ကမ္ဘာသုံးသကြား ၆ ဝ ရာခိုင်နှုန်းကိုရသည်။ ဝါးမှ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း၊ စက္ကူနှင့် အစားအစာ ရသည်။ မြက်ပင်များသည် မြေကြီးကို ရေတိုက်စားခြင်းမှ ကာကွယ်သည်။

မြက်ပင်၏ပင်စည်သည် အခေါင်းပွဲ ဆလင်ဒါပုံဖြစ်သည်။ အဆစ်နေရာတို့၌ အခေါင်းပိတ်ဖြစ်သည်။ အရွက်များသည် ရွက်လွှဲအနေအထားရှိပြီး အရွက်ရင်း သည် ပင်စည်ကိုဖုံးအုပ်လျက်ရှိသည်။ အစုလိုက်ပွင့်ပြီး လေဖြင့်ဝတ်မှုန်ကူးသည်။ ပြောင်းပင်၏ ပြောင်းပွားမှုများသည် ဝတ်ဆံမတိုင်များဖြစ်ပြီး လေဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးရန် အပြင်သို့ထိုးထွက်နေသည်။



အုတ် ဂျုံ အ ရိုင်း သည် ဥရောပတဝန်း လုံးတွင် ပျံ့နှံ့စွာ ပေါက်သည်။ စိုက်ပျိုး ပင် အုတ်ဂျုံမျိုးယဉ်ကို လူနှင့် တိရစ္ဆာန် တို့ စားသုံးနိုင်သည်။



အိန္ဒိယကျိတ်ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်သည်။ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့အာရှတို့တွင် ပထမဆုံး စိုက်ပျိုးသောအပင် ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။



ရိုင်းစပါးသည် အရှေ့မြောက်ဥရောပနှင့်အနောက် အာရှဒေသအတွက် အဓိကသီးနှံ ဖြစ်သည်။ ရိုင်း ပေါင်မုန့်နှင့် ရိုင်းဝီစကီ ပြုလုပ်သည်။

အရွယ်လတ် တနှစ်ခံပင် ‘လှုပ်ယမ်းမြက်’ ၏ ဒေသရင်းမှာ မြေထဲပင်လယ် ဖြစ်သည်။


မုယောစပါးပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အနောက်အာရှ ဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းတွင် ၎င်းကို စားသုံး ရန်နှင့် ဘိယာချက်ရန် ပထမဆုံး စိုက်ပျိုးသည့် ကောက်မျိုးဖြစ်ဟန် ရှိသည်။



ကြံပင်သည် အပူပိုင်းနိုင်ငံများတွင် စီးပွားဖြစ် စိုက် သော အပင်ဖြစ်သည်။



နှံစားပြောင်းပင်သည် တနှစ်ခံပင်ဖြစ်ပြီး အာဟာရ ဓာတ် ကြွယ်သည်။




ဝါးမှ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ရသည်။ ၎င်းသည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် လူကြိုက်များသည်။



ရှေးဦးလူတို့သည် ဂျုံကို ရေနှင့်ရော၍ အစေးပေါက်အောင် နယ်ပြီးနောက် ပူသောကျောက်ပြားပေါ်တွင်ဖုတ်၍ ပေါင်မုန့်ဖြစ်လာဟန်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သော ရာစုနှစ်အနည်းငယ်က အနောက်နိုင်ငံများတွင် မုယောစပါးအစား ဂျုံကို အဓိကအစားအဖြစ် စားသုံး၏။ ဂျုံသည် ဆန်ထက် ပရိုတင်းပိုများသည်။

အရေးကြီးသောကောက်နှံများ

ပြောင်းပူးသည် သမန္တပိုင်းမှ အပူပိုင်းဒေသအထိ အရေးပါသော သီးနှံဖြစ်သည်။ ကိုလန်ဘတ်မှတ်တမ်းပြုခဲ့သည့် အချိန်အထိ ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှလွဲ၍ ကျန်ဒေသရှိလူများ မကြားဖူးကြပေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ပြောင်းပူးပင်ကို အကြီးအကျယ်စိုက်ပျိုး၏။ ပြောင်းပူးသည် ဂျုံကဲ့သို့ အာဟာရ မဖြစ်သော်လည်း အမေရိကတွင် နှစ်ပေါင်း ၆၀၀ ကျော်ခန့်က စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့၏။ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့တောင်အာရှရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော လူတို့သည် စပါးကို မှီခိုအားထားရသည်။



လယ်သမားများသည် စပါးကိုလယ်ကွင်းများတွင် မိုးရေ သို့မဟုတ် မြစ်၊ ချောင်းများမှ သွယ်ယူသည့်ရေဖြင့် စိုက်ပျိုးသည်။



ပြောင်းပူး၏အပိုပွင့်များသည် ပန်းဖွားနှင့်တူသည့်ပွင့်ညာမဲ့ ရေစိုပိုပန်းခိုင်၏ ထိပ်များ၌ ရှိပြီး အပွင့်များသည် အောက်ဘက်၌ရှိ၏။




အစေ့များကို ရှေးဦးစွာ ပျိုးထောင်ရသည်။ (အထက်ပုံ)၊ အစေ့မှ အပင်ပေါက်များ အသင့် ဖြစ်လာသည်။ (အထက်ယာ)၊ ၎င်းတို့ကို လယ်ကွင်း၌ ပြောင်းရွှေ့စိုက်သည်။ (အောက်ပုံ)၊ စပါးမှည့်ချိန်၌ ရိတ်သိမ်း၍ ကြိတ်ခွဲပြီး ရောင်းချသည်။ (အောက်ယာ)

အုန်းမျိုးရင်း

မျိုးစိတ် ၄၀၀၀ ရှိ၏။ အုန်းပင်၏ပင်စည်မှသစ်ရ၏။ အုန်းဆံကို ကြိုး၊ တံမြက် စည်းနှင့် ယှာများပြုလုပ်နိုင်၏။ အုန်းဆံကို အုန်းသီးဆန်မှရ၏။ အုန်းသီးဆန်ကို အစားအစာအမျိုးမျိုး ပြုလုပ်ရာတွင် သုံး၏။ သကြားနှင့် ကစော်ရည်ကို အုန်းရည်မှရ၏။ ဝမ်းရောဂါဖြစ်သူ၏သွေးကြောထဲသို့ အုန်းနုရည်ကို သွင်းပေးခြင်းဖြင့် အသက်ကယ်နိုင်၏။

ကြိမ်မြင့် အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ ပြုလုပ်နိုင်၏။ ဆပ်ပြာနှင့်ဟင်းချက် ထောပတ်ကိုအုန်းဆီမှချက်ယူနိုင်၏။ ဓနိရွက်များကို အမိုးအကာ၊ ထီးခြင်းနှင့် ဦးထုပ်များ ရက်လုပ်နိုင်၏။ ဓနိရည်မှ သကြား၊ အယ်လကိုဟောနှင့် ရှလကာ ရည်ရ၏။ အသီးကို စားသုံးနိုင်၏။ စွန်ပလွံပင်သည်လည်း ဤမျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။

အပင်များသည် သစ်မာချုံပင်၊ သစ်မာပင်နှင့် နွယ်ပင်များဖြစ်၏။ အရွက် များကြီးမားပြီး ငှက်မွေးပုံ သို့မဟုတ် ယပ်တောင်ပုံဖြစ်၏။ အပူပိုင်းနှင့်အပူ လျော့ပိုင်းဒေသ (အထူးသဖြင့် အရှေ့တောင် အာရှ) တွင် ပေါက် ၏။ သေးငယ်သော အပွင့်များ အစုလိုက်ပွင့်ပြီး လိင်တမျိုးတည်း သို့မဟုတ် ဒွိလိင်ရှိ၏။ အသီးသည် အတွင်းခွံမာသီးဖြစ်၏။ ပုံသဏ္ဌာန် အရွယ်အစား အမျိုးမျိုးရှိ၏။



လက်ဝဲဘက်ရှိ ထန်းပင်၏ ဒေသရင်းမှာ အာဖရိကအနောက်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ အိန္ဒိယနှင့် သီရိလင်္ကာတွင် စိုက်သည်။ အပင်နိမ့်များသည် စွန်ပလွံမျိုးနွယ် ဖြစ်၏။ လက်ယာဘက်ရှိ 'ဖော်ကျွန်း' ထန်းသည် ပူနွေးသောဒေသနှင့် သမပိုင်းဒေသများရှိ ရွာပါးသော ထန်းမျိုးဖြစ်သည်။

ပိန်းမျိုးရင်း

ပိန်းမျိုးရင်းဝင် အပင်များသည် နှစ်ရှည်ခံ သစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသတို့တွင် ပေါက်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ရှိသည်။ ပိန်းဥတွင် ကစီပါရှိပြီး ပစိဖိတ်ဒေသ၏အရေးပါသော အစာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ပိန်းဥဖြင့် ချက်သော 'ပျိုင်' ဟင်းလျာသည် ဟာဝိုင်းယီဒေသတွင် နာမည်ကြီးသည်။ ပိန်းမျိုးတွင် 'ရိုင်ဇုမ်း'၊ 'ကွမ်' အတက် သို့မဟုတ် 'ကျူဗာ' စသည်ဖြင့် အစာ သို့လျှောင့်ထားသော မြေအောက်ပင်စည် အမျိုးမျိုးပါရှိ၏။ အချို့မှာ သစ်ကပ် ပင် ဖြစ်သည်။

တင်းပုတ်ပုံ 'စပေးဒစ်' ပန်းခိုင်ရှိပြီး အပွင့်ငယ်များ စုလျက်ရှိသည်။ အရောင်ရှိသောပန်းခိုင်ဖုံးသည် ပြန့်ကားသဖြင့် ပန်းခိုင်ငယ်စဉ်၌ ဖုံးအုပ်လျက် ရှိသည်။ အသီးမှာ 'ဗယ်ရီ' ဖြစ်သည်။




ကြိမ်သည် အမြဲစိမ်းချုံပင် ဖြစ်သည်။ ပင်စည်ကို လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် သုံး၏။

အုန်းပင်များသည် ပင်လယ်ကမ်းစပ်တွင် ပေါက်၏။ အုန်းသီးသည် ရေပေါ်တွင် ပေါလောမျောနိုင်၏။




မင်းပေါပင်ကို အိန္ဒိယမှ ဩစတြေးလျအထိ တွေ့နိုင် ၏။ ငိုက်ကျနေသောအရွက်နှင့် အပွင့်များရှိ၏။



အနောက်အာဖရိကရှိ ဆီထွက်အုန်း၏ အသီးဆန်မှ ဆီရ၏။



အရှေ့တောင်အာရှရှိ မိတာ ၃၀ အထိမြင့်နိုင်သော ကြိမ်ပင်၏ ပင်စည်ကို ခြင်းရက်လုပ်၏။



‘တရားဟော စင်မြင့်ပေါ်ရှိ ဂျက်’ခေါ် ‘အေရီစီမာ’ ပင်ကို အာရှသမပိုင်းဒေသရှိ သစ်တောများတွင် တွေ့နိုင်၏။

၁၂၅ ဆင်တိမိတာအထိမြင့်သော ဆူမတ္တရာ ပိန်းပန်းခိုင်သည် နှစ်နှစ်အရွယ် ကလေးထက်ပင် မြင့်သည်ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထား၏။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော ပန်းခိုင် ဖြစ်သည်။ အပွင့်မဟုတ်ချေ။



ဆိုးရွားသော အနံ့ကြောင့် ‘အနံ့ဆိုး’ ဟု ကောင်ဂေါ်ဖီထုပ်’ခေါ် ပိန်း မျိုးဖြစ်သည်။ မြောက်အမေရိကနှင့် အရှေ့မြောက်အာရှတွင် တွေ့ရသည်။



နှစ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်သော ‘အင်သူရီယမ်’ ပိန်းပန်းပင်၏ ဒေသရင်းမှာ တောင်အမေရိက ဖြစ်သည်။ မုန်အိမ် (green house) နှင့် အပူပိုင်းဒေသရှိ ဥယျာဉ်များတွင် စိုက်လေ့ရှိသည်။



‘လိုင်စီချီတွန် ကင်ချာတင်’သည် အရှေ့မြောက် အာရှဒေသတွင်ရှိပြီး တောက်ပသော အပွင့်များ ရှိသည်။



မြောက်သမပိုင်းရှိ ရွှံ့ညွန့်တွင်ပေါက်သည့် လင်းနေးပင်မှ ဆေးဖော်ရန်နှင့် ရေမွှေးပြုလုပ်ရန် အဆီထုတ်ယူနိုင်၏။



အပူပိုင်းအမေရိကရှိ ‘ဖီလိုဒင်ဒရပ်’ပင်သည် အလှစိုက်ပင် ဖြစ်သည်။



‘ကလေးဒီယမ် မိုင်ကာလာ’သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် အလေ့ကျပေါက်၏။

နာနတ်မျိုးရင်း

နာနတ်မျိုးပင်များသည် အရာဦးတွင် အလွေကျပေါက်၏။ ယခုအခါ အပူပိုင်း ရာသီဥတုရှိသည့် ဒေသများတွင် စိုက်၏။ အကောင်းဆုံးနှင့် အကျော်ကြားဆုံး နာနတ်သည် ဟာဝိုင်ယီကျွန်းနှင့်အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုမှ ထွက်၏။ ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုးများသည် အရသာရှိသည့် နာနတ်မျိုးများ၏အရွက်မှ လျော်မှုရများကို ပါးလွှာပြီး လှပသည့် ‘ဗာရွန်’ အထည်စများ ရက်လုပ်သည်။ နာနတ်မျိုးစိတ် ၂၀၀၀ တို့သည် သစ်ကပ်ပင်များ ဖြစ်၏။ ဒွိုင်လိင်ရှိသောအပွင့်များသည် ပင်စည် အဖျားတွင် အစုလိုက်ရှိ၏။ အပင်အဖျားစုသည် ခွက်နှင့်တူသည့် ပင်စည်ဗဟို ပိုင်းတွင် ရေကို သိုလှောင် သည်။ ၎င်းအပိုင်းတွင်ထူထဲသော အရွက် များ ထပ်လျက် ရှိ၏။



လက်ဝဲဘက်တွင် နာနတ်ပင် ဖြစ်ပြီးလက်ယာဘက်၌သေးငယ်သော အပြာရောင်အပွင့်များရှိသည့် နာနတ်ပန်းခိုင် ဖြစ်သည်။



နာနတ်မျိုး စပိန်ရေညှိတွင် သေးသွယ်၍ တွဲလဲကျနေသော ပင်စည်ရှိ၏။

ဗေဒါမျိုးရင်း

မျိုးရင်းဝင် မျိုးစိတ် ၂၈ မျိုးတို့၏ ရွက်ညှာသည် ဖောင်းပွပြီး လေခိုနေသောကြောင့် ရေပေါ်တွင် ပေါလောမျော၏။ ဗေဒါသည် တောင်အမေရိကမှတစ်ဆင့် အပူပိုင်းဒေသများသို့ ပျံ့နှံ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ရေကြောင်းကို ပိတ်ဆို့ကာ ဒုက္ခပေးတတ်သည်။ တရုတ်ပြည်တွင်မူ ဝက်စာအဖြစ် သုံးသည်။

မြစ်ချိုမျိုးရင်း

မျိုးရင်းဝင်အပင်များသည် နှစ်ရှည်ခံပင်များ ဖြစ်သည်။ အရွက်များ ရွက်လှဲအနေအထားရှိပြီး ခရမ်း၊ အပြာနှင့် ပန်းရောင် ဒွိုင်လိင်အပွင့်များ ရှိသည်။ မျိုးစိတ် ၆၀၀ အနက် အများစုသည် အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသများတွင် ပေါက်သည်။



ဗေဒါပင်၏ ရွက်ညှာသည်ဖောင်းပွသဖြင့် ပေါလောမျောနိုင်သည်။ အပွင့်များ အဆုပ်လိုက် ပွင့်သည်။ ပွင့်ဖတ်နှင့်ပွင့်ချပ် ပုံသဏ္ဌာန်တူ၏။



မြစ်ချိုပင် (ဝဲ) ၏ဒေသရင်းမှာ မြောက်အမေရိကဖြစ်သည်။ မီးကွင်းဂမုန်းပင် (ယာ) ၏ ဒေသရင်းမှာ မက္ကဆီကိုနှင့် အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစု ဖြစ်သည်။



အပွင့်



အသီး

သစ်ကျူပင် (အထက်) သည် မြစ်ကမ်းတလျှောက်တွင် ပေါက်သော အပင်ငယ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး 'ဂျန်ကတ် ဒီစီ ပီယင်' (ယာ) သည် အာရှသမပိုင်းတွင်ပေါက်သော အရွယ်လတ်ပင် ဖြစ်သည်။

ကျူမျိုးရင်း

နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင်ဖြစ်ပြီး ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် အသုံးဝင်ပုံတို့သည် မြက်မျိုးရင်း နှင့် တူ၏။ လျှပ်စစ်မီးလုံးများမပေါ်မီက ကျူပင်စည်၏အူတိုင်ကို မီးစာအဖြစ် အသုံးပြု၏။ အရွက်နှင့်တူသောအရာသည် အမှန်မှာ ဆလင်ဒါပုံပင်စည် ဖြစ်သည်။ ပင်စည်ကို ဖျာများ ရက်လုပ်၏။ ၎င်းတို့၏ ဒေသရင်းမှာ ကမ္ဘာ့ မြောက်ဘက်ခြမ်း ဖြစ်၏။

ဒက်ဖိုဒယ်မျိုးရင်း

'ဒက်ဖိုဒယ်' မျိုးရင်းဝင် အပင်များသည် သစ်တောနှင့် ဥယျာဉ်များအတွင်းတွင် နွေဦးကာလ၌ အပြင်လိုက်ပွင့်သည်။ 'ဗပ်' အတက်ပါသော သစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်ပြီး ဒွီလိင်အပွင့်များရှိ၏။ အသီးများရင့်မှည့်လျှင် သုံးစိတ်ကွဲသွားပြီး အစေ့ ထွက်ကျ၏။ သေးသွယ်သည့် အရွက်ရှည်များသည် ဗပ်အတက်မှ ထွက်၏။ အမေရိကန်ရှိသဲကန္တာရတွင်ပေါက်သော နာနတ်ကြီးမျိုး၏ မျိုးစိတ်တစ်ခုမှ လျှော်မျှင်များကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်ယူနိုင်သည်။



၁၀-၁၅ နှစ်တွင်မှ တကြိမ်သာပွင့်သော နာနတ်ကြီး မျိုး၏ပွင့်ကိုင်သည် ၁၀ မီတာအထိ မြင့်နိုင်သည်။



အပွင့်

'မြေထဲပင်လယ် နာစစ်ဆတ်' ပင် သည် သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်ပြီး နွေဦးတွင် ပွင့်သည်။



'လေညင်းနှင်းပန်း' ၏ဒေသရင်းမှာ ချီလီ နှင့် အာဂျင်တီးနား ဖြစ်သည်။




'နာစစ်ဆတ်' မျိုးပြားလေးမျိုး၏ အပွင့် များ ဖြစ်သည်။



'လစ်ကိုရစ် ရေဒီယာတာ'



ကိုယ်ရံကြီးပင်နှင့် အပွင့်



အရွယ်လတ်ပင်ဖြစ်သော 'နေနှင်းပန်း' ပင်သည် နှစ်ရှည်ခံပင် ဖြစ်၏။ အရွှေအာရှသမပိုင်းဒေသများတွင် ဇူလိုင်လပတ်ဝန်းကျင် ခွဲ ပွင့်သည်။


ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့က နှင်းပန်းကိုမြင်လျှင် ၎င်းနှင့်နှိုင်းနှိုင်းသော အစိတတ ပွဲတော်ကို သတိရကြသည်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ထန်းကြက်သွန်နှင့် ကညွတ်တို့သည် အစားအစာနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များရရှိသော မျိုး ရင်းဝင် အပင်များဖြစ်သည်။ မျိုးရင်းဝင် 'ကျူးလစ်' ပန်း၊ 'ဟိုင်ယာဆင့်' ပန်းနှင့် 'အော်တမ်ကရိုကတ်' ပန်းများသည် သမပိုင်းဒေသဥယျာဉ်များအတွင်း ရောင်စုံပွင့်သည်။ အော်တမ်ကရိုကတ်ပင်မှ အဆစ်ရောင်ရောဂါကုသည့်ဆေး ထုတ်ယူနိုင်သည်။

မျိုးရင်းဝင်အပင် ၄၀၀၀ ခန့်ကို တဆင့်ခံမျိုးရင်းများအဖြစ် ခွဲထားသည်။ အရေးပါသော အပင်များမှာ ကျူးလစ်၊ အော်တမ်ကရိုကတ်၊ နေနှင်းပန်း၊ 'အက်စဖီဒယ်'၊ ကြက်သွန်၊ ဝိန္ဒဘော၊ 'ယတ်ကာ'၊ နှင်းပန်း၊ ကညွတ်တို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သမပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းဒေသတို့တွင် ပိုမိုဖြစ်ထွန်းသည်။


အပင်အများစုသည် နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင်များ ဖြစ်သည်။ တနှစ်ပတ်လုံး ရှင်သန်သည့် 'ဗမ်' အတက် သို့မဟုတ် မြေအောက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများမှ အပင် သစ်များပေါက်နိုင်သည်။ အများအားဖြင့် ဒွီလိုင်အပွင့်ရှိသည်။ အသီးမှာ 'ကက်ပဆူး' သို့မဟုတ် အရည်ရွှမ်းသော 'ဗယ်ရီ' ဖြစ်သည်။



မြေထဲပင်လယ်ဒေသမှ လာသည့် ဥယျာဉ်စိုက် 'ဟိုင်ယာဆင့်' ပင်



ဥရောပတွင်လည်း စိုက်သော အနောက်အာရှ ကျူးလစ်တစ်မျိုး




တူရကီမှဥရောပသို့ပျံ့နှံ့လာသည့် 'ဒါဝင် ကျူးလစ်ပင်'




'အေမာနာ အိုဒူလစ်' သည် ဂျပန် နိုင်ငံရှိ ကွင်းပြင်များတွင် အလေ့ ကျ ပေါက်သည်။ နွေဦးရာသီတွင် ပွင့်သည်။



ခွေးသွား ဗိုင်အိုလက် ပင်သည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တောင်စောင်းများ ပေါ်တွင် အလေ့ကျပေါက်သည်။



နွေဦးရာသီတွင် ပွင့်သော 'အီစ တာ နှင်းပန်း' ပင်သည် မြောက် သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။



အဆုပ်လိုက်ပွင့်သော 'ဥရောပစပျစ် ဟိုင်ယာဆင့်' ပင်




ငိုက်ညွတ်နေသော 'အနက်ရောင် ဖရစ်တီလေရီ' ပွင့်




မြောက်သမပိုင်းဒေသရှိ 'ကုန်းမြင့် နှင်းပန်း' ပင်

အရွက်အခြေတွင် ပင်ပေါက်ဖူးငယ်များ ရှိသည့် ဥယျာဉ်စိုက် 'အရွှေအာရှ ကျားနှင်းပန်း' ပင်



ကြက်သွန်နီကို ကမ္ဘာတဝန်းလုံးတွင် အစာအတွက်ခိုက်၏။ အပွင့်များသည် ပွင့်ကိုင်းရှည်၏ ထိပ်များ၌ပွင့်သည်။ အရွက်သည်ပြွန်ငယ်နှင့်တူသည်။ ကြက်သွန်နီဥ၏အတွင်းပိုင်းကိုပြထားသည်။ (ယာ)



‘မြောက်အမေရိက ယတ်ကာ’ ပင်၏ ရှည်သော ပန်းခိုင်ကို ‘ယတ်ကာ’ ပိုးဖလံက ဝတ်မှုန်ကူးပေးသည်။

‘တောင်ကြား နှင်းပန်း’ ပင်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သမပိုင်း၌ သစ်တောများတွင် အလေ့ကျ ပေါက်သည်။



အာဖရိက သဲကန္တာရပေါက် ရွာစောင်းလက်ပပ်ပင်သည် အရည်ရွှမ်းပြီး ပွင့်ညာမဲ့ရေစိုမိုးခိုင်းရှည်များ ရှိသည်။



‘ဆော်လမွန်၏ တံဆိပ်တုံး’ ပင်ကို အာရှနှင့် ဥရောပတွင် တွေ့ရသည်။



ကြက်သွန်နီအပွင့်ပုံ ဖြစ်၏။ ၎င်း၏ဒေသရင်းမှာ အနောက်အာရှ ဖြစ်သည်။



အရှေ့အာရှရှိ ‘ငှက်ပျောနှင်းပန်း’ ပင်



အာရှရှိ ‘နေနှင်းပန်း’ မျိုးစိတ်တစ်မျိုး



ဥရောပရှိ ‘အော်တမ် ကရိုကတ်’ ပင်



ဂျပန် ‘မားပြိုင်နှင်းပန်း’ ပင်

အနက်ရောင်နှင်းပန်းမျိုးရင်း

‘အနက်ရောင်နှင်းပန်း’မျိုးရင်းတွင် မျိုးရင်းဝင် အပင်အရေအတွက် နည်းသည်။ အပူပိုင်းဒေသတို့တွင် ပေါက်သောမျိုးစိတ်တခုတွင် ကစီကြွယ်ဝသည့် ဖောင်းပွသော မြေအောက်အင်္ဂါ ရှိသည်။ တဟိတိလူမျိုးများသည် မျိုးစိတ် တခု၏ ကစီပါဝင်သည့် ခါးသော ‘ကျူဗာ’ကို စားသည်။

မျိုးစိတ် ၃၀ တို့သည် နှစ်ရှည်ခံပင်များဖြစ်ပြီး ပင်စည်တိုများရှိ၏။ ဒွိလိင် ရှိသော အပွင့်များသည် အရွက်မရှိသော ကိုင်းရှည်များ၏ ထိပ်တွင် ပွင့်ခွံရွက် များ ဝန်းရံလျက်ရှိသည်။ အသီးသည် ‘ဗယ်ရီ’သီးဖြစ်၏။

မျောက်ဥမျိုးရင်း

မျောက်ဥပင်တွင် ကစီကြွယ်ဝသောကျူဗာများရှိသည်။ ကြာရှည်စွာသိုလှောင် ထားနိုင်သဖြင့် ရှေးခေတ်က သင်္ဘောသားများနှင့် တံငါသည်များအတွက် ပင်လယ်ခရီးတွင် အဖိုးတန်အစာဖြစ်၏။ ပစိဖိတ်ဒေသတွင် မျောက်ဥသည် အရေးပါသော အစာဖြစ်သည်။

မျိုးစိတ် ၆၅၀ ရှိ၏။ နှစ်ရှည်ခံနှယ်ပင်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ဒေသရင်းမှာ ပူနွေးသောဒေသများ ဖြစ်သည်။ မျောက်ဥပင်၏အသီးသည် ‘ကက်ပဆူး’ ဖြစ် သည်။ သက်ရင့်ကျူဗာများသည် မိခင်အပင်မှ ကျိုးပွဲပြီးအပင်သစ်ပေါက်နိုင်၏။



မလေးရှားမှ ဇော်ဂျီမတ်ဆိတ်ပင်သည် အနက်ရောင်အပွင့် များ အစုလိုက်ပွင့်၏။ အဖူးကို ပွင့်ခွံရွက်များက ကာကွယ် ထား၏။

အိုင်းရစ်မျိုးရင်း

‘အိုင်းရစ်’သည် ဂရိဘာသာဖြင့် သက်တံဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အိုင်းရစ် မျိုး ရင်းဝင်အပွင့်များသည် လှပ၍ အရောင်စုံသောကြောင့် သက်တံဟူသော အမည်နှင့် လိုက်ဖက်သည်။

မျိုးစိတ် ၁၅၀၀ ခန့် ရှိ၍ နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင်များဖြစ်ပြီး ‘ဗယ်’အတက် သို့မဟုတ် ‘ရိုင်ဇမ်း’ များရှိသည်။ အပွင့်တပွင့်တွင် ပွင့်ပတ်၊ ပွင့်ချပ်၊ ဝတ်ဆံဖို သုံးခုစီနှင့် မအင်္ဂါအုံတွင် အစေ့အိမ်ခန်း သုံးခန်း ရှိသည်။



‘မျက်ဝန်းပြာ’မြွက်သည် မြောက်သမ ပိုင်းဒေသမှ ဖြစ်သည်။



ဥရောပရှိ ‘အလံဝါ’ပင်သည် စိမ့်တော များ၌ ပေါက်သည်။

မျောက်ဥပင်သည် နှယ်ပင်ဖြစ်ပြီး တရုတ်ပြည်နှင့် ဂျပန်ပြည်ရှိ တောင်များပေါ် တွင်တွေ့နိုင်၏။ ၎င်း၏ကျူဗာသည် ကစီကြွယ်ဝ၍ ယိုအမြစ်လည်း ပြုလုပ်နိုင်၏။



တောင်အာဖရိကရှိ ‘ဖရိုစီယာ ရီဖရက် တာ’၏ အပွင့်သည် မွှေး၏။



ကိုကုမံပင်၏ ဝတ်ဆံမထိပ်မှ အဝါရောင် အစာဆိုးဆေး ကိုကုမံကိုရ၏။



‘အလံပြာ’ပင် သည် အရှေ့အာရှမှ ဖြစ် သည်။



သစ္စာပန်းမျိုးကို ပန်းအလှပြင်ရာ၌ အသုံး များသည်။

ငှက်ပျောမျိုးရင်း

ငှက်ပျောပင်၏ပင်စည်ကို ရွက်ရင်းများဖြင့် ရစ်ပတ်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ အသီးတစ်ခိုင်သီးပြီးလျှင် အပင်သေလေ့ရှိသည်။

မျိုးစိတ် ၁၅၀ ရှိသည်။ ပင်စည်တွင် အူတိုင်ရှိပြီး အရွက်သည် ကြီးမားသော ရွက်ပြားဖြစ်သည်။ ငိုက်ကျနေသော ရိုးတံပေါ်တွင် အဆုပ်လိုက်ပန်းပွင့်သည်။ စိုက်ပျိုးယူသောမျိုးပြားများတွင် အသီးတင်ရန်အတွက် အပွင့်များ၌ ဝတ်မှုန်ကူးပြီး သန္ဓေအောင်ရန်မလိုသဖြင့် စားသုံးသော ငှက်ပျောသီးတွင် အစေ့များမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ငှက်ပျောအရိုင်းတို့၌ ကျောက်ခဲကဲ့သို့

မာကျောသော အစေ့မည်းများရှိတတ်သည်။ ရုက္ခဗေဒအရ အသီးသည် 'ဗယ်ရီ' သို့မဟုတ် 'ကက်ပဆူး' ဖြစ်သည်။

ငှက်ပျောပင်၏ဒေသရင်းမှာ အာရှ ဖြစ်သည်။ အသီးတွင် ကစီသကြားနှင့် ဗီတာမင်အတိုပါဝင်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် မူဆာ တက္ကတီလစ် ငှက်ပျော ၏ပင်စည်မှ လျှော်မျှင်များကို ထုတ်ယူသည်။ ၎င်းလျှော်မျှင်များမှ ကြိုးနှင့် စက္ကူထုတ်ယူနိုင်သည်။ လျှော်မျှင်ကို မနီလာမြို့မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းကြောင့် မနီလာလျှော်ဟုခေါ်သည်။



ငှက်ပျောပင်



အပူပိုင်းဥယျာဉ်စိုက် 'ကဏန်းလက်မ' ပင်



မနီလာလျှော်ရသည့် မူဆာ တက္ကတီလစ်

ဗုဒ္ဓသရဏမျိုးရင်း

ငှက်ပျောမျိုးနွယ်ဖြစ်သည့် ဗုဒ္ဓသရဏမျိုးစိတ်များတွင် စားသုံးနိုင်သော အသီးမရှိသဖြင့် စီးပွားရေးအရ အသုံးမဝင်ပေ။ မျိုးစိတ်တစ်ခု၌ အာဒါလွတ်ကဲ့သို့ပင် စားသုံးနိုင်သော ကစီပါဝင်သည့် ရိုင်ဇမ်းရှိသည်။ အပင်များတွင် လှပသော အပွင့်နှင့် အရွက်များရှိသည်။

မျိုးစိတ် ၄၀ ပါဝင်ပြီး နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျောပင်များ ဖြစ်သည်။ အရောင်တောက်သော အပွင့်များတွင် ပွင့်ချပ်ဟုထင်ရသည့် ဝတ်ဆံဖိုခြောက်ခု ရှိသည်။ ၎င်းခြောက်ခုအနက် တခုသာလျှင် မျိုးအောင်နိုင်သည်။

အာဒါလွတ်မျိုးရင်း

ဤမျိုးရင်းဝင်အပင်များ၏ အစင်းကြောင်းများပါသော အရွက်များသည် ဥယျာဉ်ကို အလှဆင်နိုင်သည်။ ရိုင်ဇမ်းမှ ရရှိသော ကစီမှုန့်ကို ဟင်းချက်ရာတွင် သုံးသည်။


နှစ်ရှည်ခံပင် မျိုးပေါင်း ၂၅၀ ရှိပြီးအများစုမှာ အမေရိကတွင်ပေါက်သည်။ ပွင့်ခံရွက်များဖြင့် ငုံ့လျက်ရှိသောအပွင့်ငယ်များ အစုလိုက်ရှိသည်။



အပူပိုင်းနှင့် အပူ လျော့ပိုင်း ဒေသရှိ ဗုဒ္ဓသရဏပင်



အမြစ်တွင် ကစီပါသည့် ဂျာဗား ဗုဒ္ဓသရဏပင်



'ကယ်လာသီယာ လီတဇီ' ကို အရွက်များလှပမှုကြောင့် ကမ္ဘာအနှံ့ စိုက်၏။ ဒေသရင်းမှာ အမေရိက ဖြစ်၏။

ချင်းမျိုးရင်း

ချင်းနှင့် နှင်းသည် ချင်းမျိုးရင်းဝင်အပင်၏ ရှိငုံဇုမ်းဖြစ်သည်။ ဖာလာသည် အခြားချင်းမျိုးရင်းဝင် အပင်တမျိုး၏ အစေ့ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် အရေးပါသော ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် များ ဖြစ်သည်။ ချင်းအဆီသည် အနံ့ရှိသည်။ ရေမွှေးပြုလုပ်ရာတွင် သုံးနိုင်သည်။ မျိုးရင်းဝင်အပင်များမှ ဆေးဝါးထုတ်ယူနိုင်သည်။

မျိုးစိတ် ၁၄၀၀ ပါဝင်ပြီး နှစ်ရှည်ခံသစ်ပျော့ပင်များဖြစ်၏။ အပူပိုင်းနှင့် အပူလျော့ပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သည်။ အရွက်များမှာ လေးမီတာခန့်အထိ ရှည်လျားနိုင်သည်။ အခိုင်လိုက် ပွင့်သော ဒွီလိုင်အပွင့်ရှိပြီး အရောင်တောက်ပသည့် ပွင့်ခံရွက်တို့ဖြင့် ငုံ့၍ နေသည်။ ချင်းမျိုးစိတ်အများစု၌ စူးရှသော အနံ့ရှိသည်။



ချင်းပင်ကို ရိုင်ဇုမ်းအတွက် စိုက်သည်။ ချင်းပင်၏ အဆီကို ဆေးဝါးနှင့် ရေမွှေးဖော်စပ်ရာတွင် သုံးသည်။



ဤလှပသော ပလတ်စတစ်ပန်း၏ ဒေသရင်းမှာ ဆူမတ္တရာ ဖြစ်၏။



ဟိမဝန္တာမှ နယူးဂီနီအထိတွေ့နိုင်သော ဆေးဖက်ဝင် ဖလံတောင်ဌေးပင်၏ ရိုင်ဇုမ်းကို စားသုံးနိုင်သည်။



ဗနီလာပင်ကို အမျိုးသမီးတဦးက ဝတ်မှုန်ကူးပေးနေသည်။ အသီးနှင့် အစေ့များကို အနံ့အရသာရှိစေရန် သုံးသည်။

သစ်ခွမျိုးရင်း

သစ်ခွတူဆိုလျှင် အပူပိုင်း မိုးသစ်တောအတွင်းရှိ အရောင်အသွေးစုံသည့် အပွင့်၊ ပန်းဆိုင်တွင် အလှပြထားတတ်သော ပန်းမျိုး၊ လက်ဆောင်ပန်းစည်းအဖြစ် သမပိုင်းဒေသရှိ လူများက မြင်တတ်ကြသည်။

သို့သော် သစ်ခွလောကမှာ ထိုထက်ပင်ကျယ်ဝန်းသည်။ ဗနီလာရေခဲမုန့်ကို စားလျှင် သစ်ခွမျိုးရင်းဝင်အပင်ကို ပြည့်စမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေခဲမုန့်တွင် အနံ့အရသာရှိစေရန်သုံးသည့် 'ဗနီလာ'ပင်မှာ သစ်ခွမျိုးဖြစ်သည်။ မျိုးစိတ် ၁၅၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ မျိုးစိတ်အများဆုံးပါဝင်သော မျိုးရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

သစ်ခွအများစုသည် အပူပိုင်းဒေသများတွင် သစ်ကပ်ပင်အဖြစ် ပေါက်လေ့ရှိ၏။ သစ်ခွပန်းခိုင်သည် ကြာရှည်ခံသဖြင့် ပန်းအလှပြင်ရာတွင် အများဆုံးအသုံးပြုသည်။ သမပိုင်းဒေသရှိသစ်ခွများသည် မြေပေါ်၌ပေါက်သည်။

သစ်ခွတွင်ထူထဲပြီး သားရေကဲ့သို့သော အရွက်များရှိသည်။ သစ်ခွ၏ အပွင့်များသည် အခြားသောမျိုးရင်းဝင်အပွင့်များနှင့် ကွဲပြား ခြားနားသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့တွင် တူညီသော အခြေခံလက္ခဏာရှိပြီး ပွင့်ချပ်သုံးခု၊ ပွင့်ပတ်သုံးခုပါစပ်ဖြစ်သည်။ နှုတ်ခမ်းဟုခေါ်သော ပွင့်ချပ်သည် အရွယ်ကြီးပြီး ပွင့်ချိန်တွင် အပွင့်၏ အောက်ဘက်ပိုင်း၌ တည်ရှိသဖြင့် ဝတ်မှုန်ကူးသောအခါ 'အင်းဆက်'ပိုး နားနေစရာအဖြစ် ဖန်တီးပေးသည်။

အရွယ်၊ ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရောင်၊ အနံ့နှင့် ပွင့်ချိန်တို့ပေါ်မူတည်၍ အပွင့်များသည် ဝတ်မှုန်ကူးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အင်းဆက်ပိုးကို ဆွဲဆောင်သည်။ မတူညီမျိုးစိတ်တို့ကို မျိုးစပ်ယူခြင်းဖြင့် လှပသော မျိုးစပ် သစ်ခွများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။



နွေတွင် ပွင့်သော ‘ဂျပန်မြေပေါက်’ သစ်ခွံ



တခါပွင့်လျှင် တပွင့်သာပွင့်သော ‘လေးဒီးလစ်ပါ’ သစ်ခွံ



မျိုးစိတ် ၁၀၀၀ ရှိသည့် ‘ဒင်ဒရိုဗီယမ်’ သစ်ခွံမှ မျိုးစပ်များစွာ ရရှိသည်။



လူကြိုက်များသည့် ‘ပါဖီယိုပယ်ဒီလမ်’ သစ်ခွံ



‘မင်ဒါ’ သစ်ခွံ၏ပန်းခိုင်သည် ဆင်တိမိတာ ၃၀ ရှည်ပြီး အပွင့် ခုနစ်ပွင့်ခန့် ရှိသည်။




အိန္ဒိယမှသည် ဂျပန်အထိပျံ့နှံ့သော ‘ဆင်ဗီဒီယမ်’ သစ်ခွံတွင် မျိုးစိတ် ၅၀ ရှိသည်။



‘ကက်တလီယာ’ သစ်ကပ်သစ်ခွံကို မကွာဆီ ကိုမှသည် ဘရာဇီးအထိ တွေ့နိုင်သည်။



သစ်ကပ်သစ်ခွံပင် ‘တေနီယိုပီလမ် အော်ဗကျူဆန်’ ၏ အမြစ်များသည် အပင်အတွက် အစာ ဖြစ်စဉ်း နိုင်သည်။ ဤအပင်တို့၏ အပွင့်များသည် တနေ့တည်း တပြိုင်တည်း ပွင့်လေ့ ရှိသည်။



မလေးရှားကျွန်းဆွယ်ရှိ ‘စီလိုဂျင်း’ သစ်ခွံ၏ အပွင့်ငယ်များသည် လှပသော်လည်း ညှိုးလွယ်သည်။

လူသားနှင့်အပင်လောကဆက်သွယ်မှုသည် ကမ္ဘာကြီးကို ဟန်ချက်ညီစေသည့် အကြောင်းတရပ်ဖြစ်သည်။ အပင်များမှ အစားအစာနှင့် အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းထုတ်ယူရာတွင် သက်ရှိများ၏ ဂေဟဗေဒစနစ် ပျက်မသွားစေရန် သတိ ပြုရမည်။ ပိုးသတ်ဆေးပက်ဖျန်းရာ၌ အဖိုးတန်အပင်များနှင့် လူ့အကျိုးပြု အင်းဆက် ပိုးမွှားပါ မသေစေရန် ဂရုပြုရမည်။ အပင်ကြီးများ ခုတ်လှဲပြီး နောက် အစားထိုးစိုက်ခြင်းဖြင့် မြေပြိုခြင်းအန္တရာယ်ကို တားဆီးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူနှင့်သဘာဝကို ဟန်ချက်ညီစေမှသာ လူတို့အတွက် အာဟာရ ကို အပင်မှ ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

လူနှင့်အပင်တို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် အံ့မခန်းအောင်မြင်မှုများရှိသကဲ့သို့ ကြီး စွာသော ဆုံးရှုံးမှုများလည်းရှိသည်။ အမေရိကန်အင်ဒီးယန်းများသည် ပြောင်း မျိုးစိတ်အရိုင်းများကို စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရာမှ ပြောင်းယဉ်မျိုးများ ရရှိခဲ့ပြီး အစဉ်အဆက် ပင်ခြားမျိုးစပ်ယူခြင်းဖြင့် အထွက်ကောင်းသည့် မျိုးပြားများကို ရရှိခဲ့သည်။ ခရမ်းချဉ်ပင်ကဲ့သို့ အပင်များကိုလည်း အပူဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အရသာထူးကဲစေရန် မျိုးစပ် ဖန်တီးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ အပင်ရောဂါ၏ အကြောင်းရင်း များနှင့် ကာကွယ် ကုသနည်းများကိုလည်း တွေ့ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။

အပင်များနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ဆောင် ချက်များသည် ကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေသကဲ့ သို့ ဆိုးကျိုးကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။ ရာသီ ဥတနှင့် မြေဩဇာတို့၏အကျိုးဆက်ကို နား မလည်ခဲ့သဖြင့် ပင်နာကျရာဂါနှင့်ငတ်မွတ် ခေါင်းပါးခြင်းဘေးတို့ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် 'ဒီ ဒီ တီ' ပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ငှက်မျိုးစိတ်များဥပဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပင်လယ်သတ္တဝါများနှင့် နွားနို့ အတွင်း၌ ၎င်းဆေးကို တွေ့ရှိရပြီးနောက် ဒီဒီတီသုံးခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။



အစိမ်းရောင် 'ဒေါက်ဂလတ်ဖား' ပင်များကို ကနေဒါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှိ ဆီးနှင်း ဖုံးနေသော တောင်မြင့်များ၏ရှေ့ဘက်တွင် တွေ့နိုင်သည်။ အသားမာပြီး အပျော့အပျော့ အရွက်များရှိသဖြင့် အေး၍ မြင့်သောဒေသတို့တွင် ပေါက်နိုင်သည်။ 'စပရ' ပင်နှင့် ထင်းရှူးပင်တို့ကဲ့သို့ အောင်မြင်စွာဖြစ်ထွန်းသောအပင်များ ဖြစ်သည်။


အပူချိန်ပြောင်းလဲသည်နှင့်အမျှ အပင်အမျိုးအစားများ ကွာခြားလာသည်။ တောင် များ၏အနိမ့်ပိုင်း ပူနွေးသောဒေသရှိ အပင်များသည် အပူပိုင်းဒေသရှိ အပင်များ နှင့် ဆင်တူသည်။ ထို့အတူ သမပိုင်းတိုက်အပင်မျိုးသည် တောင်အမြင့်ပိုင်းဒေသရှိ အပင်မျိုးနှင့် ဆင်တူသည်။

အပင်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်


အနာဂတ်တွင် စားကျက်မြေများ၌ စိုက်ခင်းသစ်များ အစားထိုးစိုက်ပျိုးရမည်။ ယနေ့လက်ရှိ စားကျက်မြေများတွင် လွတ်ကျောင်းထားသော တိရစ္ဆာန်မှရရှိသည့်ပရိုတင်းပမာဏသည်ထိုမြေပေါ်တွင်စိုက်ပျိုးနိုင်သည့် စိုက်ပျိုးပင်မှရရှိမည့် ပမာဏနှင့်နှိုင်းစာပါက ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ဖြစ်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံအာဟာရဓာတ်ကြွယ်ဝရေးနှင့် လူအားလုံး ဝလင်စွာစားသုံးနိုင်ရေးအတွက် စားကျက်မြေတွင် မွေးမြူရေးအစား သီးနှံပင် စိုက်ပျိုးရမည်။

အပင်မှရရှိသည့်အစားအသုံးအတွက်အပင်မျိုးများကို ရွေးချယ်သန့်စင်နိုင်သကဲ့သို့ အပင်သစ်များလည်း အစားထိုးစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ သကြားမုန်လာပင်သည် ကြံပင်အစား သကြားထုတ်ယူနိုင်သောအပင်သစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ အပင်များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်နှင့်သုတေသနပြုနိုင်ရန်သစ်တောများကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုသည်။ တိရစ္ဆာန်နှင့်အသုံးဝင်အပင်များကိုဥပဒေမပေးနိုင်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများလည်း ထုတ်လုပ်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုလုပ်ကိုင်သမျှ လုပ်ငန်းသည် သဘာဝဟုခေါ်သောဟန်ချက်ညီစနစ်နှင့်သင့်တင့်ညီညွတ်မှုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂေဟဗေဒစနစ်ကိုပံ့ပိုးနိုင်သကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးနိုင်သည်။ အပင်လောက၏ အသုံးဝင်မှုကဏ္ဍကို သဘောပေါက်ပြီး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါက အနာဂတ်အတွက် အလားအလာကောင်းမည်။



ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရှိအပင်များကိုဒီရေအတက်အကျက စိုးမိုးခြယ်လှယ်၏။ ၎င်းတို့သည် လှိုင်း၊ နေနှင့် လေတို့၏ ဒဏ်ကြောင့် စိုက်လှည့်၊ ခြောက်သွေ့သွယ် ဖြစ်သည်။ အကြမ်းခံ ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်နှင့် အညိုရောင်အယ်လဂျီများကို ကျောက်တုံးနှင့် ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင် တွေ့နိုင်သည်။



အပင်ပေါက်ရာဒေသများ၏ ကွဲပြားမှု

ကျွန်ုပ်တို့သည် ‘ဗတ်’ပင်များကို အပူပိုင်းသစ်တောတွင်တွေ့ရမည်မဟုတ်သကဲ့သို့ အပူပိုင်းသစ်ခိုလှည်း အေးမြသောတန်ဒရာဒေသတွင် တွေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အပင်များသည် ဒေသ၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီညွတ်စွာပေါက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

အပူပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်သောအပင်များသည် မိုးများခြင်းဒဏ်နှင့် အပင်အရိပ်ကျမှုကြောင့် စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်းခြင်းဒဏ်တို့ကိုခံနိုင်သည်။ အချို့သောမိုးသစ်တောများတွင် နှစ်ပေါင်းသန်း ၁၃၀ တိုင်အောင် အဖျက်အဆီးကင်းစွာဖြင့် ပေါက်နေသော ဒေသခံအပင်မျိုးစိတ်ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ အိန္ဒိယတိုက်၏ မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တို့တွင် နေရောင်တိုက်ရိုက်မရပဲ ရာသီဥတုလည်း တည်ငြိမ်ခြင်းကြောင့် အပင်မျိုးပြားနည်းပါးသည်။ သမပိုင်းဇုန်သစ်မပင်နှင့် ‘ကိုနိုဗာ’ပင်များသည် မျိုးမပွားမီ နားနေရန် အေးသောရာသီ လိုအပ်သည်။ သဲကန္တာရတွင် ခြောက်သွေ့သော အပူဒဏ်ကိုခံနိုင်သည့် ရွာစောင်းပင်များနှင့် အခြားအပူဒဏ်ခံအပင်များသာရှိသည်။ အလွန်အေးသောဒေသများ၌ထင်းရှူးပင်များ၊ ‘စပရပ်’ပင်များသည် ချုပ်သဖွယ်ဖြစ်လာသည်။ ရေခဲသည့် မြေပြင်၌ ‘လိုင်ကင်’၊ ရေညှိနှင့်အကြမ်းခံသည့် မြက်မျိုးသာ ပေါက်နိုင်သည်။



သဲကန္တာရဒေသများရှိ ရွာစောင်းပင်များသည် မောင်းပွန်သည့် ပင်စည်အတွင်း မိုးရေနှင့် နှင်းရေများကို သိုလှောင်လျက် ရှင်သန်သည်။ တနှစ်လျှင်တကြိမ်သာ ရွာတတ်သော မိုးနှင့်အတူ သဲကန္တာရဒေသ၌အပွင့်တို့ဖြင့် ဝေလေ့ရှိသည်။

အင်္ဂလန်ရှိ ရေကြည်ကန်တစ်ခု၌ ချုံပင်၊ ရွက်ကြွေပင်၊မြက်များနှင့် သမပိုင်းဇုန်ရှိ အပင်မျိုးများ ပေါက်နေသည်။



သမပိုင်းဒေသတွင် ရာသီဥတု လေးမျိုးရှိသဖြင့် အပင်၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရာသီအလိုက် အဆင့်ဆင့်ဖြစ်စေသည်။ ဆောင်းဦးပေါက်၌ အရွက်များကြွေသည်။ တန်ခရာ ဒေသ (အောက်) တွင် 'လိုင်ကင်'၊ ရေညှိနှင့် မြက်များသာ ပေါက်သည်။



သဘာဝပေါက်ပင်များအပြောင်းအလဲ

အပင်များကိုမိုးရှိခြင်း၊ခုတ်လှဲခြင်း၊ဓာတုဆေးများသုံးခြင်း၊ အဆောက်အအုံ များဆောက်ခြင်းတို့ဖြင့် လူသည်သဘာဝဟန်ချက်ညီမှုကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြသည်။ ရောဂါကျခြင်း၊ အပင်များယဉ်ပြိုင်ပေါက်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း တို့ကြောင့် အပင်သစ်များသည် ဒေသအတွင်းရှိအပင်ဟောင်းများနေရာတွင်



အာရှရှိ အပူပိုင်းမိုးသစ်တောတွင် မျိုးစိတ်များစွာရှိသည်။ ထိုသစ်တောမြေပေါ်သို့ နေရောင်ခြည် ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ကျရောက်သည်။ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းမှုသည် တနှစ်ပတ်လုံး ဖွံ့ဖြိုးရန်နှင့် ဖူးပွင့်ရန် အထောက်အကူပြုသည်။

ဝင်ရောက်လာသည်။ ကာလကြာသော် အပင်ဟောင်းများကပြန်လည်ကြီးစိုး လာတတ်သည်။ဒေသတစ်ခုရှိ အပင်များသည် ပျက်သုဉ်းသွားပါက အပင်သစ် များသည် ၎င်းဒေသသို့ တိုးဝင်ပေါက်ရောက်ပြီး ဖုံးလွှမ်းလေ့ ရှိသည်။



ရေရှိသဖြင့် အပင်များစည်ပင်နေသော နိုင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသနှင့် ရေမရှိသဖြင့် အပင်မရှိသော အီဂျစ်သဲကန္တာရကို လမ်းက ခြားပေးထားသည်။



ပုံတွင် 'မန်း' ပင်များသည် ဒေသတစ်ခုကို ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းသည် အပင်များ ယဉ်ပြိုင် ပေါက်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပဲ ထိုဒေသရှိ အပင်များကို လူတို့က ခုတ်လှဲလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။




လူနှင့်သဘာဝပေါက်ပင်များ

လူတို့သည် အလွန်ခေါင်သောဒေသများ၌ အပင်ပေါက်မှုကိုမည်သို့မျှဟန့်တားခြင်း မပြုနိုင်ပေ။ လူသည် ပေါင်းပင်များကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ သစ်ပင်များကိုထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ ခြံပုံအလှထွင်ခြင်း၊ အပွင့်သစ်၊ အသီးဆန်းများပန်တီးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ အပင်သစ်များကို ဒေသသစ်များသို့သွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြင့် အပင်များ ပေါများလာစေနိုင်သော်လည်း သစ်ပင်ခုတ်လှဲခြင်း၊ အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းဖြင့် အပင်များဆုတ်ယုတ်သည်။



မီးတောင်ပေါက်ကွဲခဲ့သော အရှေ့အာရှဒေသများရှိ အောက် ကရက်ကတိုဝါဒေသတွင် ပင်လယ်ရေ၊ လေနှင့်တိရစ္ဆာန်များသယ်ဆောင်လာသောမျိုးစေ့များမှ အပင်တို့ ပေါက်လျက်ရှိသည်။


သစ်တောကိုအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ပါက မြေအောက်အမြစ်အဖွဲ့အစည်းရှိသောမီးဒဏ်ခံနိုင်သည့်အပင်များ အစားထိုးပေါက်လာနိုင်သည်။



'လိုင်ကင်' များသည် လိုအပ်သောရေနှင့် နေရောင်ခြည်ရရန်အတွက် လက်ခံပင်တွင် မှီခိုသည်။

တိရစ္ဆာန်များကဲ့သို့ပင် အပင်များ၌လည်း 'ဗိုင်းရတ်' ရောဂါများ ကျရောက်နိုင်သည်။ လက်ဝဲဘက်တွင် ဗိုင်းရတ် ကျရောက်သဖြင့် အရောင် ကွက်ကျားဖြစ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု တုံ့ဆိုင်နေသော ပင်များဖြစ်သည်။ လက်ယာဘက်တွင် ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်သော ရှင်သန်နေသည့် ပင်များဖြစ်သည်။





ဆန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူအများစု၏ အဓိကအစားအစာဖြစ်သည်။ ရေရှိနိုင်လျှင် စပါးကို တောင်စောင်းများတွင်လည်း လှေကားထစ်များပြုလုပ်၍ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ လက်ယာဘက်တွင် မတ်စောက်သော တောင်စောင်းရှိ အပင်များကို

ခုတ်ထွင်ထားသောကြောင့် လှေကားထစ်များပြုလုပ်ထားစေကာမူ မြေပြိုခြင်းနှင့် အပင်များပျက်စီးခြင်းကိုမကာကွယ်နိုင်ပေ။ မိုးရေနှင့်လေတိုက်စားသဖြင့်မြေပြိုနိုင်သည်။ ပြိုသွားသော မြေများတွင် အဖိုးတန်အပေါ်ယံမြေဆီလွှာများပါသွားသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်း

ရှေးဦးလူ့ အဖွဲ့အစည်းများသည် အလေ့ကျပေါက်သောအပင်များကိုတနေရာမှ တနေရာသို့ သယ်ယူခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့်က စတင်၍ မျိုးစေ့များ စုဆောင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ရိတ်သိမ်းခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ လူတိုင်းအတွက် ဖူလုံသောအစာကို စိုက်ပျိုးယူနိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် လူသည် နေရာအတည်တကျ နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ဘိုးဘွားတို့၏ အမွေဖြစ်သော အတွေ့အကြုံများနှင့် တီထွင်စမ်းသပ်မှုများကြောင့် မြေကိုထွန်ယက်စိုက်ပျိုးရာ၌ တွေ့ရမည့် ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။ အပင်များဖွံ့ဖြိုးမှုတွင် ရာသီဥတုသည် အဓိက ဖြစ်သည်။ လေနှင့်

ရေက အဖိုးတန်ဓာတ်ဆားများကို တိုက်စားသဖြင့် မြေ၏သဘာဝပျက်စီးခြင်းကို သစ်မာပင် သို့မဟုတ် ချုံပင်များစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်သည်။

မြေပျက်နှာပြင်၊ မြေအမျိုးအစားနှင့်ရာသီဥတုသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စေသော သေချာချက်များ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအခြေအနေများကို လူက ကူညီထိန်းပေးရမည်။ မိုးပါးလျှင်ဖြစ်စေ၊ မြေကြီးက မိုးရေကို ထိန်းမထားနိုင်လျှင်ဖြစ်စေ ရေသွယ်မြောင်းများဖြင့် ရေဖြန့်ဝေပေးရမည်။ မြေကြီးအတွင်းရှိ ဓာတ်ပစ္စည်းများ အချိုးအစား မျှတသည့်အခြေအနေ ပျက်ပြယ်နေသောအခါ ပြုပြင်ရန် ဓာတ်မြေဩဇာ ကြပ်ပတ်ပေးရမည်။ ဤသို့ဖြင့် နှစ်စဉ် မြေဩဇာ ပြန်လည် တက်လာနိုင်သည်။



တောင်တန်းများ၌ အထက်ပါပုံအတိုင်း ရေမြောင်းသွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ရေမရသည့် လယ်ကွင်းများကို ရေရရှိစေသည်။ လက်ယာဘက်ရှိ နာနတ်လျှော်ပင်များ၏

ဘေးဝန်းကျင်တွင်ပေါက်သည့် ချုံပင်များကို မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် နာနတ်လျှော်ပင်များ ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးနေသည်ကို တွေ့ရသည်။



ခတ်ချီစိုက်ခင်းအတွင်း၌ ‘ဟိုင်ယာဆင့်’ပင်များကို ၎င်း၏ ‘ဗပ်’အတက်များ ရောင်းချ
ရန်အတွက် စိုက်ပျိုးထားသည်။ ဝယ်ယူသူများက ၎င်းတို့ကို ကိုယ်ပိုင်အိမ်နှင့် ပန်းခြံ
များတွင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးသည်။

ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပင်များကို အတန်းလိုက်စီ၍စိုက်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ အမြစ်များ၊
ပင်စည်များ၊ အရွက်များနှင့် အသီးများသည် လူတို့အတွက် ကြွယ်ဝသောအာဟာရ
ဓာတ်ကို ပေးသည်။



အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု မွန်ဟာနာပြည်နယ်ရှိ လျူခင်းနေရာဟောင်းတွင် နွားများလွှတ်ကျောင်းထားသည်။ ဤကွင်းနေရာအကျယ်အဝန်းမျိုးတွင် လျူစိုက်ပျိုးပါက
နွားမွေးမြူခြင်းထက် စရိတ်နည်းပြီး လူများအတွက် ပရိုတင်း ပိုမိုရရှိမည်။

ပင်မှရရှိသည့် အာဟာရ

ကိုစားသုံးသော အပူပေး အာဟာရ၊ ဟင်းခတ်အမျိုးအစားနှင့် မျိုးစေ့များတွင် အာဟာရဗဟိုတင်နှင့် အခြားအာဟာရဓာတ်များပါသည်။ အဖိုးတန်သီးနှံများ ခွက်ပျိုးနိုင်သော နယ်မြေများကြောင့် စစ်ပွဲများဖြစ်ခဲ့ရသကဲ့သို့ အပင်ထွက် အစာကြောင့်ပင်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အပင်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် အပင်ထွက် 'ပင်မင်း' များသုံး၍ အထည်များကို အရောင်ဆိုး အလှဆင်ခြင်း၊



အပင်ထွက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ စပါးလင်၊ နနွင်း၊ သင်ကြပ်ပျို၊ ငရုတ်၊ စမုန်၊ ငှက်ပျော့၊ သံလွင်၊ လေးညှင်း၊ ငရုတ်ကောင်းတို့ကို ပုံတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အများစု၏ ဒေသရင်းမှာ အရှေ့တိုင်းဖြစ်သည်။

ပန်းချီဆွဲခြင်းတို့ ပြုခဲ့သည်။ မျိုးစေ့များသည် အခြေခံစားကုန်တမျိုးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတွင် အရေးကြီးဆုံးသော မျိုးစေ့နှစ်မျိုးမှာ ဂျုံနှင့်စပါးတို့ဖြစ်သည်။ အသီးများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည် အစာခြေအင်္ဂါများ၌ အစာခြေခြင်းကို ကူညီရုံသာမက အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်ပေးသည်။




အောက်ဘက်တန်းတွင် စပါး၊ ဆန်၊ ပြောင်း၊ ဘာလီနှင့် ဂျုံတို့ကိုလည်းကောင်း၊ အပေါ်ဘက်တန်းတွင် ပဲပိစပ်၊ မိုက်ဆိုးကုလားပဲ၊ မြေပဲနှင့် ပဲတီစိမ်းတို့ကိုလည်းကောင်း ဝဲမှယာသို့ အစဉ်အတိုင်း ပြထားသည်။ ၎င်းတို့အနက် ဂျုံတွင် ဗီတာမင်နှင့် ပရိုတင်း အများဆုံး ပါဝင်သည်။



အာဟာရဓာတ် ကြွယ်ဝသော ခရမ်းချဉ်၊ ဆလတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ငရုတ်၊ ခရမ်း၊ သခွား၊ ဂေါ်ဖီပန်း၊ ကြက်သွန်၊ မုန်လာဥဝါနှင့် အခြားအသီးအရွက်များ ဖြစ်သည်။



ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ရောင်းချရန် ဂေါ်ဖီပန်းများကို ပွင့်အား အကောင်းဆုံး အချိန်တွင် ခူးနေပုံ ဖြစ်သည်။



အသီးများတွင် ပုံသဏ္ဌာန်၊ အရောင်နှင့် အရသာ
ကမ္ဘာ့မျိုးမျိုးရှိပြီး ဗီတာမင်နှင့် 'မရတ်တို့' သကြား
ပါဝင်သည်။ အပေါ်ပုံတွင်ပန်းသီး၊ ဓမ္ပရသီး၊ မရသီး၊
ရှားရင်းသီးနှင့် သဘောသီးများကို ပြထားသည်။

မြေပဲများကို မော်နေပုံ ဖြစ်သည်။ မြေပဲသည်
ပရိုတင်းကြွယ်ဝသော သီးနှံတမျိုးဖြစ်ပြီး ၎င်းကို
အမျိုးမျိုး အသုံးပြုနိုင်သည်။



ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အစိမ်းရောင် ပင်လယ်ကျောက်ပွင့်
ကြီးများကို ဝါးတိုင်များတွင် ချည်ထားသော
ထန်းလျှော်ပိုက်ကွန်ဖြင့် ဆောင်းမှ နွေဦးပေါက်
အထိ သိမ်းယူသည်။ ထို့နောက် စင်များပေါ်တွင်
ဖြန့်၍ အခြောက်လှန်းသည်။



လိမ္မော်သီးများကို ဆွတ်ခူးနေပုံ ဖြစ်သည်။ အသီးသည် ဗီတာမင် ဗီ
ကြွယ်ဝသည်။ လိမ္မော်ပင်သည် ပူနွေးသော ရာသီဥတုကို နှစ်သက်သည်။





အပင်များသည် အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးကြီးသော ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ဝါကို ချည်မျှင်အဖြစ် ချည်ငင်ပြီးနောက် အမျိုးမျိုးသုံးနိုင်သော အထည်အလိပ်ရက်လုပ်သည်။ လက်ဝဲဘက်တွင် အပင်ထွက်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထည်၊ ရုပ်အင်္ကျီနှင့် အပ်ချည်တို့ကို ပြထားသည်။



အပင်များ၏အသုံးဝင်မှု

နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကပင် အပင်များကိုစုဆောင်းယူခဲ့ကြပြီး အသက်ရှင်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အပင်အချို့ကို နဂိုအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အများစုကိုမူ ထုထောင်းခြင်း၊ ပြုတ်ခြင်း၊ ရက်လုပ်ခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်းစသောနည်းများဖြင့် ပြုပြင်လျက် အမျိုးမျိုးအသုံးပြုသည်။



မက္ကဆီကန်လူမျိုးတိုင်း ခြင်းတောင်းရက်လုပ်နေသည်။ အပင်ထွက်ပစ္စည်းများဖြင့် ရက်လုပ်ထားသော ခြင်းတောင်းနှင့်အခြားပစ္စည်းများ (ဝဲ) ဖြစ်သည်။



ကြွေကို လက်ဖြင့်ပြုလုပ်နေပုံ ဖြစ်သည်။ အပင်ရှိ မာကျောသော
‘ဆယ်လူလို့’ လျှော်မျှင်များကို ရေခဲမဲပြီး ကြွေမွှေးအောင်ရိုက်သည်။
ထို့နောက် ကောဖြင့်ဖိ၍ ရေကိုညှစ်ထုတ်သည်။



ပုံတွင် ဗူးသီးခြောက်ဖြင့် ပြုလုပ်သော တူရိယာပစ္စည်းများ၊ ဝါးကျည်တောက်၊
သစ်သားခင်းအိမ်နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို ဖြထားသည်။



အပင်ထွက်ပစ္စည်းများဖြင့်သာ ဆောက်လုပ်ထားသော မလေးရှား
အိမ်တစ်အိမ်ပုံ ဖြစ်သည်။

အင်ဒိုနီးရှား၊ တိုရာဂျာလူမျိုးစု၏ရိုးရာအိမ်ကို အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ
သုံး၍ဆောက်ထားသည်။ (ပုံကိုစာမျက်နှာ ၁၁၀ တွင် ကြည့်ပါ။)



ဝေါဟာရစာရင်း

ကဏန်းရှားစောင်းပင်
 ကဏန်းလက်မပင်
 ကရင်ဗယ်ရီ
 ကလေးဒီယမ်ပိုင်ကာလာ
 ကလိုဗာအနီပင်
 ကလိုဗာအဖြူပင်
 ကလိုရိုပလတ်
 ကလိုရိုဖီး
 ကလိုရိုဖိုက်တာ
 ကလိုင်းမာစီယမ် အမေရိကန်နမ်
 ကလမ်မက်တစ် ပေတင်
 ကလမ်မက်တစ် ပလော်ရီဒါ
 ကာလီဖိုးနီးယားပေါ်ပိပင်
 ကားလဗွန်လင်နေ
 ကေတိုဆီရော့
 ကော့ကိုလပ်သိုပိုရီဒါ
 ကော်တိုနယ်လတ် ရှိအိုင်တာကေ
 ကော်နတ် ကော်ဆန်
 ကော်လာပါ ရေစိမ့်ဆာ
 ကော်လာရက် ဒေလီယာ
 ကော်လူနာ ဗာလဂါရပ်
 ကိုနီပာပင်
 ကိုရိုဒလပ် အင်ဆိုက်ဆာ
 ကိုလိုနီ
 ကက်ချပလိုင်ပင်
 ကက်တလီယာသစ်ခွ
 ကင်တာဗာရီခေါင်းလောင်းပွင့်ပင်
 ကုန်း
 ကုန်းမြင့်နှင်းပန်းပင်
 ကပ်ပါးသဘော
 ကမ်မီလီယာ ဆာဆန်ကွာ
 ကယ်ရိုတင်း ခရိုမိုပလတ်
 ကယ်လာသီယာ လီတဇီ
 ကျူတီကယ်
 ကျူဗာ
 ကျူးလပ်သစ်မာပင်
 ကျောက်ခဲပင်
 ကြိုးချုပ်ပင်
 ကြက်သွေးရောင်ပင်ပါနယ်ပင်
 ကြောင်မြီးပန်းပင်
 ကွဲပြားရင်မာခြင်း
 ကွင်းအယ်လီဘက်နှင်းဆီ
 ကွန်ဂျူဂေးရှင်း
 ကွန်းပလားဝါးပင်
 ကွမ်အတက်
 ခိုမိုဗက်တီးရီးယား
 ခေမီဆိုက်ပရစ် ပီစီဟာရာ
 ခိုလေးရီးယား မိုဂိုတင်းဆစ်
 ချူးယင်းဂမ်း
 ချက်စနတ်ပင်

Crab cactus
 Lobster claw
 Cran berry
Caladium bicolor
 Red clover
 White clover
 Chloroplast
 Chlorophyll
 Chlorophyta
Climacium americanum
Clematis patens
Clematis florida
 California poppy
 Karl von Linné
 Chaetoceros
 Coccolithophorida
Cortinellus shiitake
Cornus kouson
Caulerpa racemosa
Collarette dahlia
Calluna vulgaris
 Conifer
Corydalis incisa
 Colony
 Catchfly
 Cattleya
 Canterbury bell
 Cone
 Highland lily
 Parasitism
Camellia sasanqua
 Carotene chromoplast
Calathea lietzei
 Cuticle
 Tuber
 Tulip tree
 Stone plant
 String bush
 Scarlet pimpernel
 Chenille plant
 Differentiation
 Queen Elizabeth rose
 Conjugation
 Cornflower
 Corm
 Chemobacteria
Chamaecyparis pisifera
Kohleria bogotensis
 Chewing gum
 Chestnut

ခွေးနှင်းဆီ
 ခွန်ဒရတ် ခရစ်စပတ်
 ခွန်ဒရတ် အော်စီလေးတတ်
 ဂရေ့စပူးပိန်းဆီ
 ဂရိုတ်တား ဆယ်လန်ဒိုင်းပင်
 ဂလီယိုထရစ်ကီယာ
 ဂလူတာ ရင်ဂတ်
 ဂလော့ဆီနီယာပင်
 ဂလိုင်းကီနီယာဖန်းပင်
 ဂါဒင်ဆွေပင်
 ဂေါ်လ်ကီရီယာ
 ဂိုးလဒင်း ဒီလီရှပ်
 ဂေါက်ဝိပင်
 ဂင်ကိုပင်
 ဂျက်ဗီနီယာ ကာနီယာ
 ဂျပ်နီကလိုဗာပင်
 ဂျပ်နီကွင့်ပင်
 ဂျပ်နီဆီဒန်ပင်
 ဂျပ်နီပေါ့လာပင်
 ဂျပ်နီပတ်နွယ်ပေါင်းပင်
 ဂျပ်နီဗာဗယ်ရီပင်
 ဂျပ်နီမြေပေါက်သစ်ခွ
 ဂျပ်နီသွေးတိတ်ပင်
 ဂျပ်နီအနက်ရောင်အော်လဒါပင်
 ဂျရေနီယမ် ခရာမာရီ
 ဂျရေနီယမ် အီရီယိုစတီမန်
 ဂျာဗား ပါစလေပင်
 ဂျီလီဒီယမ် ကာတီလေဂျီနီယမ်
 ဂျူနီပီပင်
 ဂျေရူဆလင် အာတီချျတ်
 ဂျင်မနီဒီနီယမ်
 ဂျင်ရှင်ပင်
 ဂျိုင်းယင်နေ့ဝိပင်
 ဂျိုင်းယင်ဝါးတားလီလီကြာပင်
 ဂျန်ကတ် ဒီစီပီယင်
 ငှက်တောင်ပေါ်ပိပင်
 ငှက်တောင်မင်တံပင်
 ငှက်ပျော့နှင်းပန်းပင်
 ငှက်မျက်စိပင်
 စဘားကင်း
 စတော့ပင်
 စတိုမာ
 စတက်
 စတက်ပီလီယာ
 စတက်ဖိုင်လိုကော့ကတ်
 စထရိုမင်းသတ်ပင်
 စထရက်ပတိုကော့ကတ်
 ဟေမိုလိုက်တီကတ်

Dog rose
Chondrus crispus
Chondrus ocellatus
 Graceful Peace rose
 Greater celandine
 Gloeotrichia
Gluta renghas
 Gloxinia
 Gleichenia
 Garden sage
 Golgi apparatus
 Golden delicious
 Goutweed
 Gingko
Jacobinia carnea
 Japanese clover
 Japanese quince
 Japanese sedum
 Japanese poplar
 Japanese bindweed
 Japanese barberry
 Japanese ground orchid
 Japanese woundwort
 Japanese black alder
Geranium krameri
Geranium eriostemon
 Javanese parsley
Gelidium cartilagineum
 Juniper
 Jerusalem artichoke
 Gymnodinium
 Gentian
 Giant knotweed
 Giant waterlily
Juncus decipiens
 Plume poppy
 Quillwort
 Plantain lily
 Bird's eye
 Star king
 Stock
 Stoma
 Staph
 Stapelia
 Staphylococcus
 Strophanthus
Streptococcus
haemolyticus

စပရပ်ပင်
စပိုင်ရီယာ ပရူနိုဖိုလီယာ
စပိုင်ရူလီနာပင်
စပိန်ရေညှိပင်
စဖက်ဂနမ်ပင်
စိကိုလီယာပင်
စိဒါပင်
စိရာတော့တယ်ရစ်
သယ်လစ်ထရိုက်ဒီ
စိလိုဂျင်းသစ်ခွ
စူလတန်ဘုရင်၏ထီးပင်
စက္ကူပိုးစာပင်
စက္ကူအခေါက်ပင်
စိန့်ဂျွန်စဝပ်ပင်

ဆာဂူအာရိုဂျားစောင်းပင်
ဆီဆယ်ပီနီယာ ဂျပန်နီကာ
ဆီဒမ် ကန့်ရှာတိကမ်
ဆီရေရှမ် ပတ်စကမ်
ဆော်လမုန်၏ တံဆိပ်တုံးပင်
ဆိုရယ်ပင်
ဆိုးသစ်ဆယ်ပင်
ဆက်ကဇီဖရက်ပင်
ဆက်ပရိုလက်ဂနီယာ မိုနိုက်ကာ
ဆိုက်ကလာမင်ပင်
ဆိုက်တီဆတ် စကိုပေးရီးယတ်
ဆိုက်တိုပလာဇမ်
ဆိုက်ပရက်ပင်
ဆိုက်ပရတ် မိုက်ကရိုလီယာ
ဆိုက်လိုဖိုက်
ဆင်ကိုကော့ကတ်
ဆင်ကိုနာပင်
ဆင်ဗီဒီယမ်သစ်ခွ
ဆင်ကဲမြစ်စဉ်ဇာစ်မြစ်
ဆောင်းဟေဇယ်ပင်
ဆိုင်လိုတမ် နယူဒမ်
ဆိုင်အေသီယာဖန်းပင်
ဆစ်ကမိုးပင်
ဆစ်ထရတ် ဂျပန်နီကာ
ဆုပ်ဗယ်ရီပင်
ဆယ်လဗီနီယာ
ဆယ်လာဂျီနယ်လာ ဝီလဒီနိုဗီအိုင်
ဆယ်လီယိုတာ ကင်ပက်စထရစ်
ဆယ်လူလို့

ညနေပရင်းမရီပင်

တဘက်စိမ်းခြင်း
တရားဟောစင်မြင့်ပေါ်ရှိဂျက်ပင်
တရုတ်ခေါင်းလောင်းပန်း
တရုတ်ဟက်ဗယ်ရီပင်
တရုတ်အဖူးနီပင်
တီ - ၂ ဗက်တရီယိုဖေ့
တေနိုယိုဖိုလမ် အော်ဗကျူဆန်

Spruce
Spiraea prunifolia
Spirulina
Spanish moss
Sphagnum
Sequoia
Cedar

Ceratopteris thalictroides
Coelogyne
Sultan's parasol
Paper mulberry
Paperbark tree
Saint-John's-wort

Saguaro cactus
Caesalpinia japonica
Sedum kamtschaticum
Ceratium fuscum
Solomon's seal
Sorrel
Sowthistle
Saxifrage
Saprolegnia monoica
Cyclamen
Cytisus scoparius
Cytoplasm
Cypress
Cyperus microiria
Psilophyte
Synechococcus
Cinchona
Cymbidium
Evolutionary root
Winter hazel
Psilotum nudum
Cyathea
Sycamore
Citrus japonica
Soapberry
Salvinia
Selaginella wildenovii
Psalliotia campestris
Cellulose

Evening-primrose

Osmosis
Jack-in-the-pulpit
Chinese bellflower
Chinese hackberry
Chinese redbud
T 2 bacteriophage
Taeniophyllum obtusum

တက်စေးစီး
တင်းပုတ်မို
တင်းပုတ်ရေညှိပင်
တောင်ကုန်းချယ်ရီပင်
တောင်ကြားနှင်းပန်းပင်
တိုင်းပင်
တစ်ရှူး
တယ်ရီဒိုဖိုက်တာ
တယ်ရိုကယ်ရီယာ ရှိုလ်ဖိုလီယာ
တယ်ရစ် မာလတီဖီဒါ

ထရိုင်စကိုဆန်သီပင်
ထရိုင်ဆီရေရှမ်

ဒရော်ဆာရေးစီး
ဒရယ်ဖိုချိုဖန်းပင်
ဒါဝင် ကျူးလစ်ပင်
ဒီဂျီဝါသီယာ ခရိုင်ဆင်သာ
ဒီအင်အေ

ဒူဇီယာ
ဒေါ့ဂုပင်
ဒေါပင်
ဒက်ဖနီ ဆူဒို-မီဇာရီယမ်
ဒက်ဖနီမွေးပင်
ဒက်ဖိုဒယ်ပင်
ဒေါက်ဂလတ်ဖားပင်
ဒင်ဒရိုဗီယမ်သစ်ခွ
ဒိုင်နိုမလက်ဂျယ်လိတ်
ဒိုင်ယန်သတ် ဂျပန်နီကာတ်
ဒိုင်ယန်သတ် ဗာဗေးတတ်
ဒိုင်အာတမ်
ဒစ်ချီဒီယာ အက်စတီဖာနာ
ဒတ်ချ်ဆေးတံပင်
ဒန်ဒီလိုင်ယန်ပင်

နဂါးခေါင်းအတုပင်
နဂါးလျှာဖန်းပင်
နယူကလီယ
နယူကလီအစ်အက်ဆစ်
နယူးဂီနီ သစ်မာတွားသွားပင်
နာစစ်ဆတ်ပင်
နီတမ်ပင်
နီပရိုလစ်ပစ် ကော်ဒီဖိုလီယာ
နီယမ် ကတ်စပီဒေတမ်
နွေးနှင်းပန်းပင်
နော့စတော့
နော့တီလူကာ
နွားမျက်စိဒေစီပင်

ပဇိုက်ဇာ
ပရူနတ် တိုမင်တိုဆာ
ပရူနတ် ဒိုမက်စတီကာ

Taxaceae
Club fungus
Club moss
Hill cherry
Lily of the valley
Thyme
Tissue
Pteridophyta
Pterocarya rhoifolia
Pteris multifida

Triscosanthes
Triceratium

Droseraceae
Stag's horn fern
Darwin tulip
Degeworthia chrysanth
DNA (Deoxy-ribose
nucleic acid)

Deutzia
Dogwood
Dock
Daphne pseudo-mezereum
Sweet daphne
Daffodil
Douglas fir
Dendrobium
Dinoflagellate
Dianthus japonicus
Dianthus barbatus
Diatom
Dischidia astephana
Dutchman's pipe
Dandelion

False dragonhead
Dragon tongue fern
Nucleus
Nucleic acid
New Guinea creeper
Narcissus
Gnetum
Nephrolepis cordifolia
Mnium cuspidatum
Day lily
Nostoc
Noctiluca
Wild ox-eye daisy

Peziza
Prunus tomentosa
Prunus domestica

ပရုနတ် မူမီ
ပရိုတိုပလာဇမ်
ပရင်းမရိုပင်
ပလက်တီကိုဒွန် ဂရန်ဒီဖလောရတ်
ပလိန်းပင်
ပါစလိန်းပင်
ပါနက်ဆတ် မြက်ပင်
ပါမီယိုပယ်ဒီလမ်သစ်ခွ
ပါမီလီယာ တူဗူလိုဆာ
ပိကျူနီယာပင်
ပိတိုင်းပင်
ပိအိုနီ သစ်မာပင်
ပုလင်းဆေးဝက်မှင့်ဘီးပင်
ပေါ့ပလာပင်
ပေါ်တူလက်ကာ ဂရန်ဒီဖလောရတ်
ပေါ်ဖီရာ တီနိုရာကီဂျယ်လမ်
ပေါ်လီဂလာ
ပေါ်လီဂလေးစီး
ပေါ်လီထရပ်ကမ် ဂျူနီပါရီနမ်
ပေါ်လို့နီယာပင်
ပိုဂိုနောတမ် မက်ကရိုဖီလမ်
ပင်စီပင်
ပင်နယူးလေးရီးယား
ပင်နီဆီလီယမ်
ပင်ရေပြန်ခြင်း
ပင်လယ်ကျွေပေါင်းပင်
ပင်လယ်ဆလတ်ပင်
ပင်ဂမီဝါးတားလီလီကြာပင်
ပင်ဂမင်း
ပတ်ဖဘော
ပယ်လာဂိုနီယမ် ဆက်ဇမိုနီယမ်
ပယ်လီဆိတ်
ပျံနဲ့ ရောနှောခြင်း
ပြောင်းပေါ် ပိပင်

Prunus mume
Protoplasm
Primrose
Platycodon grandiflorus
Plane
Purslane
Grass of Parnassus
Paphiopedilum
Parmelia tubulosa
Petunia
Petai
Tree peony
Bottle-brush tree
Poplar
Portulaca grandiflora
Porphyra teneraki jellum
Polygala
Polygalaceae
Polytrichum juniperinum
Paulownia
Pogonatum macrophyllum
Pansy
Pinnularia
Penicillium
Transpiration
Gulfweed
Sea lettuce
Pygmy waterlily
Pigment
Puffball
Pelargonium sazmonium
Palisade
Diffusion
Corn poppy

ဗလူးဗယ်ရီပင်
ဗလတ်ဒါရက်ပင်
ဗာဇင်နီယာပင်
ဗာဗီနာ ဟိုက်ဗရစ်ဒါ
ဗာဗယ်ရီပင်
ဗာလဆာပင်
ဗိပင်
ဗေအိုဗတ်ပင်
ဗဲဟက်သာပင်
ဗိုလီတတ် အီဒူလစ်
ဗက်ဆီဒီယိုကပ်
ဗက်ဆီဒီယိုပိုး
ဗက်ဆီဒီယမ်
ဗက်ဆီလိုင်
ဗိုက်တက်ပင်
ဗိုက်တစ် ထရိုင်ဖိုလီယာ
ဗင်ဂျီယာ အာထရိုပါယူရီယာ
ဗင်ဇိုင်းသစ်မာပင်
ဗင်ဒါသစ်ခွ
ဗိုင်အိုလာ ဂရပ်ပိုဆာရက်
ဗိုင်အိုလက်မျိုးရင်း
ဗစ်စကမ် အယ်လဗမ်
ဗစ်ဒယ်မီးယား
ဗတ်ပင်
ဗတ်ခဝိုပင်
ဗတ်တာကပ်ပင်
ဗတ်တာဝပ်ပင်
ဗတ်လီယာ ဒေဗီဒီ
ဗုဒ္ဓလက်ချောင်းတော်မျှားအပင်
ဗန်ဗယ်ရီပင်
ဗပ်အတက်
ဗယ်ရင်ဝပ်ပင်
ဗယ်လာဒိုနာပင်
ဗယ်လာရီယန်ပင်

Blueberry
Bladderwrack
Bazzania
Verbena hybrida
Barberry
Balsa tree
Beech
Baobab
Bell heather
Boletus edulis
Basidiocarp
Basidiospore
Basidium
Bacilli
Vitex
Vitis trifolia
Bangia atropurpurea
Benzoin tree
Vanda
Viola grypoceras
Violet family
Viscum album
Biddulphia
Birch
Buckwheat
Buttercup
Butterwort
Buddleia davidi
Buddha's fingers
Bunchberry
Bulb
Barrenwort
Belladonna
Valerian

ဖယောင်းပင်
ဖရိုစီယာ ရီဖရက်တာ
ဖရတ်တီကို လိုင်ကင်
ဖရွန်း
ဖားပင်
ဖားပြပ်နှင်းပန်းပင်
ဖီလိုဒင်ဒရိုနပ်ပင်
ဖော်ကျွန်းထန်းပင်
ဖော်ဂက်မီနောပင်
ဖိုတိုဗက်တီးရီးယား
ဖန်းဂတ်
ဖန်းပင်
ဖျူရှီယာ ဟိုက်ဗရစ်ဒါ
ဖျူးကတ် အီဗင်နောစင်

Wax tree
Freesia refracta
Fruticose lichen
Fronde
Fir
Toad lily
Philodendron
Fortune's palm
Forget-me-not
Photobacteria
Fungus
Fern
Fuschia hybrida
Fucus evanescens

ဘရာဇီးတင်စေ့သီးမျိုးရင်း
ဘဝပင်

မရုဏ်ဦးထုပ်မှု
မဟော်နီယာ ဂျပ်နိုကာ
မာကင်ရှာ ပေါ်လီမော်ဗာ
မာဂျော်ရမ်
မာတယ်ပင်
မီဆင်ဗရိုင်ယန်သမမ်မျိုးရင်း

မီလိုဆီရာ
မီးပေါင်းပင်
မူဆာ တက္ကတီလစ်
မေပယ်ပင်
မော်ရယ်မှု
မက်ကရင်ဂါပင်
မက်ဂနိုလီယာ ကိုဗတ်
မက်ဂနိုလီယာ ဂရန်ဒီဖလောရတ်
မက်ဂနိုလီယာ လီလီဖလောရတ်

Brazil-nut-tree family
Octopus tree

Death-cap
Mahonia japonica
Marchantia polymorpha
Marjoram
Myrtle
Mesembryanthemum family

Melosira
Fireweed
Musa textilis
Maple
Morel
Macaranga tree
Magnolia kobus
Magnolia grandiflora
Magnolia liliiflora

ဗနီလာပင်
ဗရက်ကင်ပင်
ဗရိုင်ယာပင်
ဗရိုင်ယိုပိုက်တာ

Vanilla
Bracken
Briar
Bryophyta

မက်တာဝီကိုင်ယာပင်
မက်ဒါပင်
မက်မန်းယူးပင်
မက္ကဆီကိုရှားစောင်းပင်
မိုက်ကရိုဝစ်စတစ်
မိုက်ချိုလီယာ မိုဂို
မိုက်တိုဒွန်ဒရီးယား
မယ်ရစ်စပိုပိုဒီယာ
မျိုးစု
မျိုးစိတ်
မျိုးဆက်တလှည့်စီဖြစ်ခြင်း
မျိုးပြား
မျိုးယဉ်
မျိုးရင်း
မျက်ဝန်းပြာမြက်ပင်
မြေခွေးလက်အိတ်ပင်
မြေထဲပင်လယ် နှာစစ်ဆတ်ပင်
မြေပြင်ကြယ်ပွင့်မှု
မြေအိုင်ဗီပင်
မြက်ထုံးကြီးပင်
မြောက်အမေရိက ယတ်ကာပင်
မြင်းမြီးပင်
မြေလျှာဖန်းပင်

ယူချီယူမာ ဂရာစီလစ်
ယူဂလီနိုက်
ယူဂျီနီယာ ကယ်ရိုဖိုလစ်
ယူဂျီနီယာ အေကွီယာ
ယူဖော်ဗီယာ စပလင်ဒင်
ယူဖော်ဗီယာ ဟယ်လီယို
စကိုပီယာ
ယူးပင်
ယင်ကောင်ပွို

ရိုစီအိုကာပတ် နေတင်
ရှူးဗတ်
ရေခဲပင်
ရေသူမယပ်တောင်ပင်
ရေသူမပိုင်ဖန်ခွက်ပင်
ရေအိုင်ပေါင်းပင်
ရိုဒိုမီနီယာ ပေါ်လီနိုတာ
ရိုဒိုဒင်ဒရွန် ဂျပန်နိုကာတ်
ရိုဒိုဒင်ဒရွန် မက်ကရိုဆက်ပလမ်

ရိုစမေရီပင်
ရက်ပလီဆီယာပင်
ရင်ဂတ်ပင်
ရိုင်ဇုမ်း
ရတ်စဗယ်ရီပင်
ရှိုဆိုရယ်ပင်
ရှိုရီးယား ကာတင်ဆီအိုင်
ရှိုင်ဇိုသရစ်

လာဗင်ဒါပင်

Metasequoia
Madder
Plum yew
Mexican catcus
Microcystis
Michelia figo
Mitochondria
Merismopedia
Genus
Species
Alternation of generations
Variety
Cultivar
Family
Blue-eyed grass
Foxglove
Mediterranean narcissus
Earth star
Ground ivy
Giant knotgrass
North American yucca
Horsetail
Adder's tongue fern

Eucheuma gracilis
Euglenoid
Eugenia caryophyllus
Eugenia aquea
Euphorbia splendens
Euphorbia helioscopia

Yew
Fly agaric

Ricciocarpus natans
Rubus
Ice plant
Mermaid's fan
Mermaid's wineglass
Pondweed
Rhodymenia polynota
Rhododendron japonicus
Rhododendron macrosepalum
Rosemary
Rafflesia
Ranghas
Rhizome
Raspberry
Sheep sorrel
Shorea curtisii
Schizothrix

Lavender

လာမီနေးရီးယား ဂျပန်နိုကာ
လီယွန်တိုပိုဒီယမ် ဂျပန်နိုကာ
လူပင်အပင်
လူသေလက်ချောင်းများအပင်
လေညင်းနှင်းပန်းပင်
လေးဒီးစလစ်ပါ သစ်ခွ
လော်ရယ်ပင်
လိုဗီလီယာ ကီနိုစစ်
လိုဗီလီယာ အီရိုနတ်
လက်ဘနွန်စီဒါပင်
လင်ဒင်ပင်
လိုင်ကင်
လိုင်စီချီဘွန် ကင်ချာတင်
လစ်ကိုရစ် ရေဒီယာတာ
လစ်ဂနမ် ဗိုက်တေ
လစ်ဗာဝပ်
လတ်ချီပင်
လန်ဒန်ပလိန်းပင်
လုံမပျိုကေသဖန်းပင်
လွန်းပုံအိတ်အရွက်ပင်
လှုပ်ယမ်းမြက်ပင်

ဝါမီယာ ဆတ်ပရူတိုကိုဆာ
ဝါးတားစတစ်ချပ်ပင်
ဝေးပဲရင်းပင်
ဝဲလဝင်ဂျီယာ ဗေနိုစီအိုင်
ဝက်အူချောင်းပင်
ဝင်းတားဂရင်း
ဝစ်စတီးရီးယားပင်
ဝစ်ဟေဇယ်ပင်
ဝှစ်ဖန်းပင်

သကြားမေဗယ်ပင်
သရစ်ပင်
သူယာပင်
သူယော့ပစစ်ပင်
သစ်ဆယ်ပင်
သန္တာမှု
သယ်လတ်

ဟိမဝန္တာ စီဒါပင်
ဟေဇယ်နတ်ပင်
ဟော်လီပင်
ဟော်သွန်ပင်
ဟောက်စလီပင်
ဟိုက်ဒရိုလာ ဗာတီစီလာတာ
ဟိုက်ဒရိုကရစ်ပင်
ဟင်းမလော့ပင်
ဟိုင်ယာဆင့်ပင်
ဟစ်ဗစ်စကတ် ဂျပန်မျိုး
ဟစ်ဗစ်စကတ် ဆီးရီးယားမျိုး
ဟစ်ဗစ်စကတ် တရုတ်မျိုး
ဟန်းနီးဆတ်ကယ်ပင်

Laminaria japonica
Leontopodium japonicum
Lupin
Dead men's fingers
Zephyr lily
Lady's slipper
Laurel
Lobelia keniensis
Lobelia erinus
Lebanon cedar
Linden tree
Lichen
Lysichiton camtshatense
Lycoris radiata
Lignum vitae
Liverwort
Larch
London plane
Maidenhair fern
Spindle-shaped
bladderleaf
Quaking grass

Wormia suffruticosa
Water stitchwort
Wayfaring
Welwitschia bainesii
Sausage tree
Wintergreen
Wisteria
Witch hazel
Whisk fern

Sugar maple
Thrift
Thuja
Thujopsis
Thistle
Coral fungus
Thallus

Himalayan cedar
Hazelnut
Holly
Hawthorn
Houseleek
Hydrilla verticillata
Hydrocharis
Hemlock
Hyacinth
Japanese sea hibiscus
Syrian hibiscus
Hibiscus manihot
Honeysuckle

ဟယ်လီဗိုရတ်
ဟွန်ကင်ယာ မိစိပိုလီယာ
ဟွန်ဒူရတ် မဟော်ဂနီ

အကေးရှားပင်
အစာမွဲစည်းခြင်း
အနာပျောက်ဆေးပင်
အနံ့ဆိုးပျံကောင်ဂေါ်ဖီထပ်ပင်
အနက်ရောင်နှင်းပန်းမျိုးရင်း
အနက်ရောင်ဖရစ်တီလေရီပင်
အပြန်အလှန် အကျိုးပြုသဘော
အမျိုးသမီးလက်ချောင်းအပင်
အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း
အမြောက်ဆန်ပင်
အရှေ့တိုင်းယူးပင်
အရှေ့အာရှ ကျားနှင်းပန်းပင်
အလံပြာပင်
အလံဝါပင်
အာချီဗက်တီးရီးယား
အာတီချုတ်
အာဖရိကကျူးလစ်သစ်မာပင်
အာဖရိက ဗိုင်အိုလက်ပင်
အာမီလေးရီးယား အိဒိုက်
အာရှအိန္ဒိယဆေးတံပင်
အာအင်အေ
အားဂျေပို့
အိချီမိုညိုဂန္ဓမာပန်း
အိစတာနှင်းပန်းပင်
အိတလီ ဆိုက်ပရက်ပင်
အိပီစီယာပင်
အိပီဒရာပင်
အေကင်သတ် ဟာဆူတတ်
အေကွန်နီတမ်
အေဇိုလာ
အေတီပီ

Helleborus
Honckenya ficifolia
Honduras mahogany

Acacia
Photosynthesis
Self-heal
Skunk cabbage
Black-lily family
Black fritillary
Symbiosis
Lady's finger
Classification
Cannonball tree
Oriental yew
East Asian tiger lily
Blue flag
Yellow flag
Archaeobacteria
Artichoke
African tulip tree
African violet
Armillaria edodes
Asian Indian pipe
RNA(Ribose nucleic acid)
Ergot
Ichimonyi chrysanthemum
Easter lily
Italian cypress
Episcia
Ephedra
Acanthus hirsutus
Aconitum
Azolla
ATP (Adenosine triphosphate)

အေဒိုနပ်စ် အေမူရင်းဆစ်
အေဗီစင်နီယာ မာရီနာ
အေမာနာ အိန္ဒူလစ်
အဲလမ်းပင်
အော်စမန်ဒါ ဂျပွန်နီကာ
အော်တိုဂရတ်ပင်
အော်တမ် ကရိုကတ်ပင်
အော်လဒါပင်
အက်ကီးဗီးယား ကွင်းနေတား
အက်ကီးဗီးယား
ထရိုင်ပိုလီယေးတား
အက်စကိုကပ်
အက်စပါဂျီလတ် အိုရိုင်ဇေ
အက်စဖိုဒယ်ပင်
အက်ဗော်နီမျိုးရင်း
အောက်ဇာလစ်ပင်
အိုဂီဝလန်ရေညှိပင်
အင်ကီယန်သတ် ပီဂျူလေးတတ်
အင်ဂျယ်လီကာပင်
အင်ဇိုင်း
အင်ထရိုမော်ဗာ ကွန်ပရက်ဆာ
အင်ဒိုဒါမိုဖိုက်တွန်
ကွန်ဆင်ထရိုကမ်
အင်ဒိုပလတ်စမစ် ရက်တီကူလမ်
အင်နိုမိုနီ ရက်ဒီယာနာ
အင်သူရီယမ်
အိုင်းရစ်မျိုးရင်း
အန်ကာရီယာ
အိန္ဒိယကျိတ်ပင်
အိန္ဒိယရာဘာပင်
အယ်ရီကာ မမ်မိုဆာ
အယ်လဂျီကိုလိုနီ
အယ်လပိုင်းစနိုးဗဲပင်
ဥယျာဉ်စိုက်မေပယ်ပင်
ဥရောပ စပျစ် ဟိုင်ယာဆင့်ပင်

Adonis amurensis
Avicennia marina
Amana edulis
Elm
Osmunda japonica
Autograph tree
Autumn crocus
Alder
Akebia quinata
Akebia trifoliata

Ascocarp
Aspergillus oryzae
Asphodel
Ebony family
Oxalis
Iceland moss
Enkianthus perulatus
Angelica
Enzyme
Enteromorpha compressa
Endodermophyton concentricum
Endoplasmic reticulum
Anemone raddeana
Anthurium
Iris family
Uncaria
Job's tears
India rubber tree
Erica mammosa
Algae colony
Alpine snowbell
Garden maple
European grape hyacinth



ကက်တလီယာသစ်ခွ



အုန်းငှက်ပျော



ရေတကောင်းပင်



ဒင်ဒရိုဗီယမ်သစ်ခွ



ဗေအိုဗတ်သစ်မာပင်



သစ်မာဖန်းပင်



ဗင်ဒါသစ်ခွ




မွန်စတယ်ရာ ဒီလီစီယိုဆာ



အုန်းပင်



ဆပ်သွားဖူးပင်



ခေါင်ရန်း



ဆာဂူအာရိရှားစောင်းကြီး



ဗောဓိညောင်



မိန့်ပန်း



ပါပိုင်းရတ်



ရာဘာပင်



ပုလင်းပုံအုန်းမျိုး



ဂျိုင်းယင့်ဝါးတားလိလိ

Read more Shwe Thway Journals at



↓ Click below link ↓

<https://www.facebook.com/shwethwayjournal/>